


Centro Studi Erbario Tropicale

L. Settesoldi, M. Tardelli, M. Raffaelli

THE TYPES OF  
THE TROPICAL HERBARIUM OF FLORENCE

Volume III: Dicotyledons (Buxaceae to Compositae)







**L. Settesoldi, M. Tardelli, M. Raffaelli**

THE TYPES  
OF THE TROPICAL HERBARIUM OF FLORENCE

Volume 3: Dicotyledons (Buxaceae to Compositae)



I TIPI  
DELL'ERBARIO TROPICALE DI FIRENZE

Volume 3: Dicotiledoni (Buxaceae - Compositae)

**CENTRO STUDI ERBARIO TROPICALE  
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE  
Via La Pira 4 - 50121  
ITALIA  
[erb trop@unifi.it](mailto:erb trop@unifi.it)**

FIRENZE  
2011



## FOREWORD

The Tropical Herbarium of Florence (FT), founded in 1904, houses at present about 200,000 exsiccata, the bulk of which is made up of plants from Tropical Africa (with special regard to Somalia, Ethiopia, Eritrea and Kenya), but also from Southern-Central America, the Arabian Peninsula (Yemen and Oman) and Oceania.

The Tropical Herbarium has always been and still is visited by a good number of Botanists; the collections preserved therein, are a primary source of taxonomical and chorological information, particularly on critical or little known genera and families of Tropical plants. A substantial contribution to the accomplishment of the African floras, such as "Flora of Ethiopia and Eritrea" and "Flora of Somalia", came from the study of FT exsiccata.

The thorough reorganisation of the Tropical Herbarium, gone through during the last few years, is now almost completed. To the advantage of Italian and foreign botanists, families and genera are filed according to the Dalla Torre Harms decimal classification system, thus facilitating also the addition of new specimens (Tardelli M., Museol. Sci. XIII (3-4): 319-344, 1996).

A few years have elapsed since the publication of the first volume (2001) on Monocotyledons types; the second volume (Dicotyledons types: from Piperaceae to Euphorbiaceae) was published in 2004. Now we are glad to present the third volume (Dicotyledons types: from Buxaceae to Compositae) that represents the conclusion of this task on the nomenclatural types housed in FT.

The President  
Prof. Mauro Raffaelli

## PREFAZIONE

L'Erbario Tropicale di Firenze (FT), fondato nel 1904, contiene attualmente circa 200.000 campioni in maggioranza provenienti dall'Africa Tropicale (specialmente Somalia, Etiopia, Eritrea e Kenya), ma anche dall'America Centro-Meridionale, dalla Penisola Arabica (Yemen e Oman) e dall'Oceania.

L'Erbario Tropicale è sempre stato ed è tuttora visitato da un grande numero di Botanici; le sue collezioni costituiscono una fonte essenziale di informazioni tassonomiche e corologiche e sono di fondamentale importanza per lo studio di generi e specie tropicali di incerta identità e classificazione.

Un contributo sostanziale alla realizzazione delle flore africane, come "Flora of Ethiopia and Eritrea" e "Flora of Somalia" è stato dato dallo studio dei campioni dell'Erbario Tropicale.

Il riordinamento delle collezioni dell'Erbario Tropicale, iniziato da alcuni anni, è ora quasi terminato. Per facilitare la consultazione dei campioni da parte dei Botanici italiani e stranieri e per rendere più agevole l'intercalamento dei campioni di nuova accessione, le famiglie e i generi sono stati ricollocati secondo un sistema decimale di classificazione derivante da Dalla Torre-Harms (Tardelli M., Museol. sci. XIII (3-4): 319-344. 1996).

Diversi anni sono passati dalla pubblicazione del primo volume (2001) elencante i tipi delle Monocotiledoni. Il secondo volume, sui tipi delle Dicotiledoni, dalle Piperaceae alle Euphorbiaceae, è stato pubblicato nel 2004. Ora viene presentato il terzo volume, sui tipi delle Dicotiledoni, dalle Buxaceae alle Compositae, con cui si conclude il censimento dei tipi conservati nell'Erbario Tropicale di Firenze.

Il Presidente  
Prof. Mauro Raffaelli



## ABBREVIATIONS

The abbreviations concerning the reviews are derived from Botanico-Periodicum-Huntianum (B-P-H) and Botanico-Periodicum-Huntianum / Suplementum (B-P-H / S). Plant families are named according to R.K. Brummitt, "Vascular Plant Families and Genera" Royal Botanic Gardens, Kew 1992.

**Beitr. Fl. Aethiop.** = SCHWEINFURTH G. Beitrag zur Flora Aethiopiens. Berlin. 1867.

**Biosyst. Monogr. Gen. Cucumis** = KIRKBRIDE J.H. Biosystematic monograph of the genus Cucumis (Cucurbitaceae). Parkway Publishers. 1993.

**Blepharis** = VOLLESEN K. Blepharis (Acanthaceae) A taxonomic revision. The Board of Trustees of the Royal Botanic Gardens, Kew. 2000.

**Boschi e piante legn. Eritr.** = FIORI A. Boschi e piante legnose dell'Eritrea. Firenze. Ed. Ist. Agr. Coloniale Italiano. 1909-1912.

**Bull. Soc. Bot. Ital.** = Bullettino della Società Botanica Italiana.

**Cent. pl. I** = LINNAEUS C. A. D. J. Centuria I plantarum, quam, ex consens. nobil. et exper. Fac. med. in Regia Academia Upsaliensi, sub praesidio, Caroli Linnaei, orbi botanico examinandam sistit, Abraham. D. Juslenius, V-Gothus. Upsalia. 1755.

**Cent. Pl. Méroé** = DELILE A. Centurie de plantes d'Afrique du voyage à Méroé recueillies par M. Cailliaud, et décrites par M. Raffeneau-Delile, 4<sup>e</sup> vol. of "Voyage à Méroé, au fleuve blanc, au-delà de Fâzoql, dans le midi du royaume de Sennâr, à Syouah et dans cinq autres oasis; fait dans les années 1819, 1820, 1821 et 1822". Paris. 4 vols. 1826-1827.

**Choix pl.** = VENTENAT E.P. Choix de plantes, dont la plupart sont cultivées dans le jardin de Cels. Paris. 10 parts. 1803-1808.

**Comm. pl. Afr. austr.** = MEYER E.H.F. & DRÈGE J.F. Commentariorum de plantis Africae australioris quas per octo annos collegit observationibusque manuscriptis illustratis Joannes Franciscus Drège. Lipsiae. 1835 [i.e. 1836, 1838].

**Contr. Conosc. Pasc. Somalia. Ital.** = FIORI A. & BETTINI M. Contributo alla conoscenza di alcuni pascoli della Somalia Italiana. Relazioni e Monografie Agricolo-Coloniali 66. Regio Istituto Agronomico per l'Africa Italiana. 1941.

**Cycl.** = REES A. The Cyclopaedia; or, universal dictionary of arts, sciences, and literature by Abraham Rees. With the assistance of eminent professional gentlemen. Illustrated with numerous engravings by the most distinguished artists. London. 79 parts. [1802-] 1819-1820.

**Dict. sci. nat. ed. 2** = CUVIER F. Dictionnaire des sciences naturelles, dans lequel on traite méthodiquement des différens êtres de la nature. Edition 2. Strasbourg, Parigi. 61 vols. 1816-1845.

**Diss.** = CAVANILLES A.J. Monadelphiae classis dissertationes decem. Madrid. [1785]-1790.

**Encycl.** = DE LAMARCK J.B. Encyclopédie methodique. Botanique. Paris. 13 vols. 1783-1817.

**Enum. pl.** = VAHL M. Martini Vahlii, Enumeratio plantarum, vel ab aliis, vel ab ipso observatarum, cum earum differentiis specificis, synonymis selectis et descriptionibus succinctis. Hauniae. 2 vols. 1804-1805.

**Enum. pl. afric. austral.** = ECKLON C.F. & ZEHYER K.L.P. Enumeratio plantarum africæ australis extratropicae quae collectae, determinatae et expositae a Christiano Friederico Ecklon & Carolo Zeyher. Hamburg [1834-] 1835-1836 [-1837].

**Evol. Gossypium** = HUTCHINSON J B. The Evolution of Gossypium. Oxford University Press. 1947.

**Faune & Flore des Comalis** = REVOIL G. Faune et flore des Pays Comalis (Afrique orientale), 10 parts. 1882; of which part ix botanical: A.R. FRANCHET, Sert. Somal. 1884.

**Fl. Aegypt.-Arab.** = FORSSKÅL P. Flora aegyptiaco-arabica. Sive descriptiones plantarum, quas per Aegyptum inferiorem et Arabiam felicem detexit, illustravit Petrus Forskål. Prof. Haun. Post mortem auctoris edidit Carsten Niebuhr. Accedit tabula Arabiae filicis geographicæ-botanica. Hauniae. 1775.

**Fl. atlant.** = DESFONTAINES R.L. Flora atlantica sive historia plantarum, quae in Atlante, agro Tunetano et Algerensi crescunt. Paris. 2 vols. 1798-1799.

- Fl. Bogos.** = MARTELLI U. *Florula Bogosensis*. Enumerazione delle piante dei Bogos raccolte dal Dott. O. Beccari nell'anno 1870 con descrizione delle specie nuove o poco note per cura di Ugolino Martelli. Firenze. Tip. Mariano Ricci. 1886.
- Fl. cap.** = HARVEY W.H. *Flora capensis; being a systematic description of the plants of the Cape Colony, Caffraria and Port Natal*. Dublin, London, Capetown. 7 vols. 1860-1933.
- Fl. capensis** = THUNBERG C.P. *Flora capensis, sistens plantas Promontorii Bonae Spei Africes, secundum systema sexuale emendatum redactas ad classes, ordines, genera et species, cum differentiis specificis, synonymis et descriptionibus*. Ed. 1a. Copenhagen. 3 parts. 1818-1820.
- Fl. of Ethiopia and Eritrea** = Flora of Ethiopia and Eritrea. Addis Abeba, Ethiopia e Uppsala, Svezia.
- Fl. of Somalia** = Flora of Somalia. Kew. Royal Botanic Gardens.
- Fl. orient.** = BOISSIER P.E. *Flora orientalis sive enumeratio plantarum in Oriente a Graecia et Aegypto ad Indiae fines hucusque observatarum*. Basel, Genève. 6 vols. 1867-1888.
- Fl. Pl. Sudan** = ANDREWS F.W. *The Flowering Plants of the Sudan*. 1956.
- Fl. Portugal** = COUTINHO A.X.P. *A flora de Portugal (plantas vasculares) disposita em chaves dichotomicas*. Paris, Lisboa, Rio de Janeiro, S. Paulo, Bello Horizonte. 1913.
- Fl. Somalia** = CHIOVENDA E. *Flora Somala*. Roma. Sindacato italiano Arti Grafiche Editore. 1929.
- Fl. Somalia II** = CHIOVENDA E. *Flora Somala II*. Forlì. Tipografia Valbonesi. 1932.
- Fl. Trop. Afr.** = Flora of Tropical Africa.
- Fl. Trop. East Afr.** = Flora of Tropical East Africa.
- Fragm. fl. aethiop.-aegypt.** = WEBB P.B. *Fragmenta florulae aethiopico-aegyptiacae ex plantis praecipuae ab Antonio Figari M.D. Musaeo I.R. Florentino missis. Auctore Philippo Barker Webb*. Parisiis. 1854.
- Gard. dict. ed. 7** = MILLER P. *The gardeners dictionary*. Edition 7. London. 1756-1759.
- Gard. dict. ed. 8** = MILLER P. *The gardeners dictionary*. Edition 8. London. 1768.
- Gen. pl.** = BENTHAM G. & HOOKER J.D. *Genera plantarum ad exemplaria imprimis in herbariis kewensibus servata definita*. London. 3 vols. 1862-1883.
- Hist. nat. Solanum** = DUNAL M.F. *Histoire naturelle, médicale et économique des Solanum, et des genres qui ont été confondus avec eux*. Paris, Strasbourg, Montpellier. 1813.
- Hochgebirgsfl. Afrika** = ENGLER H.G.A. *Über die Hochgebirgsflora des tropischen Afrika*. Berlin. 1892.
- Hort. bengal.** = ROXBURGH W. *Hortus bengalensis, or a catalogue of the plants growing in the honourable East India Company's Botanical Garden at Calcutta*. Serampore. 1814.
- Hort. bot. vindob.** = JACQUIN N.J. *Hortus botanicus vindobonensis, seu plantarum rarerum quae in horto botanico vindobonensi, augustissimae Mariae Theresiae munificentia regia in universitatis patriae excellens ornamentum publicamque utilitatem exstructo, coluntur, icones coloratae et succinctae descriptiones. Cura et sumptibus Nicolai Josephi Jacquin*. Vindobonae. 1770-1776.
- Hortus Maurit.** = BOJER W. *Hortus mauritianus ou énumération des plantes, exotiques et indigènes, qui croissent à l'ile Maurice, disposées d'après la méthode naturelle*. Mauritius. 1937.
- Ill. pl. orient.** = JAUBERT H.-F. & SPACH E. *Illustrationes plantarum orientalium auctoribus Comite Jaubert et Eduardo Spach*. Parisiis. 5 vols. 1842-1857.
- Interpr. Herb. amboin.** = MERRILL E.D. *An Interpretation of Rumphius's Herbarium amboinense*. Manila (Bureau of printing). 1917.
- Interpret. Van Rheede's Hort. Malab.** = NICOLSON D.H., SURESH C.R. & MANILAL K.S. *An Interpretation of Van Rheede's Hortus Malabaricus*. Koeltz. Koenigstein. 1988-
- Kunene-Sambesi-Exped.** = WARBURG O. *Kolonial-Wirtschaftliches Komittee. Kunene-Sambesi-Expedition H. Baum 1903. Im Auftrag des Kolonial-wirtschaftlichen Komitees herausgegeben von O. Warburg*. Berlin. 1903.
- Labiat. gen. spec.** = BENTHAM G. *Labiatarum genera et species: or, a description of the genera and species of plants of the order Labiate; with their general history, characters, affinities, and geographical distribution*. London. 1832-1836.
- Methodus** = MOENCH C. *Methodus plantas horti botanici et agri marburgensis a staminum situ describendi*.

Marburgi Cattorum. 1794.

**Misc. austriac.** = JACQUIN N.J. Miscellanea austriaca ad botanicam, chemiam et historiam naturalem spectantia, cum figuris partim coloratis. Vindobonae, ex Officina Krausiana. 2 vols. 1778-1781.

**Miss. Biol. Borana, Racc. Bot. Angiosp.-Gymnosp.** = CHIOVENDA E., FIORI A., LANZA D., CUFODONTIS G. Missione biologica nel paese dei Borana. Vol. 4. Raccolte Botaniche Angiospermae-Gymnospermae Pteridophyta. Roma. Reale Accademia D'Italia. 1939.

**Miss. Stud. Lago Tana, VII, Ricerche Bot. I** = PICHI-SERMOLLI R.E.G. Missione di studio al Lago Tana; Vol. VII, Ricerche Botaniche Parte I. Roma. Accademia Nazionale dei Lincei. 1951.

**Monogr. Afrik. Pflanzen-Fam.** = ENGLER H.G.A. Monographien afrikanischer Pflanzen-Familien und Gattungen. Herausgegeben von A. Engler. Leipzig. 8 vols. 1898-1904.

**Nat. Pflanzenfam.** = ENGLER H.G.A. & PRANTL K.A.E. Die natürlichen Pflanzenfamilien nebst ihren Gattungen und wichtigeren Arten insbesondere den Nutzpflanzen, bearbeitet unter Mitwirkung zahlreicher hervorragender Fachgelehrten. Leipzig. 1887-1915.

**Naturw. Reise Mossambique Bot.** = PETERS W.C.H. Naturwissenschaftliche Reise nach Mossambique auf Befehl seiner Majestäts des Königs Friedrich Wilhelm IV in den Jahren 1842 bis 1848 ausgeführt von Wilhelm C.H. Peters. Botanik. Berlin. 2 parts. [1861] 1862-1864.

**Niger Fl.** = HOOKER W.J. Niger Flora; or, an enumeration of the plants of western tropical Africa, collected by the late Dr. Theodore Vogel, botanist to the voyage of the expedition sent by Her Britannic Majesty to the River Niger in 1841, under the command of Capt. H. D. Trotter, R.N., & C. including Spicilegia gorgonea by P.B. Webb, Esq. and Flora Nigritana by Dr. J. D. Hooker, R.N., F.R.S., and George Bentham, Esq. with a sketch of the life of Dr. Vogel. Edited by Sir W. J. Hooker, with two views, a map and fifty plates. London, Madrid. 1849.

**Nov. pl. sp.**: ROTH A.W. Novae plantarum species praesertim Indiae orientalis. Ex collectione doct. Benj. Heynii. Cum descriptionibus et observationibus. Halberstadii. 1821.

**Osserv. Bot., Agr. e Industr. Abiss. Sett.** = CHIOVENDA E. Osservazioni botaniche, agrarie ed industriali fatte nell'Abissinia Settentrionale nell'anno 1909. Monografie e Rapporti coloniali 24. Roma. Tipog. nazionale Bertero & C. 1912.

**Pflanzenr.** = ENGLER H.G.A. Das Pflanzenreich. Regni vegetabilis conspectus. Im Auftrage der Preuss. Akademie der Wissenschaften, herausgegeben von A. Engler. Berlin. Nos. 1-107. 1900-1953.

**Pflanzenw. Afr.** = ENGLER H.G.A. Die Pflanzenwelt Afrikas insbesondere seiner tropischen Gebiete. Grundzüge der Pflanzenverbreitung in Afrika und die Charakterpflanzen Afrikas. Is vol. 9 of: "Die Vegetation der Erde. Sammlung pflanzengeographischer Monographien herausgegeben von A. Engler und O. Drude. Leipzig."

**Pflanzenw. Ost-Afrikas C** = ENGLER H.G.A. Die Pflanzenwelt Ost-Afrikas und der Nachbargebiete. Herausgegeben unter Redaktion von Professor A. Engler. Theil C. Verzeichniss der bis jetzt aus Ost-Afrika bekannt gewordenen Planzen. A. Engler and many contributors. Berlin 1895.

**Pl. Arid Lands** = WICKENS D.E., GOODIN J.R. & FIELD. D.V. Plants for Arid Lands. London. 1985.

**Prod. r.** = DE CANDOLLE A.P. Prodromus systematis naturalis regni vegetabilis, sive enumeratio contracta ordinum, generum, specierumque plantarum hucusque cognitarum, juxta methodi naturalis normas digesta. Paris, Strasbourg, London. 17 vols. 1823-1873.

**Prod. pl. cap.** = THUNBERG C.P. Prodromus plantarum capensium, quas in Promontorio Bonae Spei Africes, annis 1772-1775, collegit Carol. Pet. Thunberg. Upsaliae. 2 parts. 1794-1800.

**Racc. Bot. Miss. Consolata Kenya** = CHIOVENDA E. Raccolte Botaniche (Embryophyta Diploidalia) fatte dai Missionari della Consolata nel Kenya. Modena. Tip. Ferraguti & C. 1935.

**Report. bot. syst.** = WALPERS W.G. Repertorium botanices systematicae. Lipsiae (sumtibus Friderici Hofmeister). 6 vols. 1842-1847.

**Result. Sc. Miss. Stefanini-Paoli Somalia Ital. 1** = CHIOVENDA E. Resultati Scientifici della Missione Stefanini-Paoli nella Somalia Italiana. Volume 1. Le Collezioni Botaniche. Firenze. Galletti e Cacci. 1916.

**Revis. gen. pl.** = KUNTZE C.E.O. Revisio generum plantarum vascularium omnium atque cellularium multarum secundum leges nomenclaturae internationales cum enumeratione plantarum exoticarum in itinere mundi

- collectarum. Leipzig (Arthur Felix), London (Dulau & Co.), Milano (U. Hoepli), New York (Gust. E. Schechert), Paris (C. Klincksieck). 3 vols. 1891-1898.
- Select. stirp. amer. hist.** = JACQUIN N.J. Nicolai Josephi Jacquin Selectarum stirpium americanarum historia in qua ad linnaeanum sistema determinatae descriptaeque sistuntur plantae illae, quas in insula Martinicas, Jamaica, Domingo, aliisque, et in vicinae continentis parte, observavit rariores: adjectis iconibus in solo natali delineatis. Vindobonae. 1763.
- Sert. somal.** = Sertulum somalense. Mission G. Révoil aux pays Comalis. Faune et flore. Paris. 1882.
- Sp. pl.** = LINNAEUS C. Species plantarum, exhibentes plantas rite cognitas, ad genera relatas, cum differentiis specificis, nominibus trivialibus, synonymis selectis, loci natalibus, secundum systema sexuale digestas. 2 vols. Holmiae. 1753.
- Sp. pl. IV** = WILLDENOW C.L. Caroli a Linné Species plantarum exhibente plantas rite cognitas ad genera relatas cum differentiis specificis, nominibus trivialibus synonymis selectis, loci natalibus secundum systema sexuale digestas. Editio quarta, post Reichardianum quinta adjectis vegetabilibus hucusque cognitis curante Carolo Ludovico Willdenow. Berolini. 6 vols. 1797-1825.
- Stapelieae** = WHITE C.T. & SLOANE B.L. The Stapelieae, an introduction to the study of this tribe af Asclepiadaceae. Ed. 2. Pasadena, California. 3 vols. 1937.
- Stirp. nov.** = L'HÉRITIER DE BRUTELLE C.-L. Stirpes novae aut minus cognitae, quas descriptionibus et iconibus illustravit Carolus-Ludovicus L'Héritier, Dom. de Brutelle, in Aula Juvaminum Parisiensi, Regis consiliarius. Parisiis. 1784 [1785-1805].
- Suppl. pl.** = LINNAEUS C. FILIUS. Supplementum plantarum systematis vegetabilium editionis decimae tertiae, generum plantarum editiones sextae, et specierum plantarum editionis secundae. Editum a Carolo a Linné. Brunsvigae. 1781.
- Symb. bot.** = VAHL M. Symbolae botanicae, sive plantarum, tam earum, quas in itinere, imprimis orientali, collegit Petrus Forskål, quam aliarum, recentium detectarum, exactiores descriptiones, nec non observationes circa quasdam plantas dudum cognitas. Vol. 1-3. Haunie. 1790-1794.
- Syn. Pl.** = PERSOON C.H. Synopsis plantarum, seu enchyridium botanicum complectens enumerationem systematicam specierum hucusque cognitorum Pars prima. 2 (1): partis secundae sectio prima, 2 (2): pars secunda. Parisiis lutetiorum & Tubingae. 2 vols. 1805-1807.
- Syst. nat.** = LINNAEUS C. Systema naturae, sive regna tria naturae systematicae proposita per classes, ordines, genera, species. **ed. 10** Lugduni batavorum. 1758-1759; **ed. 12** 1766-1768; **ed. 13 (bis)** 1788-1793.
- Syst. Veg.** = ROEMER J.J. & SCHULTES J.A. Caroli a Linné Systema Vegetabilium secundum classes ordines genera species cum characteribus, differentiis et synonymiis. Editio nova, speciebus inde ab editione xv detectis aucta et locupletata. Stuttgardtiae.
- Tabl. Encycl.** = DE LAMARK J.B.A.P. & POIRET J.L.M. Tableau encyclopédique et méthodique des trois règnes de la nature. Botanique. Paris. 3 Tomes (6 volumes). 1791-1823.
- Tent. Fl. Abyss.** = RICHARD A. Tentamen Florae Abyssinicae seu Enumeratio Plantarum hucusque in plerisque abyssiniae provinciis detectarum. Vol. 1-2. Parigi. 1847 and 1851.
- Tent. gen. Tamar.** = BUNGE A. Tentamen generis Tamaricium species accuratius definiendi. Dorpat. 1852.
- Upl. Kenya Wild Fl.** = AGNEW A.D.Q. Upland Kenya Wild Flowers. A Flora of the Ferns and Herbaceous Flowering Plants of Upland Kenya. Oxford University Press. 1974.
- Veg. Erde** = ENGLER H.G.A. & DRUDE C.G.O. Die Vegetation der Erde. Sammlung pflanzengeographischer Monographien herausgegeben von A. Engler und O. Drude. Leipzig. 15 vols. 1896-1923.
- Voy. Yemen** = DEFLERS A. Voyage au Yemen, journal d'une excursion botanique faite en 1887 dans les montagnes de l'Arabie heureuse, suivi du catalogue des plantes recueillies, d'une liste des principales espèces cultivées avec leurs noms arabes et de nombreuses déterminations barométriques d'altitude. 1889.
- Wiss. Erg. deut. Zentr.-Afr. Exped., Bot.** = MILDBRAED G.W.J. Wissenschaftliche Ergebnisse der Deutschen Zentral-Afrika-Expedition 1907-1908 unter Führung Adolf Friedrichs, Herzogs zu Macklenburg. Band ii. Botanik herausgegeben von Dr. J. Mildbraed, Berlin mit 78 Tafeln. Leipzig. 1914.

## LEGEND

Families, genera and species are in alphabetical order. Correct names (or currently used names) adopted by major Floras are printed in **bold-face**. Synonyms (homotypic or heterotypic) are printed in *italics*.

*Cryptolepis ruspolii* Chiov.<sup>1</sup>, Fl. Somalia: 219 (1929)<sup>2</sup>.     (=) **Schlechterella abyssinica** (Chiov.) Venter & R.L.Verh.<sup>6</sup>, S. African J. Bot. 64 (6): 353 (1998)<sup>7</sup>.  
Holotypus: Riva 577 (1068)<sup>3</sup>.  
Ethiopia<sup>4</sup>.  
<sup>5</sup> Typus: Cufodontis 165 (FT lectotypus)<sup>8</sup>.  
Ref.: Venter H.J.T. in Hedberg I., Edwards S. & Sileshi Nemomissa 2003. Fl. of Ethiopia and Eritrea 4 (1): 110, ♀ 111°.  
Link: *Triodoglossum abyssinicum* (Chiov.) Bullock, Bullock, Hooker's Ic. Pl. 6 (4): t. 3584 (1962)<sup>10</sup>.

### LEFT COLUMN

- <sup>1</sup> Name of the type specimens kept in the Tropical Herbarium of Florence.  
<sup>2</sup> Reference to the original publication (protologue). In certain cases, a second number preceded by ♀ refers to an illustration in the publication.  
<sup>3</sup> Type(s) kept in FT. When the type is classified as isotype or isosyntype we include (if possible) the Herbaria where the holotype or syntypes are kept. Specimens from the Puccioni & Stefanini collection bear two numbers, one of which is printed between square brackets [ ]. Specimens from the Ruspoli & Riva collection often bear three numbers, one of which is printed between round brackets ( ).  
<sup>4</sup> Country of origin of the type specimen(s).  
<sup>5</sup> Occasional notes.

### CENTRAL COLUMN

- (=): heterotypic synonyms  
(≡): homotypic synonyms

### RIGHT COLUMN

- <sup>6</sup> Correct name (or currently used name) to which the synonym in the left column is to be referred.  
<sup>7</sup> Reference to the original publication of the correct name.  
<sup>8</sup> Type(s) and (if possible) Herbaria where they are kept.  
<sup>9</sup> Bibliographic reference validating the name in use, the type and the corresponding synonym.  
<sup>10</sup> A synonym of the correct name. In the publication following the name, the type in the left column is given as a synonym of this taxon.

### SPECIAL SYMBOLS

- \* From May 2010 all the african and venezuelan plants of Consolata Herbarium in Torino (TOM) have been acquired and now are preserved in Florence (FT).  
? Refers to any uncertainty due to incorrect or lacking data.



## ACANTHACEAE

- Acanthus arboreus* Forssk. f. *albiflorus* Fiori, Nuovo Giorn. Bot. Ital., n.s., 47 (1): 41 (1940). (=) *Acanthus polystachyus* Delile, Cent. Pl. Méroé 72, ♀ t. 62, f. 2 (1826).  
Holotypus: Saccardo s.n.  
Ethiopia.
- Acanthus sennii* Chiov., Atti Reale Accad. Italia, Mem. Cl. Sci. Fis., Ser. 7: 11 (2): 50 (1940).  
Holotypus/Isotypus: Senni 1767.  
Ethiopia.
- Anisotes involucratus* Fiori, Bull. Soc. Bot. Ital. 1915: 59, ♀ 59 (1915).  
Lectotypus: Paoli 365 (Baden, Nordic J. Bot. 1 (5): 655. 1981).  
Syntypi: Paoli 80, 117.  
Somalia.
- Asystasia anselliooides* C.B.Clarke var. *lanceolata* Fiori, in Chiov., Result. Sc. Miss. Stefanini-Paoli Somal. Ital. I: 138 (1916). (=) *Asystasia gangetica* (L.) T.Anderson subsp. *micrantha* (Nees) Ensermu, Proc. XIIIt Plenary Meeting of AETFAT 1: 343 (1994).  
Holotypus: Paoli 1294 bis.  
Somalia.
- Asystasia drake-brockmanii* Turrill f. *lejogyna* Chiov., Fl. Somalia: 251 (1929). (=) *Asystasia excellens* Lindau, Bot. Jahrb. Syst. 33: 190 (1902).  
Syntypi: Puccioni & Stefanini 231 [262], 323 [370].  
Somalia.
- Asystasia ritellii* Chiov., Fl. Somalia II: 351, ♀ 351 (1932). (=) *Asystasia riparia* Lindau, Bot. Jahrb. Syst. 33: 189 (1902).  
Holotypus: Gorini 491.  
Somalia.
- Asystasia somalica* Gand., Bull. Soc. Bot. France 69: 349 (1922). (=) *Asystasia riparia* Lindau, Bot. Jahrb. Syst. 33: 189 (1902).  
Holotypus: Fiori 7.  
Somalia.
- Barleria acanthoides* Vahl var. *gracilispina* Fiori, in Chiov., Result. Sc. Miss. Stefanini-Paoli Somal. Ital. I: 139 (1916). (=) *Barleria paolii* Fiori, Bull. Soc. Bot. Ital., 1915: 54, ♀ 54 (1915).  
Holotypus: Paoli 617.  
Somalia.
- Barleria argentea* Balf.f. var. *petiolosa* Chiov., Fl. Somalia II: 354, ♀ 356 (1932). (=) *Barleria argentea* Balf.f., Proc. Roy. Soc. Edinburgh 12 (113): 86 (1883).  
Syntypi: Senni 338; Gorini 348.  
Somalia.
- Barleria boranensis* Fiori., Miss. Biol. Borana, Racc. Bot. Angiosp.-Gymnosp.: 217, ♀ 218 (1939).  
Holotypus: Cufodontis 666.  
Ethiopia.
- Typus: Caillaud s.n. (P holotypus).  
Ref.: Vollesen K. 2007. Kew Bull. 62 (2): 241.
- Typus: Acerbi 687 (DC holotypus).  
Ref.: Hedrén M. in Thulin M. 2006. Fl. of Somalia 3: 399, ♀ 398.
- Typi: Ellenbeck 1044, 1047, 1051, 1099 (B syntypi, destr.).  
Ref.: Hedrén M. in Thulin M. 2006. Fl. of Somalia 3: 398, ♀ 397.
- Typus: Neumann 99 (B holotypus, destr.).  
Ref.: Hedrén M. in Thulin M. 2006. Fl. of Somalia 3: 399.
- Typus: Neumann 99 (B holotypus, destr.).  
Ref.: Hedrén M. in Thulin M. 2006. Fl. of Somalia 3: 399.
- Typus: Paoli 320 (FT holotypus).  
Ref.: Hedrén M. in Thulin M. 2006. Fl. of Somalia 3: 431.
- Typus: Balfour, Cockburn & Scott 544 (K isotypus).  
Ref.: Hedrén M. in Thulin M. 2006. Fl. of Somalia 3: 435.

- Barleria boranensis*** Fiori f. *leucosepala* Fiori, Miss. Biol. Borana, Racc. Bot. Angiosp.-Gymnosp.: 217, ♦ 219 (1939).  
 Holotypus: Cufodontis 217.  
 Ethiopia.
- Barleria chlamydocalyx*** Lindau, Annuario Reale Ist. Bot. Roma 6 (2): 73 (1896).  
 Holotypus: Riva 1464.  
 Ethiopia.
- Barleria clinopodium*** Fiori, Bull. Soc. Bot. Ital. 1915: 55, ♦ 55 (1915).  
 Holotypus: Paoli 527.  
 Somalia.  
 In Fl. of Somalia 3: 437. 2006, instead of 'Paoli 527' there is 'Paoli 5272'.
- Barleria glandulifera*** Lindau var. *benadirensis* Fiori, (=) in Chiov., Result. Sc. Miss. Stefanini-Paoli Somal. Ital. I: 140 (1916).  
 Holotypus: Paoli 819.  
 Somalia.
- Barleria harnieri*** Solms, Beitr. Fl. Aethiop.: 106 (1867).  
 Isotypus?: Schimper 11.  
 Ethiopia.
- Barleria insericata*** Chiov., Fl. Somalia: 263 (1929).  
 Holotypus: Puccioni & Stefanini 373 [424].  
 Somalia.
- Barleria iodocephala*** Chiov., Fl. Somalia: 261 (1929).  
 Holotypus: Puccioni & Stefanini 682 [748].  
 Somalia.
- Barleria jucunda*** Lindau, Annuario Reale Ist. Bot. Roma 6 (2): 75 (1896).  
 Holotypus: Riva 132.  
 Ethiopia.
- Barleria linearifolia*** Rendle var. *brevispina* Fiori, in Chiov., Result. Sc. Miss. Stefanini-Paoli Somal. Ital. I: 139 (1916).  
 Holotypus: Paoli 793.  
 Somalia.
- Barleria longissima*** Lindau, Annuario Reale Ist. Bot. Roma 6 (2): 73 (1896).  
 Holotypus: Riva 640.  
 Ethiopia.
- Barleria boranensis*** Fiori, Miss. Biol. Borana, Racc. Bot. Angiosp.-Gymnosp.: 217, ♦ 218 (1939).  
 Typus: Cufodontis 666 (FT holotypus).  
 Ref.: Cufodontis G. 1964. Bull. Jard. Bot. État 34 (4), Suppl.: 942.
- Barleria orbicularis*** Hochst. ex T.Anderson, J. Proc. Linn. Soc., Bot. 7: 29 (1864).  
 Typus: Schimper 2189 (K isotypus).  
 Ref.: Ensermu Kelbessa in Hedberg I., Ensermu Kelbessa, Edwards S., Sebsebe Demissew & Persson E. 2006. Fl. of Ethiopia and Eritrea 5: 425.
- Barleria glandulifera*** Lindau, Bot. Jahrb. Syst. 20: 22 (1894).  
 Typus: Hildebrandt 860e (K isotypus).  
 Ref.: Hedrén M. in Thulin M. 2006. Fl. of Somalia 3: 436.
- Barleria parviflora*** R.Br. ex T.Anderson, J. Proc. Linn. Soc., Bot. 7: 29 (1864).  
 Typus: Schimper 2291 (K isotypus).  
 Ref.: Cufodontis G. 1964. Bull. Jard. Bot. État 34 (4), Suppl.: 946.
- Barleria glandulifera*** Lindau, Bot. Jahrb. Syst. 20: 22 (1894).  
 Typus: Hildebrandt 860e (K isotypus).  
 Ref.: Hedrén M. in Thulin M. 2006. Fl. of Somalia 3: 436.
- Barleria mucronifolia*** Lindau, Annuario Reale Ist. Bot. Roma 6 (2): 71 (1896).  
 Typus: Riva 1098 (FT holotypus).  
 Ref.: Hedrén M. in Thulin M. 2006. Fl. of Somalia 3: 429.
- Barleria argentea*** Balf.f., Proc. Roy. Soc. Edinburgh 12 (113): 86 (1883).  
 Typus: Balfour, Cockburn & Scott 544 (K isotypus).  
 Ref.: Ensermu Kelbessa in Hedberg I., Ensermu Kelbessa, Edwards S., Sebsebe Demissew & Persson E. 2006. Fl. of Ethiopia and Eritrea 5: 422, ♦ 424.
- Barleria brevispina*** (Fiori) Hedrén, Willdenowia 36 (2): 758 (2006).  
 Ref.: Hedrén M. in Thulin M. 2006. Fl. of Somalia 3: 438.

- Barleria massae** Chiov., Atti Reale Accad. Italia, Mem. Cl. Sci. Fis., Ser. 7: 11 (2): 53 (1940). (=) **Barleria argentea** Balf.f., Proc. Roy. Soc. Edinburgh 12 (113): 86 (1883).  
Holotypus: Massa 596.  
Eritrea.
- Barleria migiurtinorum** Chiov., Fl. Somalia: 264 (1929). (=) **Barleria hildebrandtii** S.Moore, J. Bot. 15: 69 (1877).  
Syntypi: Puccioni & Stefanini 657 [721], 666 [732].  
Somalia.
- Barleria mucronifolia** Lindau, Annuario Reale Ist. Bot. Roma 6 (2): 71 (1896).  
Holotypus: Riva 1098.  
Somalia/Ethiopia.
- Barleria paolii** Fiori, Bull. Soc. Bot. Ital. 1915: 54, ♦ 54 (1915).  
Holotypus: Paoli 320.  
Somalia.
- Barleria pirottiae** Lindau, Annuario Reale Ist. Bot. Roma 6 (2): 75 (1896). (=) **Barleria hochstetteri** Nees, Prodr. 11: 231 (1847).  
Holotypus: Riva 819.  
Ethiopia.
- Barleria proxima** Lindau, Annuario Reale Ist. Bot. Roma 6 (2): 72 (1896).  
Syntypi: Riva 253, 291, 344, 366, 1661.  
Ethiopia/Somalia.
- Barleria pseudopriionitis** Lindau, Annuario Reale Ist. Bot. Roma 6 (2): 73 (1896).  
Holotypus: Riva 953.  
Ethiopia/Somalia.
- Barleria puccionii** Chiov., Fl. Somalia: 260 (1929).  
Syntypi: Puccioni & Stefanini 667 [733], 998 [1102].  
Somalia.
- Barleria quadrispina** Lindau, Annuario Reale Ist. Bot. Roma 6 (2): 72 (1896).  
Syntypi: Robecchi-Bricchetti 10; Riva 1065.  
Ethiopia.
- Barleria rivaei** Lindau, Annuario Reale Ist. Bot. Roma 6 (2): 74 (1896). (=) **Barleria hochstetteri** Nees, Prodr. 11: 231 (1847).  
Holotypus: Riva 1082.  
Ethiopia.
- Barleria ruspolii** Lindau, Annuario Reale Ist. Bot. Roma 6 (2): 74 (1896). (=) **Barleria argentea** Balf.f., Proc. Roy. Soc. Edinburgh 12 (113): 86 (1883).  
Holotypus: Riva 1680.  
Somalia.
- Typus: Balfour, Cockburn & Scott 544 (K isotypus).  
Ref.: Ensermu Kelbessa in Hedberg I., Ensermu Kelbessa, Edwards S., Sebsebe Demissew & Persson E. 2006. Fl. of Ethiopia and Eritrea 5: 422, ♦ 424.
- Typus: Hildebrandt 866 (K holotypus; BM isotypus).  
Ref.: Hedrén M. in Thulin M. 2006. Fl. of Somalia 3: 434.
- Typi: Kotschy 109, 159 (K isosyntypi).  
Ref.: <http://www.ville-ge.ch/musinfo/bd/cjb/africa/recherche.php>

- Barleria scassellatii* Fiori, Bull. Soc. Bot. Ital. 1915: (=) 56, ♦ 56 (1915).  
 Syntypi: Scassellati 14, 83; Paoli 373.  
 Somalia.
- Barleria stelligera* Lindau, Annuario Reale Ist. Bot. Roma 6 (2): 71 (1896).  
 Holotypus: Riva 1439.  
 Ethiopia.
- Blepharis boranensis** Vollesen, Blepharis: 110, ♦ 111 (2000).  
 Isotypus: Burger 3560.  
 (K holotypus. Vollesen, Blepharis: 110. 2000).  
 Ethiopia.
- Blepharis breviliata* Fiori, Bull. Soc. Bot. Ital. 1911: (=) 61 (1911).  
 Holotypus/Isotypus: Fiori 716.  
 Eritrea.
- Blepharis cuspidata** Lindau, Annuario Reale Ist. Bot. Roma 6 (2): 76 (1896).  
 Holotypus: Riva 417.  
 Ethiopia.
- Blepharis edulis* (Forssk.) Pers. f. *minima* Chiov., Fl. Somalia II: 350 (1932).  
 Holotypus: Senni 563.  
 Somalia.
- Blepharis edulis* (Forssk.) Pers. var. *oblongata* A.Terracc., Bull. Soc. Bot. Ital. 24: 424 (1892).  
 Holotypus: Baudi & Candeo s.n.  
 Somalia.
- Blepharis glinus** Fiori, Bull. Soc. Bot. Ital. 1915: 53 (1915).  
 Holotypus: Paoli 291.  
 Somalia.
- Blepharis hirta* (Nees) Martelli var. *latifolia* Martelli, (=) Fl. Bogos.: 65 (1886).  
 Holotypus: Beccari s.n.  
 Eritrea.
- Blepharis obovata* Chiov., Agric. Colon. 20: 48 (=) (1926).  
 Holotypus/Isotypus: Gorini 64.  
 Somalia.
- Brillantaisia grottanellii** Pic.Serm., Miss. Stud. Lago Tana, VII, Ricerche Bot. I: 254, ♦ t. LVIII (1951).  
 Holotypus/Isotypus: Pichi Sermolli 2099.  
 Ethiopia.
- Barleria micrantha** C.B.Clarke, in Thiselton-Dyer W.T., Fl. Trop. Afr. 5 (1): 168 (1899).  
 Typus: Scott-Elliott s.n. (K holotypus).  
 Ref.: Hedrén M. in Thulin M. 2006. Fl. of Somalia 3: 434, ♦ 434.
- Barleria hildebrandtii** S.Moore, J. Bot. 15: 69 (1877).  
 Typus: Hildebrandt 866 (K holotypus; BM isotypus).  
 Ref.: Ensermu Kelbessa in Hedberg I., Ensermu Kelbessa, Edwards S., Sebsebe Demissew & Persson E. 2006. Fl. of Ethiopia and Eritrea 5: 425.
- Blepharis maderaspatensis** (L.) Roth, Nov. pl. sp.: 320 (1821).  
 Typus: Herb. Linn. 816.10 (LINN holotypus).  
 Ref.: Vollesen K. 2000. Blepharis: 198, ♦ 202.
- Blepharis edulis** (Forssk.) Pers., Syn. Pl. 2: 180 (1806).  
 Typus: Forsskål 905 (C holotypus).  
 Ref.: Vollesen K. 2000. Blepharis: 103, ♦ 106.
- Blepharis edulis** (Forssk.) Pers., Syn. Pl. 2: 180 (1806).  
 Typus: Forsskål 905 (C holotypus).  
 Ref.: Vollesen K. 2000. Blepharis: 103, ♦ 106.
- Blepharis edulis** (Forssk.) Pers., Syn. Pl. 2: 180 (1806).  
 Typus: Forsskål 905 (C holotypus).  
 Ref.: Vollesen K. 2000. Blepharis: 103, ♦ 106.
- Blepharis edulis** (Forssk.) Pers., Syn. Pl. 2: 180 (1806).  
 Typus: Forsskål 905 (C holotypus).  
 Ref.: Vollesen K. 2000. Blepharis: 103, ♦ 106.

- Crabbea hirsuta* Harv. var. *somalensis* Lindau, Annuario Reale Ist. Bot. Roma 6 (2): 71 (1896). (=) *Crabbea velutina* S.Moore, J. Bot. 32: 135 (1894).  
Holotypus: Riva 1347.  
Ethiopia.
- Crossandra baccarinii* Fiori, Bull. Soc. Bot. Ital. 1915: 53 (1915).  
Holotypus: Paoli 582.  
Somalia.
- Crossandra johanninae* Fiori, Bull. Soc. Bot. Ital. 1911: 61, ♫ 61 (1911).  
Holotypus/Isotypus: Fiori 720.  
Eritrea.
- Crossandra nilotica* Oliv. var. *acuminata* C.B.Clarke, in Thiselton-Dyer W.T., Fl. Trop. Afr. 5 (1): 115 (1899). (=) *Crossandra nilotica* Oliv., Trans. Linn. Soc. London: 29: 128 (1875).  
Isolectotypus: Schwenfurth 303 (K lectotypus).  
Napper, Kew Bull. 24: 338. 1970.  
Eritrea.
- Crossandra stenostachya* (Lindau) C.B.Clarke var. *somalensis* Fiori, in Chiov., Result. Sc. Miss. Stefanini-Paoli Somal. Ital. I: 137 (1916). (=) *Crossandra stenostachya* (Lindau) C.B.Clarke, in Thiselton-Dyer W.T., Fl. Trop. Afr. 5 (1): 113 (1899).  
Holotypus: Paoli 694.  
Somalia.
- Dicliptera glanduligera* Chiov., in Hutch. & E.A.Bruce, Bull. Misc. Inform. 1941: 171 (1941). (=) *Dicliptera maculata* Nees, Prodr. 11: 485 (1847).  
Isotypus: Gillett 5407.  
(K holotypus. Hutchinson & Bruce, Bull. Misc. Inform. 1941: 171. 1941).  
Ethiopia.
- Dicliptera linifolia* Lindau, Annuario Reale Ist. Bot. Roma 6 (2): 80 (1896). (=) *Dicliptera linifolia* (Lindau) Lindau, Bot. Jahrb. Syst. 26: 346 (1899).  
Lectotypus: Riva 1462 (Vollesen, Kew Bull. 44 (4): 628. 1989).  
Syntypi: Robecchi-Bricchetti 249, 250.  
Somalia.
- Duosperma grandiflorum** Vollesen, Kew Bull. 61 (3): 320, ♫ 322 (2006).  
Isotypus: Gillett 18899.  
(K holotypus. Vollesen, Kew Bull. 61 (3): 320. 2006).  
Kenya.
- Duvernoia somalensis* Lindau, Annuario Reale Ist. Bot. Roma 6 (2): 81 (1896). (=) *Justicia grisea* C.B.Clarke, in Thiselton-Dyer W.T., Fl. Trop. Afr. 5 (1): 205 (1899).  
Holotypus: Riva 427.  
Somalia.
- Typus: Gregory s.n. (BM holotypus).  
Ref.: Ensermu Kelbessa in Hedberg I., Ensermu Kelbessa, Edwards S., Sebsebe Demissew & Persson E. 2006. Fl. of Ethiopia and Eritrea 5: 426.
- Typus: Grant 685 (K lectotypus), 135 (K syntypus).  
Ref.: Ensermu Kelbessa in Hedberg I., Ensermu Kelbessa, Edwards S., Sebsebe Demissew & Persson E. 2006. Fl. of Ethiopia and Eritrea 5: 364, ♫ 366.
- Typus: Hildebrandt 2720 (B holotypus, destr.; COR isotypus).  
Ref.: Thulin M. 2006. Fl. of Somalia 3: 386.
- Ref.: Ensermu Kelbessa in Hedberg I., Ensermu Kelbessa, Edwards S., Sebsebe Demissew & Persson E. 2006. Fl. of Ethiopia and Eritrea 5: 444.
- Ref.: Ensermu Kelbessa in Hedberg I., Ensermu Kelbessa, Edwards S., Sebsebe Demissew & Persson E. 2006. Fl. of Ethiopia and Eritrea 5: 459.
- Ref.: Ensermu Kelbessa in Hedberg I., Ensermu Kelbessa, Edwards S., Sebsebe Demissew & Persson E. 2006. Fl. of Ethiopia and Eritrea 5: 466.

- Dyschoriste actinotricha** Chiov., Fl. Somalia II: 348, ♦ (=) 349 (19323).  
Holotypus: Gorini 220.  
Somalia.
- Dyschoriste broiloi** Pic.Serm., Miss. Stud. Lago Tana, VII, Ricerche Bot. I: 256, ♦ t. LIX (1951).  
Holotypus: Pichi Sermolli 2126.  
Ethiopia.
- Dyschoriste lycioides** Chiov., Fl. Somalia: 249 (1929).  
Holotypus: Puccioni & Stefanini 975 [1072].  
Somalia.
- Dyschoriste nummulifolia** Chiov., Fl. Somalia: 250, ♦ t. XXX, f. 1 (1929).  
Holotypus: Puccioni & Stefanini 679 [745].  
Somalia.
- Ecbolium parvibracteatum** Rendle, J. Bot. 35: 379 (= 1897).  
Isotypus: Lort Phillips s.n.  
(BM holotypus. Vollesen, Kew Bull. 44 (4): 648. 1989).  
Somalia.
- Ecbolium subcordatum** C.B.Clarke var. **glabratum** Vollesen, Kew Bull. 44 (4): 671 (1989).  
Isotypus: Polhill & Paulo 729.  
(K holotypus. Vollesen, Kew Bull. 44 (4): 671. 1989).  
Kenya.
- Golaea migiurtina** Chiov., Fl. Somalia: 257, ♦ t. XXX, f. 3 (1929).  
Lectotypus: Puccioni & Stefanini 714 [791] (Thulin, Nordic J. Bot. 24 (5): 502. 2007).  
Syntypus: Puccioni & Stefanini 734 [813].  
Somalia.
- Harnieria dimorphocarpa** Solms, Sitzungsber. Ges. Naturf. Freunde Berlin 1864: 110 (1864).  
Lectotypus: Schimper 162 (Hedrén M., Nordic J. Bot. 10 (4): 375. 1990).  
Ethiopia.
- Hypoestes busii** Pic.Serm., Miss. Stud. Lago Tana, VII, Ricerche Bot. I: 142, ♦ t. XXVI (1951).  
Holotypus: Pichi Sermolli 2097.  
Ethiopia.
- Hypoestes caloi** Chiov., Ann. Bot. (Rome) 9 (2): 129 (= 1911).  
Syntypi: Chiovenda 2385, 2745, 2818.  
Ethiopia.
- Duosperma longicalyx** (Deflers) Vollesen, Kew Bull. 61 (3): 315 (2006).  
Typus: Deflers 1032 (P lectotypus).  
Ref.: Hedrén M. in Thulin M. 2006. Fl. of Somalia 3: 391.
- Dyschoriste multicaulis** (A.Rich.) Kuntze, Revis. gen. pl. 2: 486 (1891).  
Typus: Schimper 43 (K isotypus).  
Ref.: Ensermu Kelbessa in Hedberg I., Ensermu Kelbessa, Edwards S., Sebsebe Demissew & Persson E. 2006. Fl. of Ethiopia and Eritrea 5: 376.
- Ecbolium gymnostachyum** (Nees) Milne-Redh., Bull. Misc. Inform. 1941: 175 (1941).  
Typi: Zuccarini 12 (K lectotypus); Krause s.n. (Herb. Benth.).  
Ref.: Thulin M. 2006. Fl. of Somalia 3: 405.
- Crabbea migiurtina** (Chiov.) Thulin, Nordic J. Bot. 24 (5): 502 (2007).  
Ref.: Thulin M. 2007. Nordic J. Bot. 24 (5): 502.
- Justicia heterocarpa** T.Anderson, J. Linn. Soc., Bot. 7: 41 (1864).  
Typus: Schimper 162 (K lectotypus; FT, G, P, W isolectotypi).  
Hedrén M. 1990. Nordic J. Bot. 10 (4): 374, ♦ 376.
- Hypoestes triflora** (Forssk.) Roem. & Schult., Syst. Veg. 1: 141 (1817).  
Typi: Forsskål 1381, 1382 (C syntypi).  
Ref.: Ensermu Kelbessa in Hedberg I., Ensermu Kelbessa, Edwards S., Sebsebe Demissew & Persson E. 2006. Fl. of Ethiopia and Eritrea 5: 450, ♦ 451.
- Hypoestes triflora** (Forssk.) Roem. & Schult., Syst. Veg. 1: 141 (1817).  
Typi: Forsskål 1381, 1382 (C syntypi).  
Ref.: Ensermu Kelbessa in Hedberg I., Ensermu Kelbessa, Edwards S., Sebsebe Demissew & Persson E. 2006. Fl. of Ethiopia and Eritrea 5: 450, ♦ 451.

**Hypoestes carnosula** Chiov., Result. Sc. Miss. Stefanini-Paoli Somal. Ital. I: 142 (1916).

Holotype: Paoli 128.  
Somalia.

*Hypoestes sennii* Chiov., Atti Reale Accad. Italia, Mem. Cl. Sci. Fis., Ser. 7: 11 (2): 51 (1940).

Syntypes: Senni 10, 56, 110, 1499, 1748.  
Ethiopia.  
The syntype 'Senni 1498' is lacking in FT.

**Isoglossa somalensis** Lindau, Annuario Reale Ist. Bot. Roma 6 (2): 82 (1896).

Holotype: Riva 1293.  
Ethiopia.

*Justicia beguinotii* Fiori, Miss. Biol. Borana, Racc. Bot. Angiosp.-Gymnosp.: 222, ♦ 223 (1939).

Holotype: Cufodontis 659.  
Ethiopia.

**Justicia brevipila** Hedrén, Kew Bull. 43 (2): 356, ♦ 358 (1988).

Isotype: Drummond & Hemsley 4043.  
(K holotype. Hedrén, Kew Bull. 43 (2): 356. 1988).

Kenya.

*Justicia calcarata* Hochst. ex C.B.Clarke var. *baddabunae* Fiori, Nuovo Giorn. Bot. Ital., n.s., 47 (1): 41 (1940).

Holotype: Saccardo 20.  
Ethiopia.

**Justicia dallarii** Fiori, Nuovo Giorn. Bot. Ital., n.s., 47 (1): 41 (1940).

Holotype: Saccardo s.n.  
Ethiopia.

*Justicia dodonaeifolia* Chiov., Fl. Somalia: 268, ♦ t. XXXII, f. 1 (1929).

Holotype: Puccioni & Stefanini 875 [966].  
Somalia.

*Justicia exilissima* Chiov., Ann. Bot. (Rome) 10 (3): 401 (1912).

Holotype: Negri 815.  
Ethiopia.

*Justicia gilletti* Chiov., Bull. Misc. Inform. 1941: 172 (1941).

Isotype: Gillett 4110.  
(K holotype. Chiovenda, Bull. Misc. Inform. 1941: 172. 1941).  
Somalia.

(=) **Hypoestes triflora** (Forssk.) Roem. & Schult., Syst. Veg. 1: 141 (1817).

Typus: Forsskål 1381, 1382 (C syntypi).  
Ref.: Ensermu Kelbessa in Hedberg I., Ensermu Kelbessa, Edwards S., Sebsebe Demissew & Persson E. 2006. Fl. of Ethiopia and Eritrea 5: 450, ♦ 451.

(=) **Justicia calculata** Deflers, Bull. Soc. Bot. France 43: 224 (1896).

Typus: Deflers 548 (P holotypus).  
Ref.: Ensermu Kelbessa in Hedberg I., Ensermu Kelbessa, Edwards S., Sebsebe Demissew & Persson E. 2006. Fl. of Ethiopia and Eritrea 5: 482, ♦ 484.

(=) **Justicia ladanoides** Lam., Tabl. Encycl. 1: 42 (1791).

Typus: without collector and locality (P-LA holotypus).  
Ref.: Ensermu Kelbessa in Hedberg I., Ensermu Kelbessa, Edwards S., Sebsebe Demissew & Persson E. 2006. Fl. of Ethiopia and Eritrea 5: 476, ♦ 477.  
Link: *Justicia schimperi* (Hochst.) Dandy, Cufodontis, Bull. Jard. Bot. État 34 (4), Suppl.: 974 (1964).

(=) **Justicia gesneriflora** Rendle, J. Bot. 34: 414 (1896).

Typus: Donaldson-Smith s.n. (BM holotypus).  
Ref.: Hedrén M. in Thulin M. 2006. Fl. of Somalia 3: 410.

(=) **Justicia exigua** S.Moore, J. Bot. 38: 204 (1900).

Typus: Rand 389 (BM holotypus).  
Ref.: Ensermu Kelbessa in Hedberg I., Ensermu Kelbessa, Edwards S., Sebsebe Demissew & Persson E. 2006. Fl. of Ethiopia and Eritrea 5: 482, ♦ 484.

(=) **Justicia phillipsiae** Rendle, J. Bot. 35: 378 (1897).

Typus: Lort-Phillips s.n. (BM lectotypus; K isotype).  
Ref.: Hedrén M. in Thulin M. 2006. Fl. of Somalia 3: 415.

- Justicia lortiae*** Rendle, J. Bot. 35: 379 (1897). (=) ***Justicia odora*** (Forssk.) Vahl, Symb. bot. 2: 11 (1791).  
 Isotypus: Lort Phillips s.n.  
 (BM holotypus. Hedrén, Symb. Bot. Upsal. 29: 66. 1989).  
 Somalia.
- Justicia minutifolia*** Chiov., Bull. Misc. Inform. 1941: 173 (1941).  
 Isotypus: Gillett 4079A.  
 (K holotypus. Chiovenda, Bull. Misc. Inform. 1941: 173. 1941).  
 Somalia.
- Justicia nelsonioides*** Fiori, Bull. Soc. Bot. Ital. 1915: 57 (1915).  
 Holotypus: Paoli 511.  
 Somalia.
- Justicia ovalifolia*** Fiori, Bull. Soc. Bot. Ital. 1915: 57 (1915). (=) ***Justicia flava*** (Vahl) Vahl, Symb. bot. 2: 15 (1791).  
 Syntypi: Paoli 33, 71, 73.  
 Somalia.
- Justicia ovalifolia*** Fiori var. *psammophila* Fiori, Bull. Soc. Bot. Ital. 1915: 57 (1915).  
 Holotypus: Paoli 61.  
 Somalia.
- Justicia paolii*** Fiori, Bull. Soc. Bot. Ital. 1915: 58 (1915). (=) ***Justicia arenaria*** Hedrén, Willdenowia 36 (2): 751 (2006).  
 Syntypi: Paoli 1189; Scassellati s.n.  
 Somalia.
- Justicia richardsiae*** Hedrén, Bull. Jard. Bot. Natl. Belg. 58 (1-2): 133, ♦ 134 (1988).  
 Isotypus: Richards 4870.  
 (K holotypus. Hedrén, Bull. Jard. Bot. Natl. Belg. 58 (1-2): 133. 1988).  
 Zambia.
- Justicia scabrula*** Chiov., Bull. Misc. Inform. 1941: 174 (1941).  
 Isotypus: Gillett 4881.  
 (K holotypus. Chiovenda, Bull. Misc. Inform. 1941: 174. 1941).  
 Somalia.
- Justicia thiniophila*** Ensermu, Kew Bull. 50 (4): 791, ♦ 792 (1995).  
 Isotypus: Thulin, Hedrén & Abdi Dahir 7185.  
 (UPS holotypus. Ensermu Kelbessa, Kew Bull. 50 (4): 791. 1995).  
 Somalia.
- Justicia uncinulata*** Oliv. var. *cufodontii* Fiori, Miss. Biol. Borana, Racc. Bot. Angiosp.-Gymnosp.: 224, ♦ 225 (1939).  
 Lectotypus: Cufodontis 701 (Ensermu Kelbessa, Symb. Bot. Upsal. 29 (2): 59. 1990).  
 Syntypus: Cufodontis 500.  
 Ethiopia.
- (=) ***Justicia cufodontii*** (Fiori) Ensermu, Symb. Bot. Upsal. 29 (2): 59, ♦ 60 (1990).  
 Ref.: Ensermu Kelbessa in Hedberg I., Ensermu Kelbessa, Edwards S., Sebsebe Demissew & Persson E. 2006. Fl. of Ethiopia and Eritrea 5: 480, ♦ 481.

- Leucobarleria nivea* Lindau, Annuario Reale Ist. Bot. Roma 6 (2): 77 (1896).  
 Holotypus: Riva 945.  
 Ethiopia.
- Leucobarleria polyacantha* Lindau, Annuario Reale Ist. Bot. Roma 6 (2): 77 (1896).  
 Lectotypus: Robecchi-Bricchetti 240 (Bidgood & Brummitt, Kew Bull. 53 (1): 72. 1998).  
 Syntypus: Riva 914.  
 Ethiopia/Somalia.
- Leucobarleria robecchii* Lindau, Annuario Reale Ist. Bot. Roma 6 (2): 78 (1896).  
 Lectotypus: Robecchi-Bricchetti 239 (Bidgood & Brummitt, Kew Bull. 53 (1): 63. 1998).  
 Syntypus: Robecchi-Bricchetti 238, 258.  
 Somalia.
- Megalochlamys kenyensis** Vollesen, Kew Bull. 44 (4): 625, ♦ 627 (1989).  
 Isotypus: Napper & Jones 1956.  
 (K holotypus. Vollesen, Kew Bull. 44 (4): 625. 1989).  
 Kenya.
- Mimulopsis alpina** Chiov., Racc. Bot. Miss. Consolata Kenya: 94 (1935).  
 Holotypus: Balbo 37\*.  
 Kenya.
- Monechma troglodyticum* Chiov., Bull. Misc. Inform. 1941: 174 (1941), as 'troglodytica'.  
 Isotypus: Gillett 4255.  
 (K holotypus. Chiovenda, Bull. Misc. Inform. 1941: 174. 1941).  
 Somalia.
- Monothecium nakarii* Chiov., Ann. Bot. (Rome) 9 (2): 129 (1911).  
 Holotypus: Nakari s.n.  
 Ethiopia.
- Neuracanthus argyrophyllus** Chiov., Fl. Somalia: 252, ♦ t. XXXI, f. 1 (1929).  
 Holotypus: Puccioni & Stefanini 609 [670].  
 Somalia.
- Neuracanthus cladanthacanthus** Chiov., Fl. Somalia: 254, ♦ t. XXXI, f. 2 (1929).  
 Holotypus: Puccioni & Stefanini 778 [861].  
 Somalia.
- Neuracanthus stolonosus* Chiov., Fl. Somalia: 253, ♦ t. XXVII, f. 3 (1929).  
 Holotypus: Puccioni & Stefanini 400 [452].  
 Somalia.
- Neuracanthus stolonosus* Chiov. var. *ovalifolius* Fiori, Contr. Conosc. Pasc. Somalia Ital.: 10 (1941).  
 Holotypus: Bettini s.n.  
 Somalia.
- (=) **Neuracanthus lindaui** C.B.Clarke, in Thiselton-Dyer W.T., Fl. Trop. Afr. 5 (1): 139 (1899).  
 Ref.: Ensermu Kelbessa in Hedberg I., Ensermu Kelbessa, Edwards S., Sebsebe Demissew & Persson E. 2006. Fl. of Ethiopia and Eritrea 5: 433.
- (=) **Neuracanthus polyacanthus** (Lindau) C.B.Clarke, in Thiselton-Dyer W.T., Fl. Trop. Afr. 5 (1): 139 (1899).  
 Ref.: Ensermu Kelbessa in Hedberg I., Ensermu Kelbessa, Edwards S., Sebsebe Demissew & Persson E. 2006. Fl. of Ethiopia and Eritrea 5: 434, ♦ 425.
- (=) **Neuracanthus robecchii** (Lindau) C.B.Clarke, in Thiselton-Dyer W.T., Fl. Trop. Afr. 5 (1): 140 (1899).  
 Ref.: Thulin M. 2006. Fl. of Somalia 3: 452.
- (=) **Monechma debile** (Forssk.) Nees, Prodr. 11: 411 (1847).  
 Typus: Forsskål 391 (C holotypus).  
 Ref.: Ensermu Kelbessa in Hedberg I., Ensermu Kelbessa, Edwards S., Sebsebe Demissew & Persson E. 2006. Fl. of Ethiopia and Eritrea 5: 485, ♦ 486.
- (=) **Monothecium glandulosum** (Nees) Hochst., Flora 26: 74 (1843).  
 Typus: Schimper 346 (K isotypus).  
 Ref.: Ensermu Kelbessa in Hedberg I., Ensermu Kelbessa, Edwards S., Sebsebe Demissew & Persson E. 2006. Fl. of Ethiopia and Eritrea 5: 438, ♦ 440.
- (=) **Neuracanthus capitatus** Balf.f., Proc. Roy. Soc. Edinburgh 12: 86 (1883).  
 Typus: Balfour, Cockburn & Scott 360 (K holotypus).  
 Ref.: Thulin M. 2006. Fl. of Somalia 3: 449.
- (=) **Neuracanthus ovalifolius** (Fiori) Bidgood & Brummitt, Kew Bull. 53 (1): 54, ♦ 57 (1998).  
 Ref.: Thulin M. 2006. Fl. of Somalia 3: 449, ♦ 450.

- Neuracanthus thymifolius*** Chiov., Fl. Somalia: 255, ♦ (≡) t. XXX, f. 2 (1929).  
 Lectotypus: Puccioni & Stefanini 779 [862] (Thulin, Nordic J. Bot. 24 (5): 503. 2007).  
 Syntypi: Puccioni & Stefanini 685 [751], 752 [830], 870 [961].  
 Somalia.
- Plagiotheca fallax*** Chiov., Racc. Bot. Miss. Consolata Kenya: 96 (1935).  
 Syntypus/Isosyntypus: Balbo 828\*.  
 Kenya.  
 The syntype 'Balbo 601' is lacking in FT.
- Rhinacanthus chiovendae*** Fiori, Bull. Soc. Bot. Ital. (=) 1911: 63, ♦ 63 (1911).  
 Holotypus/Isotypus: Fiori 742.  
 Eritrea.
- Rhinacanthus pulcher*** Milne-Redh., Bull. Misc. Inform. 1935: 283 (1935).  
 Isotypus: Sampson 4.  
 (K holotypus).  
 Kenya.
- Ruellia bracteophylla*** Chiov., Fl. Somalia: 246 (1929). (=)  
 Holotypus: Puccioni & Stefanini 924 [1015].  
 Somalia.
- Ruellia carnea*** Balf.f. var. *cinerea* Chiov., Fl. Somalia: 248 (1929).  
 Syntypi: Puccioni & Stefanini 486 [538], 761 [842].  
 Somalia.
- Ruellia chiovendae*** Fiori, in Chiov., Result. Sc. Miss. Stefanini-Paoli Somal. Ital. I: 136 (1916).  
 Holotypus: Paoli 1040.  
 Somalia.
- Ruellia fiorii*** Chiov., Ann. Bot. (Rome) 10 (3): 400 (1912).  
 Syntypi: Pappi 8220, 8262, 8404.  
 Eritrea.
- Ruellia galactophylla*** Chiov., Fl. Somalia: 247, ♦ t. XXIX, f. 4 (1929).  
 Holotypus: Puccioni & Stefanini 1041 [752].  
 Somalia.
- Ruellia linearibracteolata*** Lindau, Annuario Reale Ist. Bot. Roma 6 (2): 70 (1896).  
 Holotypus: Riva 1152.  
 Ethiopia.
- Ruellia paradoxa*** Lindau, Annuario Reale Ist. Bot. Roma 6 (2): 69 (1896).  
 Lectotypus: Riva 420 (Thulin, Nordic J. Bot. 24 (4): 387. 2007).  
 Ethiopia.
- Crabbea thymifolia*** (Chiov.) Thulin, Nordic J. Bot. 24 (5): 503 (2007).  
 Ref.: Thulin M. 2007. Nordic J. Bot. 24 (5): 503.
- Ebolium gymnostachyum*** (Nees) Milne-Redh., Bull. Misc. Inform. 1941: 175 (1941).  
 Typi: Zuccarini 12 (K lectotypus); Krause s.n. (Herb. Benth.).  
 Ref.: Ensermu Kelbessa in Hedberg I., Ensermu Kelbessa, Edwards S., Sebsebe Demissew & Persson E. 2006. Fl. of Ethiopia and Eritrea 5: 455.
- Ruellia patula*** Jacq., Misc. austriac. 2: 358 (1781).  
 Typus: Cult. In Hort. Vienna from seeds from India, probably not preserved.  
 Ref.: Hedrén M. in Thulin M. 2006. Fl. of Somalia 3: 395.
- Ruellia carnea*** Balf.f., Proc. Roy. Soc. Edinburgh 12: 85 (1883).  
 Typus: Balfour, Cockburn & Scott 510 (K isotypus).  
 Ref.: Hedrén M. in Thulin M. 2006. Fl. of Somalia 3: 392.
- Ruellia discifolia*** Oliv., Icon. Pl. 6: t. 1511 (1886).  
 Typus: James & Thrupp s.n. (K holotypus).  
 Ref.: Hedrén M. in Thulin M. 2006. Fl. of Somalia 3: 393, ♦ 393.
- Satanocrater paradoxus*** (Lindau) Lindau, Nat. Pflanzenfam., Nachtr. 1: 305 (1897).  
 Ref.: Ensermu Kelbessa in Hedberg I., Ensermu Kelbessa, Edwards S., Sebsebe Demissew & Persson E. 2006. Fl. of Ethiopia and Eritrea 5: 395, ♦ 396.

- Ruellia patula* Jacq. var. *erythraea* A.Terracc., (=) *Ruellia patula* Jacq., Misc. austriac. 2: 358 Annuario Reale Ist. Bot. Roma 5 (3): 102 (1894). (1781).  
Syntypi: Terracciano 60, 195.  
Eritrea.
- Ruellia ruspolii* Lindau, Annuario Reale Ist. Bot. Roma 6 (2): 69 (1896).  
Lectotypus: Riva 1068 (Thulin, Nordic J. Bot. 24 (4): 386. 2007).  
Syntypi: Riva 1554, Robecchi-Bricchetti 245, 248.  
Ethiopia.
- Ruspolia pseuderanthemoides* Lindau, Annuario Reale Ist. Bot. Roma 6 (2): 80 (1896).  
Holotypus: Riva 1418.  
Ethiopia.
- Thunbergia chiovendaе* Fiori, Bull. Soc. Bot. Ital. 1915: 51, ♫ 52 (1915).  
Syntypi: Paoli 1113, 1151, 1224.  
Somalia.
- Thunbergia gigantea* Lindau, Annuario Reale Ist. Bot. Roma 6 (2): 68 (1896).  
Syntypi: Riva 428, 1498.  
Kenya.
- Thunbergia gondarensis* Chiov., Ann. Bot. (Rome) 9 (2): 128 (1911).  
Syntypi: Chiovenda 1158, 1529.  
Ethiopia.
- Thunbergia mauginii** Fiori, Nuovo Giorn. Bot. Ital., n.s., 47 (1): 40 (1940)  
Holotypus: Saccardo s.n.  
Ethiopia.
- Thunbergia paulitschkeana* Beck. var. *lanceolata* Chiov., Ann. Bot. (Rome) 10 (3): 401 (1912).  
Holotypus: Negri 247.  
Ethiopia.
- Thunbergia ruspolii** Lindau, Annuario Reale Ist. Bot. Roma 6 (2): 67 (1896).  
Holotypus: Riva 108.  
Ethiopia.
- (=) **Satanocrater ruspolii** (Lindau) Lindau, Nat. Pflanzenfam., Nachtr. 1: 305 (1897).  
Ref.: Ensermu Kelbessa in Hedberg I., Ensermu Kelbessa, Edwards S., Sebsebe Demissew & Persson E. 2006. Fl. of Ethiopia and Eritrea 5: 393.
- Ruspolia hypocrateriformis** (Vahl) Milne-Redh., Bull. Misc. Inform. 1936: 270 (1936).  
Typus: Thonning s.n. (C holotypus).  
Ref.: Ensermu Kelbessa in Hedberg I., Ensermu Kelbessa, Edwards S., Sebsebe Demissew & Persson E. 2006. Fl. of Ethiopia and Eritrea 5: 435, ♫ 437.
- Thunbergia guerkeana** Lindau, Pflanzenw. Ost-Afrikas C: 366 (1895).  
Typi: Holst 2410 (B syntypus, destr.); Fischer 465 (B syntypus, destr.).  
Ref.: Thulin M. 2006. Fl. of Somalia 3: 377.
- Thunbergia guerkeana** Lindau, Pflanzenw. Ost-Afrikas C: 366 (1895).  
Typi: Holst 2410 (B syntypus, destr.); Fischer 465 (B syntypus, destr.).  
Ref.: Thulin M. 2006. Fl. of Somalia 3: 377.
- Thunbergia hirsuta** T.Anderson, J. Proc. Linn. Soc., Bot. 7: 20 (1864).  
Typus: Plowden s.n. (K isotypus).  
Ref.: Ensermu Kelbessa in Hedberg I., Ensermu Kelbessa, Edwards S., Sebsebe Demissew & Persson E. 2006. Fl. of Ethiopia and Eritrea 5: 351.
- Thunbergia ruspolii** Lindau, Annuario Reale Ist. Bot. Roma 6 (2): 67 (1896).  
Typus: Riva 108 (FT holotypus).  
Ref.: Ensermu Kelbessa in Hedberg I., Ensermu Kelbessa, Edwards S., Sebsebe Demissew & Persson E. 2006. Fl. of Ethiopia and Eritrea 5: 351, ♫ 352.

- Thunbergia spinulosa* Chiov., Fl. Somalia II: 346, ♀ (=) 345.  
 Holotypus: Senni 543.  
 Somalia.
- Thunbergia holstii** Lindau, Bot. Jahrb. Syst. 17: 95 (1893).  
 Typus: Holst 543 (B holotypus, destr.).  
 Ref.: Thulin M. 2006. Fl. of Somalia 3: 376, ♀376.

## ALANGIACEAE

**Alangium kenyense** Chiov., Racc. Miss. Consolata Kenya: 49 (1935).

Holotypus: Balbo 674\*.

Kenya.

Verdcourt (Fl. Trop. East Afr., Alangiaceae: 4. 1958) in a note quotes: "This poorly prepared specimen is sterile and consequently its determination is not possible. It is probably a juvenile state of *Alangium chinense* (Lour.) Harms, a species known to occur in this locality."

## ANACARDIACEAE

*Aglaia somalensis* Chiov., Result. Sc. Miss. Stefanini- Paoli Somal. Ital. I: 51, 204 (1916). (=)

Syntypi: Scassellati 55, 64; Paoli 489.  
 Somalia.

**Sorindeia madagascariensis** Thouars ex DC, Prodri. 2: 80 (1825).

Typus: Madagascar, but type specimen not cited (? P holotypus).

Ref.: Thulin M. 1999. Fl. of Somalia 2: 264, ♀ 265.

*Calesiam somalense* Chiov., Result. Sc. Miss. Stefanini- Paoli Somal. Ital. I: 60 (1916). (=)

Holotypus: Paoli 1032.  
 Somalia.

**Lannea triphylla** (A.Rich.) Engl., in Engler & Prantl, Nat. Pflanzenfam. II-IV, Nachtr. 1: 213 (1897).

Typus: Schimper II 891 (P holotypus; BM, K isotypus).

Ref.: Thulin M. 1999. Fl. of Somalia 2: 256.

*Commiphora bricchetti* Chiov., Fl. Somalia II: 58, ♀ (=) 56 (1932).

Holotypus: Robecchi-Bricchetti 485.  
 Somalia.

**Lannea obovata** (Hook.f. ex Oliv.) Engl., Bot. Jahrb. Syst. 24: 496 (1898).

Typus: Playfair s.n. (K holotypus).

Ref.: Thulin M. 1999. Fl. of Somalia 2: 255, ♀ 256.

*Lannea cufodontii* Chiov., Miss. Biol. Borana, Racc. Bot. Angiosp.-Gymnosp.: 105, ♀ 106 (1939).

Holotypus/Isotypus: Cufodontis 162.  
 Ethiopia.

**Lannea rivae** (Chiov.) Sacleux, Bull. Mus. Hist. Nat. (Paris) ser. II, 6 (5): 453, in obs., 454 in clavi (1934).

Typus: Ruspoli & Riva 1354 (1225) 1229 (FT holotypus).

Ref.: Gilbert M.G. in Hedberg I. & Edwards S. 1989. Fl. of Ethiopia 3: 516, ♀ 515.

**Lannea greenwayi** Kokwaro, Kew Bull. 34 (4): 752 (1980).

Isotypus: Greenway 9256.  
 (EA holotypus. Kokwaro & Gillett, Kew Bull. 34 (4): 752. 1980).

Kenya.

**Lannea ornifolia** (Balf.f.) Engl. var. **glabra** Radcl.-Sm.,  
Kew Bull. 25 (2): 174 (1971).

Isotypus: Smith & Lavranos 280.  
(K holotypus. Radcliffe-Smith, Kew Bull. 25 (2):  
174. 1971).

Yemen, Socotra.

**Lannea ruspolii** Engl., Bot. Jahrb. Syst. 24: 494 (1898).  
Holotypus: Ruspoli & Riva 690 (1571) 630.  
Ethiopia.

**Odina cotoneaster** Chiov., Fl. Somalia: 134, ♦ t. XII, f.  
2 (1929).

Syntypi: Puccioni & Stefanini 402 [454], 415  
[467].

Somalia.

The syntype Robecchi Bricchetti 576 is lacking.

**Odina malifolia** Chiov., Fl. Somalia: 133, ♦ t. XII, f.  
1 (1929).

Holotypus: Puccioni & Stefanini 824 [910].  
Somalia.

**Odina minimifolia** Chiov., Fl. Somalia II: 154, ♦ 154.  
Holotypus: Senni 125.

Somalia.

**Odina rivae** Chiov., Fl. Somalia: 135 (1929).  
Holotypus: Ruspoli & Riva 1354 (1225) 1229.  
Ethiopia.

**Pistacia falcata** Becc. ex Martelli, Fl. Bogos.: 24  
(1886).

Holotypus: Beccari 273.  
Eritrea.

**Rhus abyssinica** Oliv. var. **glabrata** Becc. ex Martelli,  
Fl. Bogos.: 23 (1886).

Holotypus: Beccari 5.  
Eritrea.

Fiori, in Boschi e piante legn. Eritr.: 222 (1911)  
published 'Rhus glaucescens' A.Rich. f. *pubescens*'  
based on the same type.

**Rhus amharica** Pic.Serm., Miss. Stud. Lago Tana, VII,  
Ricerche Bot. I: 81, ♦ t. XIV (1951).

Holotypus: Pichi Sermolli 2337.  
Ethiopia.

**Rhus glaucescens** A.Rich. var. **obovatifoliolata** Engl.,  
Annuario Reale Ist. Bot. Roma 7 (1): 18 (1897).

Holotypus: Ruspoli & Riva 186 (1453) 173.  
Ethiopia.

(=) **Lannea schimperi** (A.Rich.) Engl., in Engler &  
Prantl, Nat. Pflanzenfam. II-IV, Nachtr. 1: 213  
(1897).

Typi: Schimper II 657, II 1282; Quartin-Dillon  
& Petit s.n. (P syntypi).

Ref.: Gilbert M.G. in Hedberg I. & Edwards S.  
1989. Fl. of Ethiopia 3: 516, ♦ 517.

**Lannea cotoneaster** (Chiov.) Sacleux, Bull. Mus.  
Hist. Nat. (Paris) ser. II, 6 (5): 453, in obs., 454 in  
clavi (1934).

Ref.: Thulin M. 1999. Fl. of Somalia 2: 257, ♦ t.  
4 E.

**Lannea malifolia** (Chiov.) Sacleux, Bull. Mus.  
Hist. Nat. (Paris) ser. II, 6 (5): 453, in obs., 454 in  
clavi (1934).

Ref.: Thulin M. 1999. Fl. of Somalia 2: 256.

**Lannea alata** (Engl.) Engl., in Engler & Prantl, Nat.  
Pflanzenfam. II-IV, Nachtr. 1: 214 (1897).

Typi: Hildebrandt 2365, 2487 (B syntypi,  
destr.).

Ref.: Thulin M. 1999. Fl. of Somalia 2: 256.

(=) **Lannea rivae** (Chiov.) Sacleux, Bull. Mus. Hist.  
Nat. (Paris) ser. II, 6 (5): 453, in obs., 454 in clavi  
(1934).

Ref.: Gilbert M.G. in Hedberg I. & Edwards S.  
1989. Fl. of Ethiopia 3: 516, ♦ 515.

**Rhus natalensis** C.Krauss, Flora 27: 349 (1844).  
Typus: Krauss 395 (B holotypus, destr.; K  
isotypus).

Ref.: Gilbert M.G. in Hedberg I. & Edwards S.  
1989. Fl. of Ethiopia 3: 523, ♦ 525.

**Rhus glutinosa** Hochst. ex A.Rich. subsp. **glutinosa**  
var. **glutinosa**, Tent. Fl. Abyss. 1: 144 (1847).

Typus: Schimper II 851 (P lectotypus; K  
isolectotypus).

Ref.: Gilbert M.G. in Hedberg I. & Edwards S.  
1989. Fl. of Ethiopia 3: 529, ♦ 526.

**Rhus natalensis** C.Krauss, Flora 27: 349 (1844).  
Typus: Krauss 395 (B holotypus, destr.; K  
isotypus).

Ref.: Gilbert M.G. in Hedberg I. & Edwards S.  
1989. Fl. of Ethiopia 3: 523, ♦ 525.

- Rhus glaucescens* A.Rich. var. *schimperi* Oliv., in (=) Oliver D., Fl. Trop. Afr. 1: 438 (1868).  
 Isotypus: Schimper 109.  
 (K holotypus. Gilbert, Fl. of Ethiopia 3: 524. 1989).  
 Ethiopia.
- Rhus puccionii** Chiov., Fl. Somalia: 132, ♦ t. XI (1929).  
 Syntypi: Puccioni & Stefanini 712 [789], 849 [937].  
 Somalia.
- Rhus pyroides* Burch. var. *erythraea* Fiori, Boschi e piante legn. Eritr.: 222 (1911).  
 Holotypus/Isotypus: Fiori 186.  
 Eritrea.
- Rhus ruspolii** Engl., Annuario Reale Ist. Bot. Roma 7 (1): 18 (1897).  
 Holotypus: Ruspoli & Riva 1462 (1253) 1317.  
 Ethiopia.  
 In Fl. of Ethiopia 3: 528 (1989) the year of publication is '1883' instead of '1897'.
- Scassellatia heterophylla* Chiov., Fl. Somalia II: 152, ♦ 152, 153 (1932).  
 Syntypi: Senni 221, 222, 291, 392, 397.  
 Somalia.
- Sclerocarya gillettii** Kokwaro, Kew Bull. 34 (4): 757 (1980).  
 Isotypus: Brenan, Gillett & Kanuri 14752.  
 (EA holotypus. Kokwaro & Gillett, Kew Bull. 34 (4): 757. 1980).  
 Kenya.
- Rhus quartiniana** A.Rich. var. **quartiniana**, Tent. Fl. Abyss. 1: 141 (1847).  
 Typus: Quartin-Dillon s.n. (P holotypus; K isotypus).  
 Ref.: Gilbert M.G. in Hedberg I. & Edwards S. 1989. Fl. of Ethiopia 3: 524, ♦ 527.
- Rhus quartiniana** A.Rich. var. **quartiniana**, Tent. Fl. Abyss. 1: 141 (1847).  
 Typus: Quartin-Dillon s.n. (P holotypus; K isotypus).  
 Ref.: Gilbert M.G. in Hedberg I. & Edwards S. 1989. Fl. of Ethiopia 3: 524, ♦ 527.
- Lannea schweinfurthii** (Engl.) Engl., in Engler & Prantl, Nat. Pflanzenfam. II-IV, Nachtr. 1: 214 (1897).  
 Typus: Schweinfurth 1059 (B holotypus, destr.; K isotypus).  
 Ref.: Thulin M. 1999. Fl. of Somalia 2: 258, ♦ 257.

## APOCYNACEAE

- Adenium somalense* Balf.f. var. *caudatipetalum* Chiov., (=) Fl. Somalia: 217 (1929).  
 Holotypus: Puccioni & Stefanini 242 [270].  
 Somalia.
- Adenium somalense* Balf.f. var. *crispum* Chiov., Fl. Somalia: 217 (1929).  
 Lectotypus: Puccioni & Stefanini 444 [496] (Plaizier, Meded. Landbouwhogeschool 80 (12): 14. 1980).  
 Syntipi: Puccioni & Stefanini 469 [521], 512 [565].  
 Somalia.
- Adenium obesum** (Forssk.) Roem. & Schult., Syst. Veg. 4: 411 (1819).  
 Typus: Forsskål 235 (C holotypus).  
 Ref.: Thulin M. 2006. Fl. of Somalia 3: 133, ♦ 132.
- Adenium obesum** (Forssk.) Roem. & Schult., Syst. Veg. 4: 411 (1819).  
 Typus: Forsskål 235 (C holotypus).  
 Ref.: Thulin M. 2006. Fl. of Somalia 3: 133, ♦ 132.

- Adenium tricholepis* Chiov., Fl. Somalia II: 288, ♫ 289 (1932).  
 Lectotypus: Senni 70 (Plaizier, Meded. Lan-  
 dbouwhogeschool 80 (12): 14. 1980).  
 Syntypi: Senni 77, 579.  
 Somalia.
- Conopharyngia humilis* Chiov., Atti Soc. Naturalisti  
 Mat. Modena 66: 10 (1935).  
 Holotypus: Suckert 16.  
 Somalia.
- Hunteria africana* K.Schum., Pflanzenw. Ost-Afrikas  
 C: 317 (1895).  
 Isoneotypus: Faulkner 1626 (Stuhlmann 77, 206,  
 both syntypi B, destr.; K neotypus. Omino, Belmontia  
 29: 122. 1996).  
 Tanzania.
- Hunteria africana* K.Schum. var. *minor* Chiov., Result.  
 Sc. Miss. Stefanini-Paoli Somal. Ital. I: 112 (1916).  
 Syntypi: Paoli 478, 815.  
 Somalia.
- Piaggiae boranensis* Chiov., Miss. Biol. Borana,  
 Racc. Bot. Angiosp.-Gymnosp.: 159, ♫ 160 (1939).  
 Holotypus: Cufodontis 86.  
 Ethiopia.
- Tabernaemontana sessilifolia** Baker, J. Linn. Soc.,  
 Bot. 20: 205 (1883).  
 Isolectotypus: Baron 1783 (K lectotypus).  
 Madagascar.
- Wrightia demartiniana** Chiov., Ann. Bot. (Rome)  
 13 (3): 405 (1915).  
 Lectotypus: Paoli 839 (Ngan, Ann. Missouri  
 Bot. Gard. 52 (2): 163. 1965).  
 Syntypi: Paoli 680, 851, 896.  
 Somalia.
- (=) **Adenium obesum** (Forssk.) Roem. & Schult., Syst.  
 Veg. 4: 411 (1819).  
 Typus: Forsskål 235 (C holotypus).  
 Ref.: Thulin M. 2006. Fl. of Somalia 3: 133, ♫  
 132.
- (=) **Ephippiocarpa humilis** (Chiov.) Boiteau,  
 Adansonia, n.s. 16 (2): 280 (1976).  
 Ref.: Thulin M. 2006. Fl. of Somalia 3: 126, ♫  
 126.
- (=) **Hunteria zeylanica** (Retz.) Gardner ex Thwaites  
 var. *africana* (K.Schum.) Pichon, Bol. Soc. Brot.,  
 ser. 2, 27: 106, ♫ t. 2, f. 6 (1953).  
 Ref.: Thulin M. 2006. Fl. of Somalia 3: 127, ♫  
 128.
- (=) **Hunteria zeylanica** (Retz.) Gardner ex Thwaites  
 var. *africana* (K.Schum.) Pichon, Bol. Soc. Brot.,  
 ser. 2, 27: 106, ♫ t. 2, f. 6 (1953).  
 Typus: Faulkner 1626 (K neotypus).  
 Ref.: Cufodontis G. 1960. Bull. Jard. Bot. État  
 30 (4), Suppl.: 689.
- (=) **Wrightia demartiniana** Chiov., Ann. Bot. (Rome)  
 13 (3): 405 (1915).  
 Typus: Paoli 839 (FT lectotypus).  
 Ref.: Leeuwenberg A.J.M. in Hedberg I.,  
 Edwards S. & Sileshi Nemomissa 2003. Fl. of  
 Ethiopia and Eritrea 4 (1): 96, ♫ 97.

## AQUIFOLIACEAE

- Ilex mitis* (L.) Radlk. var. *erythraea* Fiori, Boschi e  
 piante legn. Eritr.: 224 (1911).  
 Holotypus/Isotypus: Fiori 169.  
 Eritrea.
- (=) **Ilex mitis** (L.) Radlk., Rep. Brit. Assoc. Advancem.  
 Sci. 1885: 1081 (1886).  
 Typus: specimen 261.2 in Herb. Linnaeus  
 (LINN lectotypus).  
 Ref.: Verdcourt B. in Hedberg I. & Edwards S.  
 1989. Fl. of Ethiopia 3: 329, ♫ 330.

## ASCLEPIADACEAE

- Asclepias litocarpa*** Chiov., Miss. Biol. Borana, Racc. (=) Bot. Angiosp.-Gymnosp.: 164, ♫ 165 (1939).  
Holotypus: Cufodontis 618.  
Ethiopia.
- Asclepias negrii*** Chiov., Ann. Bot. (Rome) 10 (3): (=) 393 (1912).  
Holotypus: Negri 920.  
Ethiopia.
- Brachystelma asmarensse*** Chiov., Ann. Bot. (Rome) 10 (3): 390 (1912).  
Syntypi: Baldrati D 80, D 92.  
Eritrea.  
In the protologue there is 'Baldrati D 89' instead of 'Baldrati D 80'.
- Brachystelma subaphyllum*** K.Schum., Annuario Reale Ist. Bot. Roma 7 (1): 40 (1897).  
Holotypus: Robecchi-Bricchetti 113.  
Somalia.
- Calotropis inflexa*** Chiov., Atti Ist. Bot. Univ. Pavia 7: (=) 139, ♫ t. VII (1936).  
Holotypus: Puccioni 15.  
Somalia.
- Caralluma dodsoniana*** Lavranos, Cact. Succ. J. (Los Angeles) 43 (2): 60, ♫ 60, 61 (1971).  
Holotypus: Lavranos 7326.  
Somalia.
- Caralluma elata*** Chiov., Miss. Biol. Borana, Racc. (=) Bot. Angiosp.-Gymnosp.: 169, ♫ 170 (1939).  
Holotypus: Cufodontis 35.  
Ethiopia.
- Caralluma mogadoxensis*** Chiov., Fl. Somalia II: 299, ♫ 300 (1932).  
Holotypus: Senni 199.  
Somalia.
- Caralluma oxyodonta*** Chiov., Fl. Somalia II: 298, ♫ 299 (1932).  
Holotypus: Gorini 37.  
Somalia.  
Lavranos, in Fl. of Somalia 3: 179. 2003, considers '*Caralluma speciosa* (N.E.Br.) N.E.Br.' synonym of '*Desmidorchis speciosa* (N.E.Br.) Plowes'.
- Gomphocarpus integer*** (N.E.Br.) Bullock, Kew Bull. 1952: 408 (1952).  
Typus: Lort Phillips s.n. (K lectotypus).  
Ref.: Goyder D.J. in Hedberg I., Edwards S. & Sileshi Nemomissa 2003. Fl. of Ethiopia and Eritrea 4 (1): 126.
- Gomphocarpus integer*** (N.E.Br.) Bullock, Kew Bull. 1952: 408 (1952).  
Typus: Lort Phillips s.n. (K lectotypus).  
Ref.: Goyder D.J. in Hedberg I., Edwards S. & Sileshi Nemomissa 2003. Fl. of Ethiopia and Eritrea 4 (1): 126.
- Brachystelma lineare*** A.Rich., Tent. Fl. Abyss. 2: 49 (1850).  
Typus: Quartin Dillon (P holotypus).  
Ref.: Gilbert M.G. in Hedberg I., Edwards S. & Sileshi Nemomissa 2003. Fl. of Ethiopia and Eritrea 4 (1): 169.
- Caralluma edulis*** (Edgew.) Benth. & Hook. f., Gen. pl. 2: 782 (1876).  
Typus: Edgeworth 6035 (K holotypus).  
Ref.: Lavranos J. in Thulin M. 2006. Fl. of Somalia 3: 174, ♫ 173.
- Calotropis procera*** (Aiton) R.Br., Hort. Kew. (ed. 2) (1811).  
Typus: Jacq., Obs. Bot. Icon. 3: t. 69 (1768) (lectotypus designed by Ali 1980).  
Ref.: Goyder D.J. in Thulin M. 2006. Fl. of Somalia 3: 144, ♫ 145.
- Pseudolithos dodsonianus*** (Lavranos) Bruyns & Meve, Edinburgh J. Bot. 52 (2): 202 (1995).  
Ref.: Lavranos J.J. in Thulin M. 2006. Fl. of Somalia 3: 182, ♫ 182.
- Caralluma priogonium*** K.Schum., Bot. Jahrb. Syst. 34: 327 (1904).  
Typus: Engler 1521a (B holotypus, destr.).  
Ref.: Gilbert M.G. in Hedberg I., Edwards S. & Sileshi Nemomissa 2003. Fl. of Ethiopia and Eritrea 4 (1): 171, ♫ 172, 175.
- Caralluma speciosa*** (N.E.Br.) N.E.Br., Bull. Misc. Inform. 1895: 264 (1895).  
Typus: Kirk s.n. (K holotypus).  
Ref.: Gilbert M.G. in Hedberg I., Edwards S. & Sileshi Nemomissa 2003. Fl. of Ethiopia and Eritrea 4 (1): 176, ♫ 177.

- Caralluma riva*** Chiov., Fl. Somalia: 222 (1929).  
 Syntypi: Riva 3, 44; Puccioni & Stefanini 527 [580].  
 Etiopia (Riva); Somalia (Puccioni & Stefanini).  
 Lavranos, in Fl. of Somalia 3: 178. 2003, considers '*Caralluma socotrana* (Balf.f.) N.E.Br.' synonym of '*Sanguilluma socotrana* (Balf.f.) Plowes.'
- Ceropegia beccariana*** Martelli, Fl. Bogos.: 56 (1886).  
 Holotypus: Beccari 306.  
 Eritrea.
- Ceropegia biddumana*** K.Schum., Annuario Reale Ist. Bot. Roma 7 (1): 41 (1897).  
 Holotypus: Riva 1202.  
 Ethiopia.
- Ceropegia cufodontii*** Chiov., Miss. Biol. Borana, Racc. Bot. Angiosp.-Gymnosp.: 167, ♦ 168 (1939).  
 Holotypus: Cufodontis 337.  
 Ethiopia.
- Ceropegia devechii*** Chiov., Fl. Somalia II: 301, ♦ 302 (1932), as 'De Vecchii'.  
 Holotypus: Senni 459.  
 Somalia.
- Ceropegia ruspoliana*** K.Schum., Annuario Reale Ist. Bot. Roma 7 (1): 42 (1897).  
 Holotypus: Riva 1373.  
 Ethiopia.
- Ceropegia somalensis*** Chiov., Result. Sc. Miss. Stefanini-Paoli Somal. Ital. I: 116 (1916).  
 Holotypus: Paoli 889.  
 Somalia.
- Cryptolepis buxifolia*** Chiov., Racc. Bot. Miss. Consolata Kenya: 80 (1935).  
 Lectotypus Balbo s.n.\* (Venter 2000. In schedis).  
 Isotypus: Balbo s.n.\*  
 Kenya.
- Cryptolepis gilletii*** Hutch. & E.A.Bruce, Bull. Misc. Inform. 1941: 144 (1941).  
 Isotypus: Gillett 4773.  
 (K holotypus. Hutchinson & Bruce, Bull. Misc. Inform. 1941: 144. 1941).  
 Somalia.
- Cryptolepis migiurtina*** Chiov., Fl. Somalia: 217, ♦ t. XXIII, f. 4 (1929).  
 Holotypus: Puccioni & Stefanini 1043 [794].  
 Somalia.
- (=) ***Caralluma socotrana*** (Balf.f.) N.E.Br., Gard. Chron. 2: 370 (1892).  
 Typus: Balfour (K lectotypus).  
 Ref.: Gilbert M.G. in Hedberg I., Edwards S. & Sileshi Nemomissa 2003. Fl. of Ethiopia and Eritrea 4 (1): 176, ♦ 177.
- (=) ***Ceropegia aristolochioides*** Decne. subsp. ***aristolochioides***, Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh 45 (2): 296 (1988).  
 Typus: Heudelot 477 (P holotypus).  
 Ref.: Gilbert M.G. in Hedberg I., Edwards S. & Sileshi Nemomissa 2003. Fl. of Ethiopia and Eritrea 4 (1): 164, ♦ 167.
- (=) ***Ceropegia affinis*** Vatke, Linnaea 40: 218 (1876).  
 Typus: Schimper 301 (K lectotypus).  
 Ref.: Gilbert M.G. in Hedberg I., Edwards S. & Sileshi Nemomissa 2003. Fl. of Ethiopia and Eritrea 4 (1): 166, ♦ 167.
- (=) ***Ceropegia variegata*** (Forssk.) Decne., Ann. Sci. Nat. Bot., sér. 2, 9: 262, ♦ t. 9A (1838).  
 Typus: Botta (P holotypus).  
 Ref.: Gilbert M.G. in Thulin M. 2006. Fl. of Somalia 3: 170, ♦ t. 2A.
- (=) ***Ceropegia affinis*** Vatke, Linnaea 40: 218 (1876).  
 Typus: Schimper 301 (K lectotypus).  
 Ref.: Gilbert M.G. in Hedberg I., Edwards S. & Sileshi Nemomissa 2003. Fl. of Ethiopia and Eritrea 4 (1): 166, ♦ 167.
- (=) ***Cryptolepis oblongifolia*** (Meisn.) Schltr., J. Bot. 1896: 315 (1896).  
 Typus: Krauss 132 (K lectotypus).  
 Ref.: <http://www.ville-ge.ch/musinfo/bd/cjb/africa/recherche.php>.

**Cryptolepis orbicularis** Chiov., Fl. Somalia II: 291, ♦ 293 (1932).

Holotypus: Gorini 322.  
Somalia.

**Cryptolepis ruspolii** Chiov., Fl. Somalia: 219 (1929).  
Holotypus: Riva 577 (1068).  
Ethiopia.

**Schlechterella abyssinica** (Chiov.) Venter & R.L.Verh., S. African J. Bot. 64 (6): 353 (1998).

Typus: Cufodontis 165 (FT lectotypus).

Ref.: Venter H.J.T. in Hedberg I., Edwards S. & Sileshi Nemomissa 2003. Fl. of Ethiopia and Eritrea 4 (1): 110, ♦ 111.

Link: *Triodoglossum abyssinicum* (Chiov.) Bullock, Bullock, Hooker's Ic. Pl. 6 (4): t. 3584 (1962).

**Cryptolepis stefaninii** Chiov., Fl. Somalia: 218, ♦ t. XXIII, f. 3 (1929).

Holotypus: Puccioni & Stefanini 1001 [1105].  
Somalia.

**Curroria macrophylla** Radcl.-Sm., Hooker's Icon. Pl. 7 (4): t. 3685, ♦ t. 3685 (1971).

Isotypus: Radcliffe-Smith & Lavranos 515.  
(K holotypus. Radcliffe-Smith, Hooker's Icon. Pl. 7 (4): t. 3685. 1971).  
Yemen, Socotra.

**Cynanchum defoliascens** K.Schum., Annuario Reale Ist. Bot. Roma 7 (1): 38 (1897). (=)

Holotypus: Robecchi-Bricchetti 110.  
Somalia.

**Cynanchum dentatum** K.Schum., Annuario Reale Ist. Bot. Roma 7 (1): 39 (1897). (=)

Holotypus: Riva 844.  
Ethiopia.

**Cryptolepis macrophylla** (Radcl.-Sm.) Venter, Taxon 46 (4): 713 (1997).

Ref.: Venter H.J.T. & Veerhoeven R.L. 1997. Taxon 46 (4): 713.

**Cynanchum falcatum** Hutch. & E.A.Bruce, Kew Bull. 1941: 145 (1941).

Isotypus: Gillett 4114.  
(K holotypus. Hutchinson & Bruce, Kew Bull. 1941: 145. 1941).  
Somalia/Ethiopia boundary.

**Cynanchum gonoloboides** Schltr., Wiss. Erg. Deut. Zentr.-Afr. Exped., Bot. 2: 543 (1913). (=)

Isoneotypus: Glover, Gwynne & Paulo 1492 (Schlechter 1617, B holotypus, destr.; K neotypus. Liede, Ann. Missouri Bot. Gard. 83 (3): 317. 1996).  
Kenya.

**Cynanchum lenewtonii** Liede, Kew Bull. 49 (1): 119, ♦ 120 (1994).

Isotypus: Gillett 14031.  
(K holotypus. Liede, Kew Bull. 49 (1): 119. 1994).  
Kenya.

**Cynanchum microstegium** K.Schum., Annuario Reale Ist. Bot. Roma 7 (1): 39 (1897). (=)

Typus?: Riva 1171.  
Ethiopia/Somalia.

**Pentarrhinum gonoloboides** (Schltr.) Liede, Syst. Bot. 22 (2): 368 (1997).

Ref.: Goyder D.J. & Liede S. in Hedberg I., Edwards S. & Sileshi Nemomissa 2003. Fl. of Ethiopia and Eritrea 4 (1): 142.

**Blyttia fruticulosa** (Decne.) D.V.Field, Kew Bull. 38 (2): 216, ♦ 217 (1983).

Typus: Schimper 816 (P holotypus; K isotypus).  
Ref.: Liede-Schumann S. in Thulin M. 2006. Fl. of Somalia 3: 152, ♦ 152.

- Cynanchum pleianthum* K.Schum., Annuario Reale Ist. Bot. Roma 7 (1): 39 (1897).  
 Lectotypus: Riva 1533 (B holotypus, destr. Liede, Ann. Missouri Bot. Gard. 83 (3): 317. 1996).  
 Ethiopia.
- Cynanchum roseum* Chiov., Racc. Bot. Miss. Consolata Kenya: 82 (1935).  
 Holotypus: Balbo 83\*.  
 Kenya.
- Cynanchum umtalense** Liede, Ann. Missouri Bot. Gard. 83 (3): 341, ♀ 342 (1996).  
 Isotypus: Goldsmith 1/62.  
 (K holotypus. Liede, Ann. Missouri Bot. Gard. 83 (3): 341. 1996).  
 Zimbabwe.
- Desmidorchis tardellii** Mosti & Raffaelli, Webbia 59 (2): 289, ♀ 287 (2004).  
 Holotypus: Raffaelli, Tardelli, Mosti s.n.  
 Oman.
- Duvalia eilensis** Lavranos, Cact. Succ. J. (Los Angeles) 44 (6): 260, ♀ 261 (1972).  
 Holotypus: Lavranos 7223.  
 Somalia.
- Duvalia galgallensis** Lavranos, Cact. Succ. J. (Los Angeles) 46 (4): 184, ♀ 185 (1974).  
 Holotypus: Lavranos & Horwood 10260.  
 Somalia.
- Duvalia somalensis** Lavranos, Cact. Succ. J. (Los Angeles) 43 (2): 65, ♀ 66 (1971).  
 Holotypus: Lavranos 6838.  
 Somalia.
- Echidnopsis chrysanthra** Lavranos, Cact. Succ. J. (Los Angeles) 43 (2): 65, ♀ 65 (1971).  
 Holotypus: Lavranos 7325.  
 Somalia.
- Echidnopsis chrysanthra* Lavranos var. *filipes* Lavranos, Cact. Succ. J. (Los Angeles) 46 (4): 184 (1974).  
 Holotypus: Lavranos & Bavazzano 8484.  
 Somalia.
- Echidnopsis mijerteina** Lavranos, Cact. Succ. J. (Los Angeles) 43 (2): 64, ♀ 64 (1971).  
 Holotypus: Lavranos 7268.  
 Somalia.
- Echidnopsis mijerteina* Lavranos var. *marchandii* Lavranos, Cact. Succ. J. (Los Angeles) 46 (4): 184 (1974).  
 Holotypus: Lavranos 8999.  
 Somalia.
- (=) **Cynanchum heteromorphum** Vatke, Linnaea 40: 215 (1876).  
 Typus: Schimper 940 (B holotypus, destr.; K lectotypus).  
 Ref.: Liede S. in Hedberg I., Edwards S. & Sileshi Nemomissa 2003. Fl. of Ethiopia and Eritrea 4 (1): 147.
- (=) **Tylophora heterophylla** A.Rich., Tent. Fl. Abyss. 2: 41 (1850).  
 Typus: Petit s.n. (P holotypus).  
 Ref.: Liede S. in Hedberg I., Edwards S. & Sileshi Nemomissa 2003. Fl. of Ethiopia and Eritrea 4 (1): 135.
- (≡) **Echidnopsis chrysanthra** Lavranos subsp. *filipes* (Lavranos) Plowes, Haseltonia 1: 75 (1993).  
 Ref.: Lavranos J.J. in Thulin M. 2006. Fl. of Somalia 3: 187.
- Echidnopsis mijerteina** Lavranos, Cact. Succ. J. (Los Angeles) 43 (2): 64, ♀ 64 (1971).  
 Typus: Lavranos 7268 (FT holotypus).  
 Ref.: Lavranos J.J. in Thulin M. 2006. Fl. of Somalia 3: 189, ♀ 189.

- Echidnopsis stellata* Lavranos, Cact. Succ. J. (Los Angeles) 46 (4): 182, ♫ 182 (1974).  
 Holotypus: Lavranos F342.  
 Somalia.
- Glossonema macrosepalum* Chiov., Result. Sc. Miss. (= Stefanini-Paoli Somal. Ital. I: 113 (1916).  
 Holotypus: Paoli 1082.  
 Somalia.
- Gomphocarpus fruticosus* (L.) W.T.Aiton var. (= *purpureus* Schweinf., Beitr. Fl. Aethiop.: 129 (1867).  
 Isotypus: Schimper 356.  
 (B holotypus, destr. Goyder, Kew Bull. 56 (4): 796. 2001).  
 Ethiopia.
- Huernia penzigi* N.E.Br. var. *schweinfurthii* A.Berger, (= Stapelien und Kleinien: 142 (1910).  
 Isotypus: Schweinfurth & Riva 1340 (? ubi, holotypus).  
 Eritrea.
- Marsdenia gondarensis* Chiov., Ann. Bot. (Rome) 9 (1): 80 (1911).  
 Holotypus: Chiovenda 1741.  
 Ethiopia.
- Marsdenia stefaninii* Chiov., Result. Sc. Miss. (= Stefanini-Paoli Somal. Ital. I: 116 (1916).  
 Holotypus: Paoli 1216.  
 Somalia.
- Mitolepis arbuscula* Radcl.-Sm., Hooker's Icon. Pl. 7 (4): t. 3686, ♫ t. 3686 (1971).  
 Isotypus: Radcliffe-Smith & Lavranos 308.  
 (K holotypus. Radcliffe-Smith, Hooker's Icon. Pl. 7 (4): t. 3686. 1971).  
 Yemen, Socotra.
- Pachycarpus schumannii* Chiov., Ann. Bot. (Rome) 10 (3): 394 (1912).  
 Lectotypus: Negri 1063 (Goyder, Kew Bull. 53 (2): 363. 1998).  
 Syntypus: Riva 86.  
 Ethiopia.
- Pachycarpus terminans* Fiori, Nuovo Giorn. Bot. Ital., n.s., 47: 35 (1940).  
 Holotypus: Saccardo s.n.  
 Ethiopia.
- Echidnopsis virchowii* K.Schum., Monatsschr. Kakteenk.: 98 (1893).  
 Typus: Hildebrandt s.n. (K isotypus).  
 Ref.: Lavranos J.J. in Thulin M. 2006. Fl. of Somalia 3: 186.
- Glossonema revoilii* Franch., Sert. somal.: 40, ♫ t. III (1882).  
 Typus: Révoil 69 (P holotypus).  
 Ref.: Goyder D.J. in Thulin M. 2006. Fl. of Somalia 3: 162.
- Gomphocarpus purpurascens* A.Rich., Tent. Fl. Abyss. 2: 38, ♫ t. 69 (1851).  
 Typus: Petit (P holotypus; K isotypus).  
 Ref.: Goyder D.J. in Hedberg I., Edwards S. & Sileshi Nemomissa 2003. Fl. of Ethiopia and Eritrea 4 (1): 124, ♫ 125.
- Huernia macrocarpa* (A.Rich.) Sprenger, in Dammann, Catalogue 59: 4, ♫ t. 6 (1892).  
 Typus: Quartin-Dillon & Petit s.n. (P holotypus). Epitype: Penzig s.n. cult. La Mortola (K epitype, designated by Gilbert in Brodie, 1998).  
 Ref.: Gilbert M.G. in Hedberg I., Edwards S. & Sileshi Nemomissa 2003. Fl. of Ethiopia and Eritrea 4 (1): 191, ♫ 192.
- Gongronema angolense* (N.E.Br.) Bullock, Kew Bull. 15: 199 (1961).  
 Typus: Welwitsch 4245 (K lectotypus, designated by Bullock, 1954).  
 Ref.: Albers F. & Güldenberg S. in Hedberg I., Edwards S. & Sileshi Nemomissa 2003. Fl. of Ethiopia and Eritrea 4 (1): 153, ♫ 154.
- Marsdenia stelostigma* K.Schum., Bot. Jahrb. Syst. 33: 330 (1903).  
 Typi: Ellenbeck 2080, 2086 (B syntypi, destr.).  
 Ref.: Goyder D.J. in Thulin M. 2006. Fl. of Somalia 3: 165.
- Cryptolepis arbuscula* (Radcl.-Sm.) Venter, Taxon 46 (4): 713 (1997).  
 Ref.: Venter H.J.T. & Veerhoeven R.L. 1997. Taxon 46 (4): 713.
- Pachycarpus petherickianus* (Oliv.) Goyder, Kew Bull. 51 (4): 798 (1996).  
 Typus: Trans. Linn. Soc. London 29: t. 118B (1875) (lectotypus).  
 Ref.: Goyder D.J. in Hedberg I., Edwards S. & Sileshi Nemomissa 2003. Fl. of Ethiopia and Eritrea 4 (1): 128.
- Pachycarpus petherickianus* (Oliv.) Goyder, Kew Bull. 51 (4): 798 (1996).  
 Typus: Trans. Linn. Soc. London 29: t. 118B (1875) (lectotypus).  
 Ref.: Goyder D.J. in Hedberg I., Edwards S. & Sileshi Nemomissa 2003. Fl. of Ethiopia and Eritrea 4 (1): 128.

- Pentatropis hoyoides* K.Schum., Annuario Reale Ist. Bot. Roma 7 (1): 40 (1897).  
 Syntypi: Robecchi-Bricchetti 321, 333.  
 Ethiopia, Somalia.
- Pentatropis rigida* Chiov., Result. Sc. Miss. Stefanini-Paoli Somal. Ital. I: 114 (1916).  
 Syntypi: Paoli 21, 130.  
 Somalia.
- Pergularia daemia* (Forssk.) Chiov. var. *macrantha* Chiov., Result. Sc. Miss. Stefanini-Paoli Somal. Ital. I: 115 (1916).  
 Syntypi: Paoli 587, 1108.  
 Somalia.
- Pergularia tacazzeana* Chiov., Ann. Bot. (Rome) 9 (1): 80 (1911).  
 Holotypus: Chiovenda 617.  
 Ethiopia.
- Pseudolithos caput-viperae** Lavranos, Cact. Succ. J. (Los Angeles) 46 (3): 126, ♦ 126, 127, 128 (1974).  
 Holotypus: Lavranos & Horwood 10155.  
 Somalia.
- Raphionacme abyssinica* Chiov., Miss. Biol. Borana, Racc. Bot. Angiosp.-Gymnosp.: 161, ♦ 162 (1939).  
 Lectotypus: Cufodontis 165 (Venter & Verhoeven, S. African J. Bot. 64 (6): 353. 1998).  
 Syntypi: Cufodontis 198, 225.  
 Ethiopia.
- Rhytidocaulon piliferum** Lavranos, Cact. Succ. J. (Los Angeles) 43 (2): 62, ♦ 63, 64 (1971).  
 Holotypus: Lavranos 7365.  
 Somalia.
- Secamone socotrana** Balf.f. var. *glaucia* Radcl.-Sm., Kew Bull. 25 (2): 189 (1971).  
 Isotypus: Radcliffe-Smith & Lavranos 612.  
 (K holotypus. Goyder, Kew Bull. 47 (3): 472. 1992).  
 Yemen, Socotra.
- Spathulopetalum dicapuae* Chiov., Ann. Bot. (Rome) 10 (3): 392 (1912).  
 Lectotypus: Terracciano & Pappi 955 (Gilbert, Bradleya 8: 14. 1990, sub holotypus).  
 Syntypi: Pappi 8289, 8314.  
 Eritrea.
- (=) **Pentatropis nivalis** (J.F.Gmel.) D.V.Field & J.R.I.Wood, Kew Bull. 38 (2): 215 (1983).  
 Typus: Forsskål 272 (C holotypus).  
 Ref.: Goyder D.J. in Thulin M. 2006. Fl. of Somalia 3: 151, ♦ 151.
- (=) **Pentatropis nivalis** (J.F.Gmel.) D.V.Field & J.R.I.Wood, Kew Bull. 38 (2): 215 (1983).  
 Typus: Forsskål 272 (C holotypus).  
 Ref.: Goyder D.J. in Thulin M. 2006. Fl. of Somalia 3: 151, ♦ 151.
- (=) **Pergularia daemia** (Forssk.) Chiov., Result. Sc. Miss. Stefanini-Paoli Somal. Ital. I: 115 (1916).  
 Typus: Forsskål (not traced), Neotypus: Rathjens 37/7 (BM neotypus).  
 Ref.: Goyder D.J. 2006. Kew Bull. 61 (2): 249, ♦ 247.
- (=) **Telosma africana** (N.E.Br.) N.E.Br., Fl. Cap. 4 (1): 776 (1908).  
 Typi: Rowland; Barter 3332; Thomson; Elliot 4589, 5498, 5553; McKen 2; Wood 3395 (K syntypi).  
 Ref.: Goyder D.J. 2006. Kew Bull. 61 (2): 254.
- (=) **Schlechterella abyssinica** (Chiov.) Venter & R.L.Verh., S. African J. Bot. 64 (6): 353 (1998).  
 Ref.: Venter H.J.T. in Hedberg I., Edwards S. & Sileshi Nemomissa 2003. Fl. of Ethiopia and Eritrea 4 (1): 110, ♦ 111.
- (=) **Caralluma dicapuae** (Chiov.) Chiov., in White A.C. & Sloane B., Stapeliae Ed. 2, 1, Addend. A: 187 (1937).  
 Ref.: Lavranos J. in Thulin M. 2006. Fl. of Somalia 3: 177, ♦ 173.

*Xysmalobium taschdjiani* Chiov., Malpighia 34: 509 (= 1937).

Holotypus: Taschdjian 373.  
Ethiopia.

*Whitesloanea migiurtina* Chiov., Malpighia 34: 542 (= 1937).

Holotypus: Puccioni & Stefanini 862 [951].  
Somalia.

Bruyns, in Bradleya 8: 36. 1990, considers the holotype: Puccioni & Stefanini 862 [951] 'apparently missing' (U. Meve, pers. comm., 1989) and he selects a neotype: Bally B 10924. The specimen Puccioni & Stefanini 862 [951] however is present in FT.

***Xysmalobium undulatum* (L.) W.T.Aiton, Hort. Kew. (ed. 2): 79 (1811).**

Typus: "Apocynum Afric. lapathi folio" in Commelin, Hort. Med. Amstelaed. Pl. Rar.: 16, t. 16. 1706 (icon. lectotypus).

Ref.: Goyder D.J. in Hedberg I., Edwards S. & Sileshi Nemomissa 2003. Fl. of Ethiopia and Eritrea 4 (1): 131, ♦ 133.

***Pseudolithos migiurtinus* (Chiov.) Bally, Cact. Succ. J. Gr. Brit. 30 (2): 31 (1975).**

Ref.: Lavranos J. in Thulin M. 2006. Fl. of Somalia 3: 181, ♦ 181.

## BIGNONIACEAE

*Kigelia aethiopica* Decne. ex DC: var. *brachycarpa* (= Chiov., Result. Sc. Miss. Stefanini-Paoli Somal. Ital. I: 134 (1916).

Syntypi: Paoli 753, 1299.  
Somalia.

*Kigelia aethiopica* Decne. ex DC: var. *stenocarpa* (= Chiov., Result. Sc. Miss. Stefanini-Paoli Somal. Ital. I: 134 (1916).

Holotypus: Paoli 858.  
Somalia.

***Kigelia africana* (Lam.) Benth., Niger Fl.: 463 (1849).**

Typus: Thouin s.n. (P-Juss. 4991, holotypus).

Ref.: Tardelli M. & Settesoldi L. in Thulin M. 2006. Fl. of Somalia 3: 303, ♦ 304.

***Kigelia africana* (Lam.) Benth., Niger Fl.: 463 (1849).**

Typus: Thouin s.n. (P-Juss. 4991, holotypus).

Ref.: Tardelli M. & Settesoldi L. in Thulin M. 2006. Fl. of Somalia 3: 303, ♦ 304.

## BOMBACACEAE

*Adansonia somalensis* Chiov., Fl. Somalia II: 29, ♦ 29 (= 1932).

Holotypus: Senni 202.  
Somalia.

***Adansonia digitata* L., Syst. nat. ed. 10, 2: 1144 (1759).**

Typus: LINN 862.1 (LINN lectotypus).

Ref.: Thulin M. 1999. Fl. of Somalia 2: 39, ♦ 39.

## BORAGINACEAE

*Arnebiola migiurtina* Chiov., Fl. Somalia: 227, ♦ t. (= XXIV, f. 1 (1929).

Syntypi: Puccioni & Stefanini 622 [685], 697 [771].  
Somalia.

*Cordia chisimajensis* Chiov., Fl. Somalia II: 311, ♦ 312 (1932).

Holotypus: Senni 534.  
Somalia.

***Arnebia hispidissima* (Sieber ex Lehm.) DC., Prodr. 10: 94 (1846).**

Typus: Sieber & Kohaut s.n. (W holotypus).

Ref.: Thulin M. 2006. Fl. of Somalia 3: 55, ♦ 55.

***Cordia crenata* Delile subsp. *meridionalis* Warfa, Nordic J. Bot. 8 (6): 617, ♦ 616 (1989)**

Typus: Adamson 24 (K holotypus; EA isotypus).

Ref.: Warfa A.M. in Thulin M. 2006. Fl. of Somalia 3: 33.

- Cordia ravae* Chiov., Fl. Somalia II: 310, ♀ 309 (1932).  
 Holotypus: Tozzi 332.  
 Somalia.
- (=) *Cordia goetzei* Gürke, Bot. Jahrb. Syst. 28: 307 (1900).  
 Typus: Goetze 365 (B holotypus, destr.; BR, K isotypus).  
 Ref.: Warfa A.M. in Thulin M. 2006. Fl. of Somalia 3: 33.
- Cordia suckertii* Chiov., Nuovo contr. Fl. Som. Ital.: 13 (1934) (Atti Nat. Mat. Modena 66: 11. 1935).  
 Holotypus: Suckert 61.  
 Somalia.
- Cordia zedamiae* Martelli, Fl. Bogos.: 58 (1886).  
 Holotypus/Isotypus: Beccari 115.  
 Eritrea.
- (=) *Cordia crenata* Delile subsp. **crenata**, Acta Univ. Upsal. 174, III: 5, ♀ f. 1, 2 (1988).  
 Typus: Delile (MPU holotypus).  
 Ref.: Riedl H. & Hedwards S. in Hedberg I., Ensermu Kelbessa, Edwards S., Sebsebe Demissew & Persson E. 2006. Fl. of Ethiopia and Eritrea 5: 70, ♀ 67.
- Cynoglossum densefoliatum* Chiov., Ann. Bot. (Rome) 9 (1): 82 (1911).  
 Holotypus: Chiovenda 2411.  
 Ethiopia.
- Cynoglossum hochstetteri* Vatke var. *calathiforme* Chiov., Ann. Bot. (Rome) 10 (3): 398 (1912).  
 Syntypi: Pappi 3050, 8338, 8672; Terracciano & Pappi 17.  
 Eritrea.
- (=) **Brandella erythraea** (Brand) R.R.Mill, Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh 43 (3): 478 (1986).  
 Typi: Schweinfurth & Riva 615, 1594 (B syntypi, destr.; G isosyntypi).  
 Ref.: Riedl H. & Hedwards S. in Hedberg I., Ensermu Kelbessa, Edwards S., Sebsebe Demissew & Persson E. 2006. Fl. of Ethiopia and Eritrea 5: 94.
- Heliotropium benadirensis* Chiov., Result. Sc. Miss. Stefanini-Paoli Somal. Ital. I: 119 (1916).  
 Lectotypus: Paoli 63 (Förther, 1994. In schedis).  
 Syntypi: Paoli 110, 119, 294.  
 Somalia.
- Heliotropium chiatellinii* Chiov., Fl. Somalia II: 321 (1932).  
 Holotypus: Tozzi 284.  
 Somalia.
- (=) **Heliotropium steudneri** Vatke, Oesterr. Bot. Z. 25: 167 (1875).  
 Typi: Hildebrandt 469, Beccari 145 (B syntypi, destr.; K isosyntypi).  
 Ref.: Thulin M. 2006. Fl. of Somalia 3: 48.
- Heliotropium eduardi* Martelli, Fl. Bogos.: 59 (1886).  
 Holotypus/Isotypus: Beccari 145.  
 Eritrea.
- (=) **Heliotropium steudneri** Vatke, Oesterr. Bot. Z. 25: 167 (1875).  
 Typi: Hildebrandt 469, Beccari 145 (B syntypi, destr.; K isosyntypi).  
 Ref.: Riedl H. & Edwards S. in Hedberg I., Ensermu Kelbessa, Edwards S., Sebsebe Demissew & Persson E. 2006. Fl. of Ethiopia and Eritrea 5: 79, ♀ 80.
- Heliotropium glomeratum* A.Terracc., Bull. Soc. Bot. Ital. 1892: 424 (1892), non A.DC. (1845).  
 Holotypus: Baudi & Candeo s.n.  
 Somalia.
- (=) **Heliotropium personatum** Thulin, Nordic J. Bot. 23 (5): 530, ♀ 531 (2005).  
 Typus: Thulin & Bashir Mohamed 6977 (UPS holotypus; K isotypus).  
 Ref.: Thulin M. 2006. Fl. of Somalia 3: 53, ♀ 52.

- Heliotropium gorinii* Chiov., Fl. Somalia II: 317, ♦ (=) 318 (1932).  
Holotypus: Gorini 492.  
Somalia.
- Heliotropium graminifolium* Chiov., Fl. Somalia II: (=) 319, ♦ 320 (1932).  
Holotypus: Senni 592.  
Somalia.
- Heliotropium lithospermoides* Chiov., Ann. Bot. (Rome) 10 (3): 397 (1912).  
Holotypus: Riva 204.  
Somalia.
- Heliotropium pseudolongiflorum* Chiov., Fl. Somalia II: 315, ♦ 316 (1932).  
Holotypus: Senni 431.  
Somalia.
- Heliotropium sennii* Chiov., Fl. Somalia II: 315, ♦ (=) 314 (1932).  
Lectotypus: Gorini 349 (Förther, 1994. In schedis).  
Syntypi: Gorini 344; Senni 475.  
Somalia.
- Heliotropium steudneri* Vatke var. *oppositifolium* Chiov., Result. Sc. Miss. Stefanini-Paoli Somal. Ital. I: 120 (1916).  
Lectotypus: Paoli 187 (Förther, 1994. In schedis).  
Syntypus: Paoli 1218.  
Somalia.
- Heliotropium steudneri* Vatke var. *oppositifolium* Chiov., Result. Sc. Miss. Stefanini-Paoli Somal. Ital. I: 120 (1916).  
Lectotypus: Paoli 77 (Förther, 1994. In schedis).  
Syntypus: Paoli 85.  
Somalia.
- Heliotropium sudanicum** F.W.Andrews, Kew Bull. 8 (3): 440 (1953).  
Isotypus: Ismail J 45.  
(K holotypus. Andrews, Kew Bull. 8 (3): 440. 1953).  
Sudan.
- Trichodesma cinereum** Mosti & Selvi, Candollea 62 (2): 206, ♦ 207 (2007).  
Holotypus: Raffaelli, Tardelli, Mosti s.n.  
Oman.
- Heliotropium steudneri** Vatke, Oesterr. Bot. Z. 25: 167 (1875).  
Typi: Hildebrandt 469, Beccari 145 (B syntypi, destr.; K isosyntypi).  
Ref.: Thulin M. 2006. Fl. of Somalia 3: 48.
- Heliotropium longiflorum** (A.DC.) Jaub. & Spach, Ill. pl. orient. 4: 96, ♦ t. 360 (1852).  
Typus: Schimper 842 (G holotypus; K isotypus).  
Ref.: Thulin M. 2006. Fl. of Somalia 3: 49, ♦ 47.
- Echiochilon arenarium** (I.M.Johnst.) I.M.Johnst., J. Arnold Arbor. 38: 280 (1957).  
Typus: Hildebrandt 1314 (K lectotypus; BM isolectotypus).  
Ref.: Thulin M. 2006. Fl. of Somalia 3: 55.
- Heliotropium longiflorum** (A.DC.) Jaub. & Spach, Ill. pl. orient. 4: 96, ♦ t. 360 (1852).  
Typus: Schimper 842 (G holotypus; K isotypus).  
Ref.: Thulin M. 2006. Fl. of Somalia 3: 49, ♦ 47.
- Heliotropium strigosum** Willd., Sp. pl. IV, 1 (2): 743 (1798).  
Typus: Isert (B holotypus; C isotypus).  
Ref.: Thulin M. 2006. Fl. of Somalia 3: 51.
- Heliotropium steudneri** Vatke, Oesterr. Bot. Z. 25: 167 (1875).  
Typi: Hildebrandt 469, Beccari 145 (B syntypi, destr.; K isosyntypi).  
Ref.: Thulin M. 2006. Fl. of Somalia 3: 48.
- Heliotropium steudneri** Vatke, Oesterr. Bot. Z. 25: 167 (1875).  
Typi: Hildebrandt 469, Beccari 145 (B syntypi, destr.; K isosyntypi).  
Ref.: Thulin M. 2006. Fl. of Somalia 3: 48.

## BUDDLEJACEAE

- Buddleja polystachya* Fresen. var. *parvifolia* (=) C.Marquand, Bull. Misc. Inform. 1930: 195 (1930).  
Isotypus: Beccari 69.  
(K holotypus. Leeuwenberg, Fl. of Ethiopia and Eritrea 4 (1): 73. 2003).  
Eritrea.
- Buddleja polystachya** Fresen., Flora 21 (1): 605 (1838).  
Typus: Rüppell (FR holotypus).  
Ref.: Leeuwenberg A.J.M. in Hedberg I., Edwards S. & Sileshi Nemomissa 2003. Fl. of Ethiopia and Eritrea 4 (1): 73, ♦ 73.

## BUXACEAE

- Garcinia buxifolia* Chiov., Atti Reale Accad. Ital., (=) *Buxus hildebrandtii* Baill., Adansonia 11: 268  
Mem. Cl. Sci. Fis., Ser. 7, 11 (2): 20 (1940). (1874).  
Holotypus/Isotypus: Reghini 28.  
Ethiopia. Typus: Hildebrandt s.n. (P holotypus).  
Ref.: Verdcourt B. in in Hedberg I. & Edwards  
S. 1989. Fl. of Ethiopia 3: 255 (1989).

## CACTACEAE

### **Rebutia brighignae** Mosti & Papini, Cactus & Co. 9

(1): 60, ♦ 61 (2005).  
Holotypus: Rausch 751, cult. S. Mosti.  
Argentina.

### **Rebutia raffaellii** Mosti & Papini, Cactus & Co. 9

(1): 56, ♦ 57 (2005).  
Holotypus: Rausch 333 c, cult. S. Mosti.  
Argentina.

### **Rebutia rovidana** Mosti & Papini, Cactus & Co. 9

(1): 58, ♦ 59 (2005).  
Holotypus: Rausch 333 b, cult. S. Mosti.  
Argentina.

## CAMPANULACEAE

*Cephalostigma erectum* (Roth ex Roem. & Schult.) Vatke var. *coeruleum* Chiov., Ann. Bot. (Rome) 9 (1): 79 (1911).

Lectotypus: Chiovenda 2015 (Thulin, Symb. Bot. Upsal. 21 (1): 174. 1975).  
Syntypus: Chiovenda 2129.

Ethiopia.

*Cephalostigma erectum* (Roth ex Roem. & Schult.) Vatke var. *luteum* Chiov., Ann. Bot. (Rome) 9 (1): 79 (1911).

Holotypus: Chiovenda 2013.  
Ethiopia.

*Cyphia glandulifera* Hochst. ex A.Rich. f. *obovatifolia* E.Wimm., Pflanzenr. 108 (IV 276 C): 956 (1968).

Isotypus: Gillett 13148.  
(W holotypus. Wimmer, Pflanzenr. 108 (IV 276 C): 956. 1968).  
Kenya.

*Lobelia burttii* E.A.Bruce, Bull. Misc. Inform. 1933: 473 (1933).

Isotypus: Burtt 4049.  
(K holotypus. Thulin, Fl. Trop. East Afr., Lobeliaceae: 17. 1984).  
Tanzania.

(=) *Wahlenbergia hirsuta* (Edgew.) Tuyn, Fl. Males., Ser. 1, 6: 113 (1960), in obs.

Typus: Edgeworth 252 (K holotypus).  
Ref.: Thulin M. in Hedberg I., Ensermu Kelbessa, Edwards S., Sebsebe Demissew, Persson E. 2006. Fl. of Ethiopia and Eritrea 5: 55, ♦ 54.

(=) *Wahlenbergia flexuosa* (Hook. f. & Thomson) Thulin, Symb. Bot. Upsal. 21 (1): 158, ♦ 176 (1975).

Typus: Dalzell s.n. (K holotypus).  
Ref.: Thulin M. in Hedberg I., Ensermu Kelbessa, Edwards S., Sebsebe Demissew, Persson E. 2006. Fl. of Ethiopia and Eritrea 5: 55, ♦ 54.

(=) *Cyphia glandulifera* Hochst. ex A.Rich., Tent. Fl. Abyss. 2: 8 (1850).

Typus: Quartin-Dillon & Petit s.n. (P lectotypus).  
Ref.: Thulin M. in Polhill R.M. 1984. Fl. Trop. East Afr., Lobeliaceae: 50.

(=) *Lobelia deckenii* (Asch.) Hemsl. subsp. *burtii* (E.A.Bruce) Mabberley, Kew Bull. 29 (3): 575 (1974).

Ref.: Thulin M. in Polhill R.M. 1984. Fl. Trop. East Afr., Lobeliaceae: 17.

- Lobelia exilis* Hochst. ex A.Rich. var. *pusilla* E.Wimm., (=) Ann. Naturhist. Mus. Wien 56: 347 (1948).  
Syntypi: Pappi 764; Chiovenda 1455, 1613, 1857, 1686.  
Eritrea and Ethiopia.
- Lobelia rhynchopetalum* Hemsl. subsp. *callosomarginata* E.Wimm., Pflanzenr. 108 (IV 276 C): 884 (1968).  
Isotypus: Mooney 6955.  
(W holotypus. Thulin, Fl. of Ethiopia and Eritrea 5: 40. 2006).  
Ethiopia.
- Lobelia scioensis* Chiov., Ann. Bot. (Rome) 10 (3): (=) 388 (1912).  
Holotypus: Negri 494.  
Ethiopia.
- Lobelia tenerima* Chiov., Ann. Bot. (Rome) 9 (1): (=) 78 (1911).  
Holotypus: Chiovenda 2012.  
Ethiopia.
- Lobelia trialata* D.Don var. *grandiflora* Chiov., (=) Result. Sc. Miss. Stefanini-Paoli Somal. Ital. I: 108 (1916).  
Holotypus: Paoli 755.  
Somalia.
- Monopsis schimperiana* Urb. var. *brevifolia* Chiov., (=) Racc. Miss. Consolata Kenya: 73 (1935).  
Holotypus: Balbo 67\*.  
Kenya.
- Wahlenbergia nutabunda* (Guss.) A.DC. var. (=) *erytraeae* Chiov., Ann. Bot. (Rome) 10 (3): 390 (1912).  
Holotypus: Pappi 8349.  
Eritrea.
- Wahlenbergia sparticula* Chiov., Ann. Bot. (Rome) 10 (3): 389 (1912).  
Holotypus: Negri 639.  
Ethiopia.
- Lobelia exilis*** Hochst. ex A.Rich., Tent. Fl. Abyss. 2: 7 (1850).  
Typi: Quartin-Dillon s.n.; Schimper II: 1182 (P syntypi).  
Ref.: Thulin M. in Hedberg I., Ensermu Kelbessa, Edwards S., Sebsebe Demissew, Persson E. 2006. Fl. of Ethiopia and Eritrea 5: 44.
- Lobelia rhynchopetalum*** Hemsl., in Oliver D., Fl. Trop. Afr. 3: 465 (1877).  
Typus: Rüppell s.n. (FR holotypus).  
Ref.: Thulin M. in Hedberg I., Ensermu Kelbessa, Edwards S., Sebsebe Demissew, Persson E. 2006. Fl. of Ethiopia and Eritrea 5: 40.
- Lobelia holstii*** Engl., Bot. Jahrb. Syst. 19, Beibl. 47: 51 (1894).  
Typi: Hildebrandt 2463; Holst 20, 8960 (B syntypi).  
Ref.: Thulin M. in Hedberg I., Ensermu Kelbessa, Edwards S., Sebsebe Demissew, Persson E. 2006. Fl. of Ethiopia and Eritrea 5: 45.
- Lobelia exilis*** Hochst. ex A.Rich., Tent. Fl. Abyss. 2: 7 (1850).  
Typi: Quartin-Dillon s.n.; Schimper II: 1182 (P syntypi).  
Ref.: Thulin M. in Hedberg I., Ensermu Kelbessa, Edwards S., Sebsebe Demissew, Persson E. 2006. Fl. of Ethiopia and Eritrea 5: 44.
- Lobelia fervens*** Thunb., Fl. capensis 2: 46 (1818).  
Tyus: Herb. Thunberg 21093 (UPS holotypus).  
Ref.: Thulin M. 2006. Fl. of Somalia 4: 461, ♦ 460.
- Monopsis stellaroides*** (C.Presl) Urb. subsp. *schimperiana* (Urb.) Thulin, Bot. Not. 132: 132, ♦ f. 1A, D (1979).  
Typus: Schimper 1146 (B lectotypus; BM, K, W isotypus).  
Ref.: Thulin M. in Polhill R.M. 1984. Fl. Trop. East Afr., Lobeliaceae: 47.
- Wahlenbergia lobelioides*** (L. f.) A.DC. subsp. *nutabunda* (Guss.) Murb., Acta Univ. Lund. 33 (12): 115 (1897).  
Typus: Thomas s.n. (NAP holotypus).  
Ref.: Thulin M. in Hedberg I., Ensermu Kelbessa, Edwards S., Sebsebe Demissew, Persson E. 2006. Fl. of Ethiopia and Eritrea 5: 51.
- Wahlenbergia virgata*** Engl., Pflanzenw. Ost-Afrikas C: 400 (1895).  
Typus: Whyte s.n. (B syntypus, destr.; K lectotypus).  
Ref.: Thulin M. in Hedberg I., Ensermu Kelbessa, Edwards S., Sebsebe Demissew, Persson E. 2006. Fl. of Ethiopia and Eritrea 5: 51, ♦ 52.

## CANELLACEAE

**Warburgia stuhlmannii** Engl., Pflanzen. Ost-Afrikas C: 276 (1895).

Isoneotypus: Gilchrist 1.

(EA neotypus. Verdcourt, Fl. Trop. East Afr., Canellaceae: 1. 1956).

Tanzania.

## CELASTRACEAE

*Cassine aquifolium* Fiori, Nuovo Giorn. Bot. Ital., n.s., Mem. Soc. Bot. Ital. 1915: 50, ♦ 50 (1915).

Lectotypus: Stefanini & Paoli 1007.

Syntypi: Stefanini & Paoli 786 bis, 842, 895. Somalia.

In the protologue there is 'Stefanini & Paoli 855 bis' instead of 'Stefanini & Paoli 842'. The correction of this error is in "Result. Sc. Miss. Stefanini-Paoli Somal. Ital. I: 51 (1916)".

*Elaeodendron albivenosum* Chiov., Fl. Somalia II: 132 (1932).

Holotypus: Senni 275. Somalia.

*Elaeodendron schweinfurthianum* (Loes.) Loes. var. *cyclophyllum* Chiov., Fl. Somalia II: 132 (1932).

Syntypi: Scassellati 218, 219; Senni 41. Somalia.

*Elaeodendron schweinfurthianum* (Loes.) Loes. var. *obovatum* Chiov., Fl. Somalia II: 132 (1932).

Holotypus: Senni 96. Somalia.

*Gymnosporia castellii* Pic.Serm., Miss. Stud. Lago Tana, VII, Ricerche Bot. I: 84, ♦ t. XV (1951).

Holotypus: Pichi Sermolli 2316. Ethiopia.

*Gymnosporia cortii* Pic.Serm., Miss. Stud. Lago Tana, VII, Ricerche Bot. I: 209, ♦ t. XLIV (1951).

Holotypus: Pichi Sermolli 2599. Ethiopia.

*Gymnosporia intermedia* Chiov., Ann. Bot. (Rome) 9 (1): 54 (1911).

Holotypus: Chiovenda 1894. Ethiopia.

(=) *Elaeodendron aquifolium* (Fiori) Chiov., Fl. Somalia: 125, ♦ t. XLVII, f. 1 (1929).

Ref.: Sebsebe Demissew in Thulin M. 1999. Fl. of Somalia 2: 117, ♦ 117.

(=) *Elaeodendron schweinfurthianum* (Loes.) Loes., Nat. Pflanzenfam. III 5 Nachtr. 1: 223 (1897).

Typi: Hildebrandt 1323, 1324 (K isosyntypi). Ref.: Sebsebe Demissew in Thulin M. 1999. Fl. of Somalia 2: 115.

(=) *Elaeodendron schweinfurthianum* (Loes.) Loes., Nat. Pflanzenfam. III 5 Nachtr. 1: 223 (1897).

Typi: Hildebrandt 1323, 1324 (K isosyntypi). Ref.: Sebsebe Demissew in Thulin M. 1999. Fl. of Somalia 2: 115.

(=) *Elaeodendron schweinfurthianum* (Loes.) Loes., Nat. Pflanzenfam. III 5 Nachtr. 1: 223 (1897).

Typi: Hildebrandt 1323, 1324 (K isosyntypi). Ref.: Sebsebe Demissew in Thulin M. 1999. Fl. of Somalia 2: 115.

(=) *Maytenus gracilipes* (Welw. ex Oliv.) Exell subsp. *arguta* (Loes.) Sebsebe, Symb. Bot. Upsal. 25 (2): 53, ♦ 51, 54 (1985).

Typus: Stuhlmann 2464 (B holotypus, destr.; Fredericq in de Witte 8962, K neotypus).

Ref.: Sebsebe Demissew in Hedberg I. & Edwards S. 1989. Fl. of Ethiopia 3: 332.

*Maytenus cortii* (Pic.Serm.) Cufod., Bull. Jard. Bot. État 28 (1), Suppl.: 477 (1958).

Ref.: Sebsebe Demissew in Hedberg I. & Edwards S. 1989. Fl. of Ethiopia 3: 335.

(=) *Maytenus senegalensis* (Lam.) Exell, Bol. Soc. Brot., sér. 2a, 26: 223 (1952).

Typus: A cultivated plant in the Jardin du Roi, seed from Senegal (P-LA holotypus).

Ref.: Sebsebe Demissew in Hedberg I. & Edwards S. 1989. Fl. of Ethiopia 3: 336, ♦ 337.

- Gymnosporia obbiadensis* Chiov., Fl. Somalia: 126 (≡) (1929).  
 Lectotypus: Puccioni & Stefanini 375 [426].  
 Syntypi: Puccioni & Stefanini 434 [486], 590 [645].  
 Somalia.
- Hartogia agrifolia* Chiov., Fl. Somalia: 125, ♀ t. IX, (=) f. 1 (1929).  
 Holotypus: Puccioni & Stefanini 588 [643].  
 Somalia.
- Salacia ekoka** Louis ex R. Wilczek, Bull. Jard. Bot. État 27 (4): 689 (1957).  
 Isotypus: Louis 2155.  
 (BR holotypus. Wilczek, Bull. Jard. Bot. État 27 (4): 689. 1957).  
 Democratic Republic of the Congo.
- Salacia somalensis* Chiov., Fl. Somalia II: 137, ♀ 136, (=) 137 (1932).  
 Holotypus: Tozzi 223.  
 Somalia.
- Scolopia platyphylla* Chiov., Webbia 8 (1): 236 (=) (1951).  
 Syntypi: Corradi 8378, 8380, 8381, 8382, 8383, 8384.  
 Ethiopia.
- Maytenus obbiadensis** (Chiov.) Cufod., Bull. Jard. Bot. État 28 (1), Suppl.: 477 (1958).  
 Ref.: Sebsebe Demissew in Thulin M. 1999. Fl. of Somalia 2: 112.
- Elaeodendron aquifolium** (Fiori) Chiov., Fl. Somalia: 125, ♀ t. XLVII, f. 1 (1929).  
 Typi: Stefanini & Paoli 786 bis, 842, 895 (FT syntypi), Stefanini & Paoli 1007 (FT lectotypus).  
 Ref.: Sebsebe Demissew in Thulin M. 1999. Fl. of Somalia 2: 117.
- Salacia stuhlmanniana** Loes., Bot. Jahrb. Syst. 19: 241 (1894).  
 Typus: Stuhlmann 724 (B holotypus, destr.).  
 Ref.: Sebsebe Demissew in Thulin M. 1999. Fl. of Somalia 2: 118.
- Maytenus undata** (Thunb.) Blakelock, Kew Bull. 11: 237 (1956).  
 Typus: Thunberg 5643 (UPS holotypus).  
 Ref.: Polhill R.M. in Robson N.K.B., Hallé N., Mathew B. & Blakelock R. 1994. Fl. Trop. East Afr., Celastraceae: 18.

## COMBRETACEAE

- Combretum aculeatum* Vent. f. *kotschyana* Almagà, (=) Annuario Reale Ist. Bot. Roma 8 (1): 110 (1903).  
 Syntypi: Terracciano & Pappi 2271, 2443, 2702. Eritrea.
- Combretum aculeatum* Vent. f. *nudiflorum* Almagà, (=) Annuario Reale Ist. Bot. Roma 8 (1): 110 (1903).  
 Lectotypus: Schweinfurth & Riva 2236 (Vollesen, Fl. of Ethiopia and Eritrea 2 (2): 120. 1995, sub holotypus).  
 Syntypi: Terracciano & Pappi 454, 1002, 1030, 2749, 2862; Bartolommei-Gioli 24. Eritrea.
- Combretum aculeatum* Vent. f. *schimperi* Almagà, (=) Annuario Reale Ist. Bot. Roma 8 (1): 110 (1903).  
 Syntypus: Pappi 3095. Eritrea.
- Combretum aculeatum* Vent. f. *stenophyllum* Almagà, (=) Annuario Reale Ist. Bot. Roma 8 (1): 110 (1903).  
 Syntypus: Terracciano & Pappi 860. Eritrea.
- Combretum aculeatum** Vent., Choix pl. t. 58 (1808).  
 Typus: Roussillon s.n. (P-JU holotypus).  
 Ref.: Vollesen K. in Edwards S., Mesfin Tadesse & Hedberg I. 1995. Fl. of Ethiopia and Eritrea 2 (2): 120, ♀ 122.
- Combretum aculeatum** Vent., Choix pl. t. 58 (1808).  
 Typus: Roussillon s.n. (P-JU holotypus).  
 Ref.: Vollesen K. in Edwards S., Mesfin Tadesse & Hedberg I. 1995. Fl. of Ethiopia and Eritrea 2 (2): 120, ♀ 122.
- Combretum aculeatum** Vent., Choix pl. t. 58 (1808).  
 Typus: Roussillon s.n. (P-JU holotypus).  
 Ref.: Vollesen K. in Edwards S., Mesfin Tadesse & Hedberg I. 1995. Fl. of Ethiopia and Eritrea 2 (2): 120, ♀ 122.
- Combretum aculeatum** Vent., Choix pl. t. 58 (1808).  
 Typus: Roussillon s.n. (P-JU holotypus).  
 Ref.: Vollesen K. in Edwards S., Mesfin Tadesse & Hedberg I. 1995. Fl. of Ethiopia and Eritrea 2 (2): 120, ♀ 122.

- Combretum angustipetalum** Chiov., Fl. Somalia II: 215, ♫ 215 (1932).  
 Holotypus: Senni 681.  
 Somalia.
- Combretum bricchettii** Engl. & Diels, Monogr. afrik. Pflanzen-Fam. 3: 34, ♫ t. IX, f. C (1899).  
 Holotypus: Robecchi-Bricchetti 71.  
 Ethiopia.
- Combretum constrictum** (Benth.) M.A.Lawson var. *somalense* Pamp., Bull. Soc. Bot. Ital. 1915: 12 (1915).  
 Syntypi: Paoli 236, 370, 1310.  
 Somalia.
- Combretum copaliferum** Chiov., Fl. Somalia II: 212, ♫ 213 (1932).  
 Holotypus: Senni 266.  
 Somalia.
- Combretum cufodontii** Chiov., Miss. Biol. Borana, Racc. Bot. Angiosp.-Gymnosp.: 146, ♫ 147 (1939).  
 Holotypus: Cufodontis 725.  
 Ethiopia/Kenya border.
- Combretum cyclocarpum** Chiov., Atti Reale Accad. Italia, Mem. Cl. Sci. Fis., Ser. 7: 11 (2): 31 (1940).  
 Holotypus: Massa 250.  
 Ethiopia.
- Combretum hobol** Engl. & Diels, Monogr. afrik. Pflanzen-Fam. 3: 36, ♫ t. XI, f. A (1899).  
 Isotypus: Robecchi-Bricchetti 25.  
 (B holotypus, destr. Thulin, Fl. of Somalia 1: 249, 1993).  
 Somalia.
- Combretum insculptum** Engl. & Diels, Monogr. afrik. Pflanzen-Fam. 3: 36, ♫ t. XI, f. B (1899).  
 Syntypi: Riva 325 (72), 327 (100).  
 Somalia.
- Combretum marchettii** Chiov., Atti Reale Accad. Italia, Mem. Cl. Sci. Fis., Ser. 7: 11 (2): 31 (1940).  
 Holotypus: Marchetti 72.  
 Ethiopia.
- (=) **Combretum molle** R.Br. ex G.Don, Trans. Linn. Soc. London 15: 431 (1827).  
 Typus: Salt s.n. (BM holotypus).  
 Ref.: Vollesen K. in Edwards S., Mesfin Tadesse & Hedberg I. 1995. Fl. of Ethiopia and Eritrea 2 (2): 118, ♫ 121.
- Combretum constrictum** (Benth.) M.A.Lawson, in Oliver D., Fl. Trop. Afr. 2: 423 (1871);  
 Typus: Vogel 39 (K holotypus).  
 Ref.: Thulin M. 1993. Fl. of Somalia 1: 251, ♫ 250.
- (=) **Combretum schumannii** Engl., Pflanzenw. Ost-Afrikas C: 289 (1895).  
 Typus: Holst 2375 (B holotypus, destr.; M lectotypus).  
 Ref.: Thulin M. 1993. Fl. of Somalia 1: 249, ♫ 248.
- (=) **Combretum hereroense** Schinz subsp. *volkensii* (Engl.) Wickens var. *parvifolium* (Engl.) Wickens, Kew Bull. 25: 416 (1971).  
 Typus: Stuhlmann 852 A (B holotypus, destr.).  
 Vollesen K. in Edwards S., Mesfin Tadesse & Hedberg I. 1995. Fl. of Ethiopia and Eritrea 2 (2): 120.
- (=) **Combretum collinum** Fresen. subsp. *binderanum* (Kotschy) Okafor, Bol. Soc. Brot., sér. 2, 41: 141 (1967).  
 Typus: Binder 46 (W holotypus).  
 Ref.: Vollesen K. in Edwards S., Mesfin Tadesse & Hedberg I. 1995. Fl. of Ethiopia and Eritrea 2 (2): 116, ♫ 119.
- (=) **Combretum molle** R.Br. ex G.Don, Trans. Linn. Soc. London 15: 431 (1827).  
 Typus: Salt s.n. (BM holotypus).  
 Ref.: Thulin M. 1993. Fl. of Somalia 1: 249, ♫ 248.
- (=) **Combretum molle** R.Br. ex G.Don, Trans. Linn. Soc. London 15: 431 (1827).  
 Typus: Salt s.n. (BM holotypus).  
 Ref.: Vollesen K. in Edwards S., Mesfin Tadesse & Hedberg I. 1995. Fl. of Ethiopia and Eritrea 2 (2): 118, ♫ 121.
- (=) **Combretum collinum** Fresen. subsp. *binderanum* (Kotschy) Okafor, Bol. Soc. Brot., sér. 2, 41: 141 (1967).  
 Typus: Binder 46 (W holotypus).  
 Ref.: Vollesen K. in Edwards S., Mesfin Tadesse & Hedberg I. 1995. Fl. of Ethiopia and Eritrea 2 (2): 116, ♫ 119.

- Combretum mardaf* Chiov., Fl. Somalia II: 214 (= 1932).  
Holotypus: Scassellati 28 b.  
Somalia.
- Combretum minimipetalum* Chiov., Fl. Somalia: 173 (= 1929).  
Holotypus: Puccioni & Stefanini 248 [276].  
Somalia.
- Combretum multiflorum* Pamp., Bull. Soc. Bot. Ital. 1915: 13 (1915).  
Syntypi: Paoli 665, 1134.  
Somalia.
- Combretum sennii* Chiov., Fl. Somalia II: 211, ♦ 211 (= 1932).  
Holotypus: Senni 54.  
Somalia.
- Combretum stefaninianum* Pamp., Bull. Soc. Bot. Ital. 1915: 13 (1915).  
Syntypi: Paoli 273, 1315.  
Somalia.  
In the protologue there is 'Paoli 373' instead of 'Paoli 273'.
- Combretum trichanthum* Fresen. var. *angustifolium* (= Fiori, Boschi e piante legn. Eritr.: 278, ♦ 278 (1912).  
Holotypus: Fiori 308.  
Eritrea.
- Conocarpus lancifolius** Engl. & Diels, Monogr. afrik. Pflanzen-Fam. 4: 32 (1900).  
Syntypus: Robecchi-Bricchetti 516.  
Somalia.
- Terminalia balladelli* Chiov., Fl. Somalia II: 207, ♦ 208 (1932).  
Holotypus: Balladelli 264.  
Somalia.
- Terminalia brevipes** Pamp., Bull. Soc. Bot. Ital. 1915: 16 (1915).  
Holotypus: Paoli 1339.  
Paratypi: Scassellati 12, 18, 119.  
Somalia.
- Terminalia brownii* Fresen. var. *stenocarpa* Fiori, (= Boschi e piante legn. Eritr.: 274, ♦ 274 (1912).  
Holotypus: Fiori 291.  
Eritrea.
- Combretum angustipetalum** Chiov., Fl. Somalia II: 215, ♦ 215 (1932).  
Typus: Senni 681 (FT holotypus).  
Ref.: Thulin M. 1993. Fl. of Somalia 1: 250, ♦ 248.
- Combretum molle** R.Br. ex G.Don, Trans. Linn. Soc. London 15: 431 (1827).  
Typus: Salt s.n. (BM holotypus).  
Ref.: Thulin M. 1993. Fl. of Somalia 1: 249, ♦ 248.
- Combretum contractum** Engl. & Diels, Bot. Jahrb. Syst. 39: 491 (1907).  
Typus: Kassner 529 (B holotypus, destr.; K isotypus).  
Ref.: Thulin M. 1993. Fl. of Somalia 1: 248, ♦ 248.
- Combretum exalatum** Engl., Pflanzenw. Ost-Afrikas C: 290 (1895).  
Typus: Holst 3559 (B lectotypus, destr.).  
Ref.: Thulin M. 1993. Fl. of Somalia 1: 249, ♦ 248, 250.
- Combretum aculeatum** Vent., Choix pl. t. 58 (1808).  
Typus: Roussillon s.n. (P-JU holotypus).  
Ref.: Thulin M. 1993. Fl. of Somalia 1: 250, ♦ 248.
- Combretum molle** R.Br. ex G.Don, Trans. Linn. Soc. London 15: 431 (1827).  
Typus: Salt s.n. (BM holotypus).  
Ref.: Vollesen K. in Edwards S., Mesfin Tadesse & Hedberg I. 1995. Fl. of Ethiopia and Eritrea 2 (2): 118, ♦ 121.
- Terminalia brevipes** Pamp., Bull. Soc. Bot. Ital. 1915: 16 (1915).  
Typus: Paoli 1339 (FT holotypus).  
Ref.: Thulin M. 1993. Fl. of Somalia 1: 253.
- Terminalia brownii** Fresen., Mus Senckenb. 2: 152, ♦ t. 9, f. 1 (1837).  
Typus: Ruepell s.n. (FR holotypus).  
Ref.: Vollesen K. in Edwards S., Mesfin Tadesse & Hedberg I. 1995. Fl. of Ethiopia and Eritrea 2 (2): 127, ♦ 129.

- Terminalia orbicularis* Engl. & Diels var. *macrocarpa* Engl. & Diels, Monogr. afrik. Pflanzen-Fam. 4: 26 (1900). (=) **Terminalia orbicularis** Engl. & Diels, Monogr. afrik. Pflanzen-Fam. 4: 26, ♦ t. XV, f. A (1900).  
Holotypus: Robecchi-Bricchetti 232.  
Somalia/Ethiopia border.  
Typus: Hildebrandt 2607 (B holotypus, destr.); Gillett 12559 (K neotypus).  
Ref.: Vollesen K. in Edwards S., Mesfin Tadesse & Hedberg I. 1995. Fl. of Ethiopia and Eritrea 2 (2): 124, ♦ 126.
- Terminalia parvula** Pamp., Bull. Soc. Bot. Ital. 1915: 17 (1915).  
Lectotypus: Paoli 580 (Griffiths, J. Linn. Soc. London Botany 55: 835. 1959).  
Syntypi: Paoli 497, 992 a, 992 b.  
Somalia.
- Terminalia polycarpa** Engl. & Diels, Monogr. afrik. Pflanzen-Fam. 4: 24, ♦ t. XII, f. A (1900).  
Lectotypus: Riva 1466 (1620) (838) (Griffiths, J. Linn. Soc. London Botany 55: 843. 1959).  
Syntypus: Riva 1078 (1189) (281).  
Ethiopia.
- Terminalia robecchii* Chiov., Bull. Soc. Bot. Ital. 1917: 52 (1917). (=) **Terminalia spinosa** Engl., Pflanzenw. Ost-Afrikas C: 294 (1895).  
Holotypus: Robecchi-Bricchetti 324.  
Ethiopia.  
Typi: Wakefield s.n.; Stuhlmann I.335 (B syntypus, destr.).  
Ref.: Vollesen K. in Edwards S., Mesfin Tadesse & Hedberg I. 1995. Fl. of Ethiopia and Eritrea 2 (2): 125, ♦ 126.
- Terminalia ruspolii* Engl. & Diels, Monogr. afrik. Pflanzen-Fam. 4: 26, ♦ t. XV, f. B (1900). (=) **Terminalia orbicularis** Engl. & Diels, Monogr. afrik. Pflanzen-Fam. 4: 26, ♦ t. XV, f. A (1900).  
Syntypi: Riva 118, 912.  
Ethiopia.  
Vollesen (Fl. of Ethiopia and Eritrea 2 (2): 124. 1995) quotes only Riva 912 as holotypus.  
Typus: Hildebrandt 2607 (B holotypus, destr.); Gillett 12559 (K neotypus).  
Ref.: Vollesen K. in Edwards S., Mesfin Tadesse & Hedberg I. 1995. Fl. of Ethiopia and Eritrea 2 (2): 124, ♦ 126.
- Terminalia ruspolii* Engl. & Diels var. *macroptera* Pamp., Bull. Soc. Bot. Ital. 1915: 18 (1915). (=) **Terminalia orbicularis** Engl. & Diels, Monogr. afrik. Pflanzen-Fam. 4: 26, ♦ t. XV, f. A (1900).  
Holotypus: Paoli 1131.  
Somalia.  
Typi: Kirk s.n.; Kirk s.n. (K syntypus).  
Ref.: Griffiths M.E. 1959. J. Linn. Soc. London Botany 55: 827.
- Terminalia somalensis* Engl. & Diels, Monogr. afrik. Pflanzen-Fam. 4: 24, ♦ t. X, f. C (1900). (=) **Terminalia prunioides** M.A.Lawson, in Oliver D., Fl. Trop. Afr. 2: 415 (1871).  
Lectotypus: Robecchi-Bricchetti 126 (Griffiths, J. Linn. Soc. London Botany 55: 845. 1959).  
Ethiopia.  
Typi: Kirk s.n.; Kirk s.n. (K syntypus).  
Ref.: Vollesen K. in Edwards S., Mesfin Tadesse & Hedberg I. 1995. Fl. of Ethiopia and Eritrea 2 (2): 125, ♦ 127.

## COMPOSITAE (ASTERACEAE)

- Artemisia afra*** Willd. var. *friesiorum* Chiov., Racc. (=) ***Artemisia afra*** Willd., Sp. pl. IV, 3: 1820 (1803).  
 Miss. Consolata Kenya: 67 (1935). Typus: Van der Schott in Herb. Willd. (B-W holotypus).  
 Syntypus: Balbo 433\*. Ref.: Beentje H.J. in Beentje H.J. & Smith S.A.L. 2002. Fl. Trop. East Afr., Compositae (Part 2): 529, ♫ 530.
- Kenya.  
 The syntype 'Balbo 862' is lacking in FT.
- Artemisia rehan*** Chiov., Osserv. Bot., Agr. e Industr. (=) ***Artemisia absinthium*** L., Sp. pl. 2: 848 (1753).  
 Abiss. Sett.: 33 (1912). Typus: Herb. Clifford: Artemisia 7 (BM lectotypus).  
 Syntypi: Chiovenda 2746; Traversi s.n. Ref.: Mesfin Tadesse in Hedberg I., Friis I. & Edwards S. 2004. Fl. of Ethiopia and Eritrea 4 (2): 223, ♫ 224.
- Aspilia macrorrhiza*** Chiov., Result. Sc. Miss. Stefanini-Paoli Somal. Ital. I: 105 (1916).  
 Holotypus: Paoli 23.  
 Somalia.
- Aspilia ritelli*** Chiov., Fl. Somalia II: 266 (1932). (=) ***Aspilia mossambicensis*** (Oliv.) Wild, Kirkia 5 (2): 221 (1966).  
 Holotypus: Tozzi 280. Typus: Grant s.n. (K holotypus).  
 Somalia. Ref.: Beentje H. in Thulin M. 2006. Flora of Somalia 3: 557, ♫ 557.
- Athroisma boranense*** Cufod., Nuovo Giorn. Bot. Ital., n.s., 50: 108 (1943).  
 Lectotypus (sub holotypus): Cufodontis 402 (Eriksson, Bot. J. Linn. Soc. 119 (2): 147. 1995).  
 Syntypi: Corradi 1892, 2052.  
 Ethiopia.  
 The specimen 'Cufodontis 402' has been published by Lanza (Miss. Biol. Borana, Racc. Bot. Angiosp.-Gymnosp.: 256, ♫ 257. 1939) as the holotype of '*Polycline haareri* Dandy var. *javellensis*'.
- Athroisma boranense*** Cufod. var. *hispidum* Cufod., (=) ***Athroisma boranense*** Cufod., Nuovo Giorn. Bot. Ital., n.s., 50: 108 (1943).  
 Nuovo Giorn. Bot. Ital., n.s., 50: 109 (1943).  
 Lectotypus: Cufodontis 1867 (Eriksson, Bot. J. Linn. Soc. 119 (2): 147. 1995).  
 Syntypus: Corradi 1885.  
 Ethiopia.
- Athroisma pusillum*** T.Eriksson, Bot. J. Linn. Soc. 119 (2): 157, ♫ 159 (1995).  
 Isotypus: Drummond & Hemsley 4073.  
 (K holotypus. T.Eriksson, Bot. J. Linn. Soc. 119 (2): 157. 1995).  
 Kenya.
- Berkheya chiesiana*** Chiov., Ann. Bot. (Rome) 10 (3): 386 (1912).  
 Holotypus: Negri 583.  
 Ethiopia.
- Berkheya spekeana*** Oliv. var. *abyssinica* Fiori, Nuovo Giorn. Bot. Ital., n.s., 47 (1): 46 (1940). (=) ***Berkheya spekeana*** Oliv., Trans. Linn. Soc. London 29 (2): 100 (1873).  
 Syntypus: Saccardo 32; Mariottini 374.  
 Ethiopia.  
 Typus: Grant s.n. (K holotypus).  
 Ref.: Eriksson T. in Hedberg I., Friis I. & Edwards S. 2004. Fl. of Ethiopia and Eritrea 4 (2): 113, ♫ 115.

- Bidens dominici-saccardoi* Fiori, Nuovo Giorn. Bot. Ital., n.s., 47 (1): 45 (1940).  
 Lectotypus: Saccardo 19 (Mesfin Tadesse, Symb. Bot. Upsal. 24 (1): 107. 1984).  
 Syntypus: Saccardo 20.  
 Ethiopia.
- Bidens hildebrandtii* O.Hoffm. var. *boranensis* Lanza, Miss. Biol. Borana, Racc. Bot. Angiosp.-Gymnosp.: 263, ♦ 264 (1939).  
 Holotypus: Cufodontis 682.  
 Ethiopia.
- Bidens kirkii* (Oliv. & Hiern) Sherff var. *ciliatovaginata* Cufod., Nuovo Giorn. Bot. Ital., n.s., 50: 110 (1943).  
 Holotrypus: Corradi 1899.  
 Ethiopia.
- Bidens zavattarii** Cufod., Nuovo Giorn. Bot. Ital., n.s., 50: 111 (1943).  
 Lectotypus: Corradi 2062 (Mesfin Tadesse, Symb. Bot. Upsal. 24 (1): 90. 1984).  
 Syntypi: Corradi 2067, 2070.  
 Ethiopia.
- Bidens zavattarii* Cufod. var. *latisecta* Cufod., Nuovo Giorn. Bot. Ital., n.s., 50: 117 (1943).  
 Holotypus: Cufodontis 543.  
 Ethiopia.
- Blainvillea dalla-vedovae* A.Terracc., Annuario Reale Ist. Bot. Roma 5 (3): 107 (1894).  
 Holotypus: Terracciano 1196.  
 Eritrea.
- Blainvillea gayana* Cass. var. *lanceolata* Chiov., Annuario Reale Ist. Bot. Roma 8 (2): 182 (1904).  
 Holotypus: Pappi 2943.  
 Eritrea.
- Blepharispermum ellenbeckii** Cufod., Nuovo Giorn. Bot. Ital., n.s., 50: 107 (1943).  
 Lectotypus: Corradi 2129 (Eriksson, Pl. Syst. Evolution 182 (3-4): 195. 1992).  
 Syntypi: Corradi 2128, 2130, 2131.  
 Ethiopia.
- Blepharispermum fruticosum* Klatt var. *lapathifolium* Chiov., Fl. Somalia: 200 (1929).  
 Holotypus: Paoli 1071.  
 Somalia.
- (=) **Bidens somaliensis** Sherff, Bot. Gaz. 90 (4): 395 (1930).  
 Typus: Riva 1306 (FT holotypus).  
 Ref.: Mesfin Tadesse in Hedberg I., Friis I. & Edwards S. 2004. Fl. of Ethiopia and Eritrea 4 (2): 333, ♦ 334.
- (=) **Bidens hildebrandtii** O.Hoffm., Bot. Jahrb. Syst. 20: 234 (1894).  
 Typus: Hildebrandt 2432 (B holotypus, destr.; K lectotypus).  
 Ref.: Mesfin Tadesse in Hedberg I., Friis I. & Edwards S. 2004. Fl. of Ethiopia and Eritrea 4 (2): 325.
- (=) **Bidens flagellata** (Sherff) Mesfin, Symb. Bot. Upsal. 24 (1): 94 (1984).  
 Typus: Muller 50 (BR holotypus).  
 Ref.: Mesfin Tadesse in Hedberg I., Friis I. & Edwards S. 2004. Fl. of Ethiopia and Eritrea 4 (2): 324.
- (=) **Bidens zavattarii** Cufod., Nuovo Giorn. Bot. Ital., n.s., 50: 111 (1943).  
 Typus: Corradi 2062 (FT lectotypus).  
 Ref.: Mesfin Tadesse in Hedberg I., Friis I. & Edwards S. 2004. Fl. of Ethiopia and Eritrea 4 (2): 335.
- (=) **Blainvillea rhomboidea** Cass., Dict. sci. nat. ed. 2, 29: 493 (1823).  
 Typus: Brazil, Rio de Janeiro.  
 Ref.: Mesfin Tadesse in Hedberg I., Friis I. & Edwards S. 2004. Fl. of Ethiopia and Eritrea 4 (2): 299.
- (=) **Blainvillea rhomboidea** Cass., Dict. sci. nat. ed. 2, 29: 493 (1823).  
 Typus: Brazil, Rio de Janeiro.  
 Ref.: Mesfin Tadesse in Hedberg I., Friis I. & Edwards S. 2004. Fl. of Ethiopia and Eritrea 4 (2): 299.
- (=) **Blepharispermum villosum** O.Hoffm., Bot. Jahrb. Syst. 38: 202 (1906).  
 Typus: Ellenbeck 2001 (W lectotypus).  
 Ref.: Eriksson T. in Thulin M. 2006. Flora of Somalia 3: 543, ♦ 543.

- Blepharispermum lanceolatum* Chiov., Result. Sc. (=) Miss. Stefanini-Paoli Somal. Ital. I: 104 (1916).  
Holotypus: Paoli 939.  
Somalia.
- Blepharispermum obovatum** Chiov., Atti Reale Accad. Italia, Mem. Cl. Sci. Fis., Ser. 7, 11 (2): 38 (1940).  
Lectotypus/Isolectotypus: Berardelli & Reghini 36 (Eriksson, Pl. Syst. Evolution 182 (3-4): 186. 1992).  
Syntypus/Isosyntypus: Berardelli & Reghini 21. Ethiopia.
- Blumea microphylla* Chiov., Fl. Somalia II: 260 (=) (1932).  
Lectotypus: Puccioni & Stefanini 187 [211] (Thulin, Nordic J. Bot. 22 (6): 664. 2004).  
Syntypus: Senni 705.  
Somalia.
- Blumea pappii* Gand., Bull. Soc. Bot. France 65: 39 (=) (1918).  
Holotypus: Pappi 6401.  
Eritrea.
- Blumea serrata* Chiov., Fl. Somalia II: 259, ♫ 260 (=) (1932).  
Holotypus: Senni 773.  
Somalia.
- Bothriocline angelinii* Fiori, Nuovo Giorn. Bot. Ital., (=) n.s., 47 (1): 43 (1940).  
Holotypus: Saccardo 18.  
Ethiopia.
- Carduus eremocephalus* Chiov., Ann. Bot. (Rome) 10 (3): 387 (1912).  
Syntypi: Negri 51, 309.  
Ethiopia.
- Carduus semiensis* Pic.Serm., Miss. Stud. Lago Tana, (=) VII, Ricerche Bot. I: 234, ♫ t. LVI (1951).  
Holotypus/Isotypus: Pichi Sermolli 2625.  
Ethiopia.
- Centaurea hochstetteri* Oliv. & Hiern subsp. (=) *boranensis* Cufod., Nuovo Giorn. Bot. Ital., n.s., 50: 115 (1943).  
Syntypi: Corradi 1738, 1942, 1981, 1987, 1998, 2003.  
Ethiopia.
- Blepharispermum fruticosum** Klatt, Bull. Herb. Boissier 3: 429 (1895).  
Typus: Keller 23 (Z lectotypus).  
Ref.: Eriksson T. in Thulin M. 2006. Flora of Somalia 3: 542, ♫ 542.
- Plucheia somaliensis** (Thell.) Thulin, Nordic J. Bot. 22 (6): 664 (2004).  
Typus: Keller 9 (Z lectotypus).  
Ref.: King-Jones S. & Thulin M. in Thulin M. 2006. Flora of Somalia 3: 500.
- Pseudoconyzia viscosa** (Mill.) D'Arcy, Phytologia 25 (5): 281 (1973).  
Typus: Houston s.n. (BM holotypus).  
Ref.: Mesfin Tadesse in Hedberg I., Friis I. & Edwards S. 2004. Fl. of Ethiopia and Eritrea 4 (2): 139, ♫ 141.
- Plucheia kelleri** (Thell.) Thulin, Nordic J. Bot. 22 (6): 662 (2004).  
Typus: Keller 21/2 (Z holotypus).  
Ref.: King-Jones S. & Thulin M. in Thulin M. 2006. Flora of Somalia 3: 497.
- Bothriocline schimperi** Oliv. & Hiern ex Benth., Hooker's Icon. Pl. t. 1133, ♫ t. 1133 (1873).  
Typus: Schimper 1497 (BM holotypus).  
Ref.: Mesfin Tadesse in Hedberg I., Friis I. & Edwards S. 2004. Fl. of Ethiopia and Eritrea 4 (2): 106, ♫ 108.
- Carduus schimperi** Sch.Bip., Linnaea 19: 334 (1847).  
Typus: Schimper 1301 (P holotypus; BM, K, L, M, P, S, UPS, isotypus).  
Ref.: Mesfin Tadesse in Hedberg I., Friis I. & Edwards S. 2004. Fl. of Ethiopia and Eritrea 4 (2): 24, ♫ 25.
- Carduus leptacanthus** Fresen., Mus. Senckenberg. 3: 70 (1840).  
Typus: Rüppel s.n. (FR holotypus; P isotypus).  
Ref.: Mesfin Tadesse in Hedberg I., Friis I. & Edwards S. 2004. Fl. of Ethiopia and Eritrea 4 (2): 27, ♫ 25.
- Volutaria boranensis** (Cufod.) Wagenitz, Candollea 46 (2): 408 (1991).  
Ref.: Mesfin Tadesse in Hedberg I., Friis I. & Edwards S. 2004. Fl. of Ethiopia and Eritrea 4 (2): 35, ♫ 36.

- Cineraria schimperi* Sch.Bip. ex Oliv. & Hiern var. *simplicifolia* Schweinf. ex Lanza, Miss. Biol. Borana, Racc. Bot. Angiosp.-Gymnosp.: 265 (1939).  
 Holotypus/Isotypus: Cufodontis 396.  
 Ethiopia.
- (=) **Senecio lytatus** Forssk., Fl. Aegypt.-Arab.: 148 (1775).  
 Typi: Forsskål 1720, 1721 (C syntypi).  
 Ref.: Mesfin Tadesse in Hedberg I., Friis I. & Edwards S. 2004. Fl. of Ethiopia and Eritrea 4 (2): 246, ♦ 247.
- Conyza atrixioides** Chiov., Bull. Soc. Bot. Ital. 1924: 42 (1924).  
 Holotypus: Mazzocchi-Alemanni 230.  
 Angola.
- Conyza megensis** F.G.Davies, Kew Bull. 34 (2): 371 (1979).  
 Isotypus: Gillett 14388.  
 (K holotypus. Davies, Kew Bull. 34 (2): 371. 1979).  
 Ethiopia.
- Conyza messerii** Pic.Serm., Miss. Stud. Lago Tana, VII, Ricerche Bot. I: 226, ♦ t. LII (1951).  
 Holotypus: Pichi Sermolli 2636.  
 Ethiopia.
- Conyza nana** Sch.Bip. ex Oliv. & Hiern, in Oliver D., Fl. Trop. Afr. 3: 315 (1877).  
 Isotypus: Schimper II 1170.  
 (P holotypus. Mesfin Tadesse, Fl. of Ethiopia and Eritrea 4 (2): 206. 2004).  
 Ethiopia.
- Conyza schimperi** Sch.Bip. ex A.Rich., Tent. Fl. abyss. 1: 386 (1847).  
 Isotypus: Schimper I 121.  
 (P holotypus. Mesfin Tadesse, Fl. of Ethiopia and Eritrea 4 (2): 209. 2004).  
 Ethiopia.
- Conyza sennii** Chiov., Atti Reale Accad. Italia, Mem. Cl. Sci. Fis., Ser. 7, 11 (2): 37 (1940).  
 Holotypus: Senni 852.  
 Ethiopia.
- Conyza variegata* Sch.Bip. ex A.Rich. var. *pseudohochstetteri* Chiov., Annuario Reale Ist. Bot. Roma 8 (2): 168 (1904).  
 Holotypus: Pappi 4413.  
 Eritrea.
- (=) **Conyza variegata** Sch.Bip. ex A.Rich., Tent. Fl. Abyss. 1: 389 (1848).  
 Typus: Schimper 1385 (P holotypus).  
 Ref.: Mesfin Tadesse in Hedberg I., Friis I. & Edwards S. 2004. Fl. of Ethiopia and Eritrea 4 (2): 207.
- (≡) **Bidens setigera** (Sch.Bip.) Sherff subsp. **bipinnato-partita** (Chiov.) Mesfin, Symb. Bot. Upsal. 24 (1): 71 (1984).  
 Ref.: Mesfin Tadesse in Hedberg I., Friis I. & Edwards S. 2004. Fl. of Ethiopia and Eritrea 4 (2): 333.
- Coreopsis abyssinica** Sch.Bip. ex Walp. var. *bipinnato-partita* Chiov., Annuario Reale Ist. Bot. Roma 8 (2): 185 (1904).  
 Holotypus: Schweinfurth & Riva 2119.  
 Eritrea.
- (=) **Bidens pachyloma** (Oliv. & Hiern) Cufod., Bull. Jard. Bot. Natl. Belg. 37 (3): 1139 (1967).  
 Typus: Schimper 933 (K holotypus).  
 Ref.: Mesfin Tadesse in Hedberg I., Friis I. & Edwards S. 2004. Fl. of Ethiopia and Eritrea 4 (2): 328, ♦ 329.

- Coreopsis chrysoteroarpa* Chiov., Ann. Bot. (Rome) 9 (1): 75 (1911).  
 Holotypus. Pappi 7733.  
 Eritrea.
- Coreopsis heterocarpa* Chiov., Ann. Bot. (Rome) 9 (1): 75 (1911).  
 Lectotypus: Chiovenda 1953 (Mesfin Tadesse, Symb. Bot. Upsal. 24 (1): 51. 1984).  
 Syntypi: Chiovenda 1090, 1148, 1869, 1954, 1955.  
 Ethiopia.  
 The exsiccatum pro syntype 'Chiovenda 970' is instead '*Bidens pachyloma* (Oliv. & Hiern) Cufod.'
- Coreopsis macroptera* Sch.Bip. ex Chiov., Annuario Reale Ist. Bot. Roma 8 (2): 184 (1904).  
 Holotypus: Terracciano & Pappi 2474.  
 Eritrea.
- Coreopsis negriana* Sherff, Bot. Gaz. 90 (4): 397 (1930).  
 Holotypus: Negri 925 bis.  
 Ethiopia.
- Dicoma alemannii-mazzocchii** Chiov., Bull. Soc. Bot. Ital.: 43 (1924).  
 Syntypi: Mazzocchi-Alemanni 120, 217.  
 Angola.
- Echinops boranensis* Lanza, Miss. Biol. Borana, Racc. Bot. Angiosp.-Gymnosp.: 267, ♫ 269 (1939).  
 Holotypus/Isotypus: Cufodontis 191.  
 Ethiopia.
- Echinops boranensis* Lanza var. *minor* Cufod., Nuovo Giorn. Bot. Ital., n.s., 50: 115 (1943).  
 Holotypus: Corradi 1970.  
 Ethiopia.
- Echinops francinianus* Pic.Serm., Miss. Stud. Lago Tana, VII, Ricerche Bot. I: 165, ♫ t. XXXIV (1951).  
 Holotypus: Pichi Sermolli 2175.  
 Ethiopia.
- Echinops gondarensis* Chiov., Ann. Bot. (Rome) 9 (1): 77 (1911).  
 Holotypus: Chiovenda 1413.  
 Ethiopia.
- Bidens borianiana** (Sch.Bip. ex Schweinf. & Asch.) Cufod., Bull. Jard. Bot. Natl. Belg. 37 (3): 1136 (1967).  
 Typus: Boriani 42 (W holotypus).  
 Ref.: Mesfin Tadesse in Hedberg I., Friis I. & Edwards S. 2004. Fl. of Ethiopia and Eritrea 4 (2): 321.
- Bidens prestinaria** (Sch.Bip.) Cufod., Bull. Jard. Bot. Natl. Belg. 37 (3): 1140 (1967).  
 Typus: Schimper 62 (P lectotypus).  
 Ref.: Mesfin Tadesse in Hedberg I., Friis I. & Edwards S. 2004. Fl. of Ethiopia and Eritrea 4 (2): 330, ♫ 330.
- Bidens macroptera** (Sch.Bip. ex Chiov.) Mesfin, Symb. Bot. Upsal. 24 (1): 48, ♫ 50 (1984).  
 Ref.: Mesfin Tadesse in Hedberg I., Friis I. & Edwards S. 2004. Fl. of Ethiopia and Eritrea 4 (2): 326, ♫ 326.
- Bidens negriana** (Sherff) Cufod., Bull. Jard. Bot. Natl. Belg. 37 (3): Suppl. 1139 (1967).  
 Ref.: Mesfin Tadesse in Hedberg I., Friis I. & Edwards S. 2004. Fl. of Ethiopia and Eritrea 4 (2): 327.
- Echinops pappii** Chiov., Ann. Bot. (Rome) 9 (1): 76 (1911).  
 Typi: Pappi 6848, 6849, 6852 (FT syntypi).  
 Ref.: Mesfin Tadesse in Hedberg I., Friis I. & Edwards S. 2004. Fl. of Ethiopia and Eritrea 4 (2): 21.
- Echinops pappii** Chiov., Ann. Bot. (Rome) 9 (1): 76 (1911).  
 Typi: Pappi 6848, 6849, 6852 (FT syntypi).  
 Ref.: Mesfin Tadesse in Hedberg I., Friis I. & Edwards S. 2004. Fl. of Ethiopia and Eritrea 4 (2): 21.
- Echinops giganteus** A.Rich., Tent. Fl. Abyss. 1: 449 (1848).  
 Typus: Quartin-Dillon & Petit 628 (P holotypus).  
 Ref.: Mesfin Tadesse in Hedberg I., Friis I. & Edwards S. 2004. Fl. of Ethiopia and Eritrea 4 (2): 19.
- Echinops hispidus** Fresen., Mus. Senckenberg. 3: 68 (1840).  
 Typus: Rüppell s.n. (FR holotypus; P isotypus).  
 Ref.: Mesfin Tadesse in Hedberg I., Friis I. & Edwards S. 2004. Fl. of Ethiopia and Eritrea 4 (2): 20, ♫ 18.

- Echinops macrochaetus* Fresen. var. *pseudoviscosus* (=) *Echinops macrochaetus* Fresen., Mus. Senckenberg. 3: 69 (1840).  
 Fiori, Nuovo Giorn. Bot. Ital. 20: 392 (1913).  
 Holotypus: Fiori 1870.  
 Eritrea.
- Echinops negrii* Chiov., Ann. Bot. (Rome) 9 (1): 77 (=) *Echinops giganteus* A.Rich., Tent. Fl. Abyss. 1: 449 (1848).  
 (1911).  
 Holotypus: Chiovenda 3185.  
 Ethiopia.
- Echinops nistrii* Pic.Serm., Miss. Stud. Lago Tana, VII, Ricerche Bot. I: 167, ♫ t. XXXV (1951). (=) *Echinops giganteus* A.Rich., Tent. Fl. Abyss. 1: 449 (1848).  
 Holotypus: Pichi Sermolli 2174.  
 Ethiopia.
- Echinops pappii* Chiov., Ann. Bot. (Rome) 9 (1): 76 (1911).  
 Syntypi: Pappi 6848, 6849, 6852.  
 Ethiopia.
- Echinops spinosus* L. var. *homoiolepis* Chiov., Annuario Reale Ist. Bot. Roma 8 (2): 193 (1904). (=) *Echinops pappii* Chiov., Ann. Bot. (Rome) 9 (1): 76 (1911).  
 Syntypi: Terracciano & Pappi 359, 1324, 1980, 1988; Pappi 3839; Ragazzi 213.  
 Eritrea.
- Erlangea benadiriana* Fiori, Bull. Soc. Bot. Ital. 1913: 49 (1913). (=) *Erlangea smithii* S.Moore, J. Linn. Soc., Bot. 35: 307 (1902).  
 Holotypus/Isotypus: Fiori 52.  
 Somalia.
- Erlangea boranensis* S.Moore var. *major* Lanza, Miss. Biol. Borana, Racc. Bot. Angiosp.-Gymnosp.: 244 (1939). (=) *Gutenbergia boranensis* (S.Moore) M.G.Gilbert, Kew Bull. 36 (3): 594 (1981).  
 Holotypus: Cufodontis 421.  
 Ethiopia.
- Erlangea conica* Chiov., Fl. Somalia II: 257, ♫ 258 (1932). (=) *Erlangea smithii* S.Moore, J. Linn. Soc., Bot. 35: 307 (1902).  
 Holotypus/Isotypus: Confalone 20.  
 Somalia.
- Erlangea cordifolia* (Benth. Ex Oliv.) S.Moore var. *fimbriata* O.Hoffm. & Muschl., Bot. Jahrb. Syst. 46: 65 (1911). (=) *Gutenbergia boranensis* (S.Moore) M.G.Gilbert, Kew Bull. 36 (3): 594 (1981).  
 Holotypus: Riva 606 (1153).  
 Ethiopia.

- Erlangea cordifolia*** (Benth. Ex Oliv.) S.Moore var. *humilis* Cufod., Nuovo Giorn. Bot. Ital., n.s., 50: 101 (1943).  
Syntypi: Corradi 1713, 1755, 1756, 1872, 2031. Ethiopia.
- Erlangea paleacea*** Chiov., Racc. Miss. Consolata Kenya: 58 (1935).  
Holotypus: Balbo 95\*. Kenya.
- Felicia negelliensis*** Cufod., Nuovo Giorn. Bot. Ital., n.s., 50: 104 (1943).  
Syntypi: Corradi 1952, 1957, 1967, 1986, 1999, 2000; Cufodontis 166. Ethiopia.
- Filago evacoides*** Chiov., Atti Reale Accad. Italia, Mem. Cl. Sci. Fis., Ser. 7, 11 (2): 39 (1940).  
Holotypus/Isotypus: Senni 1732. Ethiopia.
- Gazania beguinotii*** Lanza, Miss. Biol. Borana, Racc. Bot. Angiosp.-Gymnosp.: 267, ♫ 268 (1939).  
Holotypus/Isotypus: Cufodontis 631. Ethiopia.
- Gnaphalium dominici-saccardoi*** Fiori, Nuovo Giorn. Bot. Ital., n.s., 47 (1): 44 (1940).  
Holotypus: Saccardo 13. Ethiopia.
- Gongrothamnus corradianus*** Cufod., Nuovo Giorn. Bot. Ital., n.s., 50: 111 (1943).  
Syntypi: Corradi 1779, 1910, 2090, 2091, 2092, 2093, 2098, 2106, 2127. Ethiopia.
- Guizotia arborescens*** Friis, Norweg. J. Bot. 18 (3-4): 231 (1971).  
Isotypus: Friis, Hounde & Jacobsen 504.  
(C holotypus. Mesfin Tadesse, Fl. of Ethiopia and Eritrea 4 (2): 314. 2004). Ethiopia.
- Guizotia schultzii*** Hochst. ex Sch.Bip., Walp. Repert. 6: 158 (1846), nom. illeg.  
Isolectotypus: Schimper I 350 (TUB lectotypus. Mesfin Tadesse, Fl. of Ethiopia and Eritrea 4 (2): 310. 2004). Ethiopia.
- Gutenbergia boranensis*** (S.Moore) M.G.Gilbert, Kew Bull. 36 (3): 594 (1981).  
Typus: Donaldson-Smith s.n. (BM holotypus). Ref.: Mesfin Tadesse in Hedberg I., Friis I. & Edwards S. 2004. Fl. of Ethiopia and Eritrea 4 (2): 104, ♫ 105.
- Felicia abyssinica*** Sch.Bip. ex A.Rich. var. ***negelliensis*** (Cufod.) Mesfin, Compositae Newslett. 33: 24 (1999).  
Ref.: Mesfin Tadesse in Hedberg I., Friis I. & Edwards S. 2004. Fl. of Ethiopia and Eritrea 4 (2): 198.
- Filago abyssinica*** Sch.Bip. ex A.Rich., Tent. Fl. Abyss. 1: 432 (1848).  
Typus: Schimper 1913 (P holotypus; K isotypus).  
Ref.: Mesfin Tadesse in Hedberg I., Friis I. & Edwards S. 2004. Fl. of Ethiopia and Eritrea 4 (2): 184.
- Hirpicium beguinotii*** (Lanza) Cufod., Bull. Jard. Bot. Natl. Belg. 37: Suppl., 1168 (1967).  
Ref.: Mesfin Tadesse in Hedberg I., Friis I. & Edwards S. 2004. Fl. of Ethiopia and Eritrea 4 (2): 116, ♫ 117.
- Helichrysum globosum*** A.Rich., Tent. Fl. Abyss. 1: 425 (1848).  
Typus: Schimper 988 (P holotypus; BM, K, isotypus).  
Ref.: Mesfin Tadesse in Hedberg I., Friis I. & Edwards S. 2004. Fl. of Ethiopia and Eritrea 4 (2): 175.
- Distephanus divaricatus*** (Steetz) H.Rob. & B.Kahn, Proc. Biol. Soc. Wash. 99 (3): 499 (1986).  
Typus: Peters s.n. (B holotypus, destr.).  
Ref.: Mesfin Tadesse in Hedberg I., Friis I. & Edwards S. 2004. Fl. of Ethiopia and Eritrea 4 (2): 102.
- Guizotia scabra*** (Vis.) Chiov., Annuario Reale Ist. Bot. Roma 8 (2): 184 (1904).  
Typus: Kotschy 501 (?).  
Ref.: Mesfin Tadesse in Hedberg I., Friis I. & Edwards S. 2004. Fl. of Ethiopia and Eritrea 4 (2): 310, ♫ 311.

- Guizotia zavattarii** Lanza, Miss. Biol. Borana, Racc.  
Bot. Angiosp.-Gymnosp.: 258, ♦ 259 (1939).  
Holotypus/Isotypus: Cufodontis 404.  
Ethiopia.
- Guizotia zavattarii* Lanza var. *angustata* Cufod., ( = ) **Guizotia zavattarii** Lanza, Miss. Biol. Borana, Racc.  
Nuovo Giorn. Bot. Ital., n.s., 50: 110 (1943).  
Holotypus: Corradi 1964.  
Ethiopia.
- Guizotia zavattarii* Lanza var. *hirsutissima* Cufod., ( = ) **Guizotia zavattarii** Lanza, Miss. Biol. Borana, Racc.  
Nuovo Giorn. Bot. Ital., n.s., 50: 110 (1943).  
Syntypi: Corradi 1750, 1866, 1868.  
Ethiopia.
- Guizotia zavattarii* Lanza var. *opima* Lanza, Miss. Biol. Borana, Racc. Bot. Angiosp.-Gymnosp.: 260, ♦ 261 (1939).  
Holotypus/Isotypus: Cufodontis 518.  
Ethiopia.
- Gutenbergia pumila** Chiov., Result. Sc. Miss. Stefanini-Paoli Somal. Ital. I: 100 (1916).  
Holotypus: Paoli 19.  
Somalia.
- Helichrysum arbuscula** Chiov., Result. Sc. Miss. Stefanini-Paoli Somal. Ital. I: 103 (1916).  
Holotypus: Paoli 586.  
Somalia.
- Helichrysum arussense** Chiov., Ann. Bot. (Rome) 10 (3): 385 (1912).  
Lectotypus: Negri 1064 (Mesfin Tadesse, Fl. of Ethiopia and Eritrea 4 (2): 172. 2004).  
Syntypus: Negri 866.  
Ethiopia.
- Helichrysum foetidum* (L.) Moench var. *intermedia* Chiov., Annuario Reale Ist. Bot. Roma 8 (2): 177 (1904).  
Syntypi: Terracciano & Pappi 1440, 3328.  
Eritrea.
- ( = ) **Helichrisum foetidum** (L.) Moench, Methodus: 575 (1794).  
Typus: Herb. Clifford: 402, "Gnaphalium 13", fol. 8 (BM lectotypus).  
Ref.: Mesfin Tadesse in Hedberg I., Friis I. & Edwards S. 2004. Fl. of Ethiopia and Eritrea 4 (2): 176, ♦ 177.
- Helichrysum funereum** Chiov., Racc. Miss. Consolata Kenya: 65 (1935).  
Holotypus: Balbo 120\*.  
Kenya.
- Helichrysum gloria-dei** Chiov., Racc. Miss. Consolata Kenya: 67 (1935).  
Holotypus: Balbo 104\*.  
Kenya.

- Helichrysum luzuloides* (Sch.Bip. ex Vatke) Lanza (=)  
var. *mutable* Lanza, Miss. Biol. Borana, Racc. Bot.  
Angiosp.-Gymnosp.: 254, ♀ 255 (1939).  
Holotypus/Isotypus: Cufodontis 466.  
Ethiopia.
- Helichrysum traversii** Chiov., Ann. Bot. (Rome) 9  
(1): 72 (1911).  
Holotypus: Traversi s.n.  
Ethiopia.
- Homochroma angolensis* Chiov., Bull. Soc. Bot. Ital. (≡)  
1924: 43 (1924).  
Holotypus: Mazzocchi-Alemanni 78.  
Angola.
- Kleinia negrii** Cufod., Nuovo Giorn. Bot. Ital., n.s.,  
50: 113 (1943).  
Holotypus: Corradi 1934.  
Ethiopia.
- Kleinia polycotoma* Chiov., Fl. Somalia: 205, ♀ t. (=)  
XXII, f. 4 (1929).  
Syntypi: Puccioni & Stefanini 39 [39], 941  
[1036], 983 [1080].  
Somalia.
- Kleinia squarrosa** Cufod., Nuovo Giorn. Bot. Ital.,  
n.s., 50: 114 (1943).  
Lectotypus: Corradi 1654 (Jeffrey, Kew Bull. 41  
(4): 925. 1986).  
Syntypi: Corradi 1668, 1775, 2016, 2017, 2018,  
2019.  
Ethiopia.  
There are two other specimens quoted by  
Cufodontis as syntypes: Corradi 1796 and 1931.  
Corradi 1931 is '*Kleinia odora*'; Corradi 1796 is  
'*Kleinia sp.*' (fide Jeffrey).
- Kleinia triantha** Chiov., Fl. Somalia II: 268 (1932).  
Holotypus: Senni 649.  
Somalia.
- Lactuca boranensis* Cufod., Nuovo Giorn. Bot. Ital., (=)  
n.s., 50: 115 (1943).  
Lectotypus: Corradi 1736 (Cufodontis, Bull.  
Jard. Bot. Natl. Belg. 37, Suppl.: 1182. 1967).  
Syntypi: Corradi 1877, 1878, 1879, 1906.  
Ethiopia.
- Lactuca goraeensis* (Lam.) Sch.Bip. var. *effusa* Chiov., (=)  
Annuario Reale Ist. Bot. Roma 8 (2): 197 (1904).  
Syntypi: Terracciano 596; Pappi 3285.  
Eritrea.  
In the protologue instead of 'Terracciano 596'  
there is 'Terracciano 576'.
- Helichrysum glumaceum** DC., Prodr. 6: 197  
(1838).  
Typus: Perrottet s.n. (G-DC holotypus; P  
isotypus).  
Ref.: Mesfin Tadesse in Hedberg I., Friis I. &  
Edwards S. 2004. Fl. of Ethiopia and Eritrea 4 (2):  
171.
- Zyphelia angolensis** (Chiov.) G.L.Nesom,  
Phytologia 76 (2): 91 (1994).  
Ref.: Nesom G.L. in Warnock J. 1994. Phytologia  
76 (2): 91.
- Kleinia odora** (Forssk.) DC., Prodr. 6: 339  
(1838).  
Typus: Forsskål 1030 (C holotypus).  
Ref.: Thulin M. 2006. Flora of Somalia 3: 535.
- Launaea pseudoabyssinica** (Chiov.) N.Kilian,  
Englera 17: 259 (1997).  
Typi: Schweinfurth & Riva 2054; Terracciano  
& Pappi 626 (FT syntypi).  
Ref.: Mesfin Tadesse in Hedberg I., Friis I. &  
Edwards S. 2004. Fl. of Ethiopia and Eritrea 4 (2):  
62.
- Launaea intybacea** (Jacq.) Beauverd, Bull. Soc.  
Bot. Genève, sér. 2, 2: 114 (1910).  
Typus: cult. from seed collected in Central  
America, Jacquin anno 1782 (LE lectotypus,  
chosen by Kilian).  
Ref.: Mesfin Tadesse in Hedberg I., Friis I. &  
Edwards S. 2004. Fl. of Ethiopia and Eritrea 4 (2):  
61, ♀ 60.

- Lactuca goraeensis* (Lam.) Sch.Bip. var. *glomerata* (=) *Launaea intybacea* (Jacq.) Beauverd, Bull. Soc. A.Terracc., Annuario Reale Ist. Bot. Roma 5 (3): Bot. Genève, sér. 2, 2: 114 (1910).  
106 (1894).  
Holotypus: Terracciano 1179.  
Eritrea.
- Lactuca pseudoabyssinica* Chiov., Annuario Reale Ist. Bot. Roma 8 (2): 197 (1904). (=) *Launaea pseudoabyssinica* (Chiov.) N.Kilian, Englera 17: 259 (1997).  
Syntypi: Schweinfurth & Riva 2054; Terracciano & Pappi 626.  
Eritrea.
- Launaea benadirensis** Chiov., Fl. Somalia: 208 (1929).  
Holotypus: Paoli 11.  
Somalia.  
Paoli 11 is also the type specimen of '*Launaea pumila* Chiov.' Result. Sc. Miss. Stefanini-Paoli Somal. Ital. I: 107 (1916), non (Cav.) Kuntze.
- Launaea benadirensis* Chiov. var. *caulescens* Chiov., (=) *Launaea benadirensis* Chiov., Fl. Somalia: 208 Fl. Somalia: 208 (1929).  
Lectotypus<sup>‡</sup>: Puccioni & Stefanini 83 [82].  
Somalia.  
<sup>‡</sup>The type specimen is not present in the protologue.
- Launaea cufodontii* Lanza, Miss. Biol. Borana, Racc. Bot. Angiosp.-Gymnosp.: 272, ♫ 271 (1939). (=) *Launaea hafunensis* Chiov., Fl. Somalia: 207  
Holotypus/Isotypus: Cufodontis 650.  
Ethiopia.
- Launaea hafunensis** Chiov., Fl. Somalia: 207 (1929).  
Holotypus: Puccioni & Stefanini 12 [12].  
Somalia.
- Melanthera abyssinica* (Sch.Bip. ex A.Rich.) Benth. & Hook. f. var. *angustifolia* Chiov., Annuario Reale Ist. Bot. Roma 8 (2): 183 (1904). (=) *Melanthera abyssinica* (Sch.Bip. ex A.Rich.) Benth. & Hook. f., Gen. pl. 2: 377 (1873); or  
Holotypus: Terracciano & Pappi 1975 bis.  
Eritrea.  
Typus: Schimper 334 (P lectotypus).
- Micractis drosocephala* Chiov., Ann. Bot. (Rome) 9 (1): 72 (1911). (=) *Micractis discoidea* (Vatke) D.L.Schulz, Gleditschia 18 (2): 214 (1990).  
Syntypi: Chiovenda 3062, 3185 bis.  
Ethiopia.  
Typus: Schimper 529 (WU lectotypus; BM, K, US isolectotypus).  
Ref.: Mesfin Tadesse in Hedberg I., Friis I. & Edwards S. 2004. Fl. of Ethiopia and Eritrea 4 (2): 317.

- Microtrichia zavattarii* Lanza, Miss. Biol. Borana, (≡) Racc. Bot. Angiosp.-Gymnosp.: 245, ♀ 247 (1939).  
Holotypus/Isotypus: Cufodontis 497.  
Ethiopia.
- Nidorella zavattarii* (Lanza) Cufod. var. *lanzae* (≡) Cufod., Nuovo Giorn. Bot. Ital., n.s., 50: 104 (1943).  
Syntypi: Cufodontis 303, 671; Corradi 2007.  
Ethiopia.
- Notonia coccinea* Oliv. & Hiern var. *angustifolia* (≡) Cufod., Nuovo Giorn. Bot. Ital., n.s., 50: 112 (1943).  
Syntypi: Corradi 2037, 2118, 2119.  
Ethiopia.
- Pleiotaxis subpaniculata** Chiov., Bull. Soc. Bot. Ital.: 43 (1924).  
Holotypus: Mazzocchi-Alemanni 184.  
Angola.
- Pluchea dioscoridis* (L.) DC: var. *pseudovalvis* Cufod., (≡) Nuovo Giorn. Bot. Ital., n.s., 50: 105 (1943).  
Syntypi: Corradi 1739, 1778, 1791, 1792, 1797, 2025, 2026, 2085.  
Ethiopia.
- Pluchea frutescens* Benth. var. *parvifolia* Chiov., Fl. Somala II: 261 (1932).  
Holotypus: Senni 773 bis.  
Somalia.
- Pluchea nogalensis* Chiov., Fl. Somalia: 197 (1929).  
Holotypus: Puccioni & Stefanini 937 [1031].  
Somalia.
- Pluchea sarcophylla* Chiov., Fl. Somalia: 198, ♀ t. VI, f. 2 (1929).  
Lectotypus: Puccioni & Stefanini 1009 [1114] (Thulin M. 2004. Nordic J. Bot. 22 (6): 663).  
Syntipi: Puccioni & Stefanini 543 [596], 920 [1011], 921 [1012].  
Somalia.
- Polycline haareri* Dandy var. *javellensis* Lanza, Miss. Biol. Borana, Racc. Bot. Angiosp.-Gymnosp.: 256, ♀ 257 (1939).  
Holotypus/Isotypus: Cufodontis 402.  
Ethiopia.
- Pulicaria aualites** Chiov., Fl. Somalia: 203, ♀ t. XX (1929).  
Syntypi: Puccioni & Stefanini 741 [819], 1013 [1118].  
Somalia.
- Nidorella zavattarii** (Lanza) Cufod., Nuovo Giorn. Bot. Ital., n.s., 50: 104 (1943).  
Ref.: Mesfin Tadesse in Hedberg I., Friis I. & Edwards S. 2004. Fl. of Ethiopia and Eritrea 4 (2): 216.
- Nidorella zavattarii** (Lanza) Cufod., Nuovo Giorn. Bot. Ital., n.s., 50: 104 (1943).  
Tyus: Cufodontis 497 (FT holotypus).  
Ref.: Mesfin Tadesse in Hedberg I., Friis I. & Edwards S. 2004. Fl. of Ethiopia and Eritrea 4 (2): 216.
- Kleinia grantii** (Oliv. & Hiern) Hook.f., Bot. Mag. 125: t. 7691 (1899).  
Typus: Grant s.n. (K holotypus).  
Ref.: Mesfin Tadesse in Hedberg I., Friis I. & Edwards S. 2004. Fl. of Ethiopia and Eritrea 4 (2): 272.
- Pluchea dioscoridis** (L.) DC., Prodr. 5: 450 (1836).  
Typus: Hasselquist s.n. in Linnean Herbarium n. 992.6 (LINN lectotypus).  
Ref.: Mesfin Tadesse in Hedberg I., Friis I. & Edwards S. 2004. Fl. of Ethiopia and Eritrea 4 (2): 144, ♀ 145.
- Pluchea somaliensis** (Thell.) Thulin, Nordic J. Bot. 22 (6): 664 (2004).  
Typus: Keller 9 (Z lectotypus).  
Ref.: King-Jones S. & Thulin M. in Thulin M. 2006. Flora of Somalia 3: 500.
- Athroisma boranense** Cufod., Nuovo Giorn. Bot. Ital., n.s., 50: 108 (1943).  
Ref.: Eriksson T. 1995. Bot. J. Linn. Soc. 119 (2): 147, ♀ 148.

- Pulicaria migiurtinorum** Chiov., Fl. Somalia: 202, ♦ t. XXII, f. 1 (1929).  
 Holotypus: Puccioni & Stefanini 30 [30].  
 Somalia.
- Pulicaria steinbergii** E.Gamal-Eldin, Phanerogam.  
 Monogr., 14: 239, ♦ f. 196 (1981).  
 Holotypus: Merla, Azzaroli & Fois s.n.  
 Somalia.
- Sclerostephane discoidea** Chiov., Fl. Somalia: 201, ♦ t. XXI, f. 2 (1929).  
 Lectotypus: Puccioni & Stefanini 713 [790] (Wagenitz G. & Gamal-Eldin E. 1983. Bot. Jahrb. Syst. 104 (1): 111).  
 Syntypus: Puccioni & Stefanini 605 [666].  
 Somalia.
- Senecio belliodoides** Chiov., Fl. Somalia II: 272 (1932).  
 Syntypi: Paoli 9; Senni 564.  
 Somalia.
- Senecio cheranganiensis** Cotton & Blakelock, Bull. Misc. Inform. 1937 (6): 364 (1937).  
 Isotypus: Dale 3392.  
 (K holotypus. Knox, Fl. Trop. East Afr., Compositae (Part 3): 557. 2005).  
 Kenya.
- Senecio dalei** Cotton & Blakelock, Bull. Misc. Inform. 1937 (6): 365 (1937).  
 Isotypus: Dale 3393.  
 (K holotypus. Knox, Fl. Trop. East Afr., Compositae (Part 3): 558. 2005).  
 Kenya.
- Senecio caranianus** Chiov., Ann. Bot. (Rome) 10 (3): 386 (1912).  
 Syntypi: Negri 812, 1420.  
 Ethiopia.
- Senecio degiensis** Pich.Serm., Miss. Stud. Lago Tana, VII, Ricerche Bot. I: 231, ♦ t. LIII (1951).  
 Holotypus: Pichi Sermolli 2602.  
 Ethiopia.
- Senecio hochstetteri** Sch.Bip. ex A.Rich. var. *radiatus* Chiov., Annuario Reale Ist. Bot. Roma 8 (2): 190 (1904).  
 Syntypi: Terracciano & Pappi 625, 736; Ragazzi 30.  
 Eritrea.
- (=) **Pulicaria discoidea** (Chiov.) N.Kilian, Willdenowia 29 (1-2): 176 (1999).  
 Ref.: Beentje H. in Thulin M. 2006. Flora of Somalia 3: 521.
- (=) **Emilia belliodoides** (Chiov.) C.Jeffrey, Kew Bull. 41 (4): 913 (1986).  
 Ref.: Thulin M. 2006. Flora of Somalia 3: 531.
- (=) **Dendrosenecio cheranganiensis** (Cotton & Blakelock) E.B.Knox, Contr. Univ. Michigan Herb. 19: 243 (1993).  
 Ref.: Knox B. in Beentje H.J. & Ghazanfar S.A. 2005. Fl. Trop. East Afr., Compositae (Part 3): 557.
- (=) **Dendrosenecio cheranganiensis** (Cotton & Blakelock) E.B.Knox subsp. **dalei** (Cotton & Blakelock) E.B.Knox, Contr. Univ. Michigan Herb. 19: 244 (1993).  
 Ref.: Knox B. in Beentje H.J. & Ghazanfar S.A. 2005. Fl. Trop. East Afr., Compositae (Part 3): 558.
- (=) **Solanecio nandensis** (S.Moore) C.Jeffrey, Kew Bull. 41 (4): 921 (1986).  
 Typus: Scott Elliot 6987 (BM holotypus; K isotypus).  
 Ref.: Mesfin Tadesse in Hedberg I., Friis I. & Edwards S. 2004. Fl. of Ethiopia and Eritrea 4 (2): 250.
- (=) **Senecio farinaceus** Sch.Bip. ex A.Rich., Tent. Fl. Abyss. 1: 443 (1848).  
 Typus: Schimper 751 (P holotypus; K, UPS isotypus).  
 Ref.: Mesfin Tadesse in Hedberg I., Friis I. & Edwards S. 2004. Fl. of Ethiopia and Eritrea 4 (2): 240, ♦ 241.
- (=) **Senecio hochstetteri** Sch.Bip. ex A.Rich., Tent. Fl. Abyss. 1: 435 (1848).  
 Typus: Schimper 268 (P holotypus; BM, EA, K isotypus).  
 Ref.: Mesfin Tadesse in Hedberg I., Friis I. & Edwards S. 2004. Fl. of Ethiopia and Eritrea 4 (2): 243, ♦ 241.

- Senecio mannii* Hook.f. var. *kikuyuensis* Chiov., (=) Racc. Miss. Consolata Kenya: 71 (1935).  
Holotypus: Balbo 97\*. Kenya.
- Senecio megamontanus* Cufod., Nuovo Giorn. Bot. Ital., n.s., 50: 104 (1943).  
Syntypi: Corradi 2077, 2079. Ethiopia.
- Senecio meruensis* Cotton & Blakelock, Kew Bull. 1947 (2): 135 (1948).  
Isotypus: Burtt 4050. (K holotypus. Knox, Fl. Trop. East Afr., Compositae (Part 3): 553. 2005). Tanzania.
- Senecio nogalensis* Chiov., Fl. Somalia: 206, ♀ t. (= XXII, f. 3 (1929).  
Holotypus: Puccioni & Stefanini 960 [1055]. Somalia.
- Senecio platyleurus* Cufod., Ann. Naturhist. Mus. Wien 56: 177 (1948).  
Holotypus: Corradi 2071 a. Ethiopia.
- Senecio ragazzii* Chiov., Annuario Reale Ist. Bot. Roma 8 (2): 190 (1904).  
Holotypus: Ragazzi s.n. Ethiopia.
- Senecio simulans* Chiov., Racc. Miss. Consolata Kenya: 70 (1935).  
Holotypus: Balbo 31\*. Kenya.
- Senecio somalensis* Chiov., Result. Sc. Miss. Stefanini- Paoli Somal. Ital. I: 106 (1916).  
Holotypus: Paoli 1110. Somalia.
- Sphaeranthus cylindraceus* Cufod., Nuovo Giorn. Bot. Ital., n.s., 50: 105 (1943).  
Syntypus: Corradi 1865. Ethiopia.
- Sphaeranthus dauensis* Cufod., Nuovo Giorn. Bot. Ital., n.s., 50: 106 (1943).  
Holotypus: Corradi 1644. Ethiopia.
- Solanecio mannii** (Hook.f.) C.Jeffrey, Kew Bull. 41 (4): 922 (1986).  
Typus: Mann 282 (K holotypus). Ref.: Jeffrey C. & Beentje H.J. in Beentje H.J. & Ghazanfar S.A. 2005. Fl. Trop. East Afr., Compositae (Part 3): 678, ♀ 679.
- Emilia somalensis** (S.Moore) C.Jeffrey, Kew Bull. 41 (4): 912 (1986).  
Typus: Delamere (BM holotypus). Ref.: Mesfin Tadesse in Hedberg I., Friis I. & Edwards S. 2004. Fl. of Ethiopia and Eritrea 4 (2): 256.
- Dendrosenecio meruensis** (Cotton & Blakelock) E.B.Knox, Contr. Univ. Michigan Herb. 19: 245 (1993).  
Ref.: Knox B. in Beentje H.J. & Ghazanfar S.A. 2005. Fl. Trop. East Afr., Compositae (Part 3): 553.
- Kleinia nogalensis** (Chiov.) Thulin, Nordic J. Bot. 22 (4): 425 (2002).  
Ref.: Thulin M. 2006. Flora of Somalia 3: 536.
- Senecio aequinoctialis** R.E.Fr., Acta Horti Berg. 9: 152 (1928).  
Typus: R. & Th. Fries 2360 (UPS holotypus). Ref.: Mesfin Tadesse in Hedberg I., Friis I. & Edwards S. 2004. Fl. of Ethiopia and Eritrea 4 (2): 238.
- Solanecio cydoniifolius** (O.Hoffm.) C.Jeffrey, Kew Bull. 41 (4): 921 (1986).  
Typus: Holst 2106 (B holotypus destr., K isotypus). Ref.: Jeffrey C. & Beentje H.J. in Beentje H.J. & Ghazanfar S.A. 2005. Fl. Trop. East Afr., Compositae (Part 3): 674.
- Gynura pseudichina** (L.) DC., Prodr. 6: 299 (1838).  
Type not designated.  
Ref.: Thulin M. 2006. Flora of Somalia 3: 538.
- Sphaeranthus ukambensis** Vatke & O.Hoffm., Bot. Jahrb. Syst. 20: 228 (1894).  
Typus: Hildebrandt 2612 (? B holotypus; K isotypus). Ref.: Mesfin Tadesse in Hedberg I., Friis I. & Edwards S. 2004. Fl. of Ethiopia and Eritrea 4 (2): 150, ♀ 151.
- Sphaeranthus ukambensis** Vatke & O.Hoffm. var. *dauensis* (Cufod.) Beentje, Fl. Trop. East Afr., Compositae (Part 2): 379 (2002).  
Ref.: Mesfin Tadesse in Hedberg I., Friis I. & Edwards S. 2004. Fl. of Ethiopia and Eritrea 4 (2): 151.

**Sphaeranthus mimeses** Ross-Craig, Hook., Icon.  
Pl. ser. 5, 6: 72, ♫ t. 3519 (1955).

Isotypus: Burtt 3718.

(K holotypus. Beentje, Fl. Trop. East Afr.,  
Compositae (Part 2): 387. 2002).

Tanzania.

**Sphaeranthus stenostachys** Chiov., Result. Sc. Miss.  
Stefanini-Paoli Somal. Ital. I: 102 (1916).

Holotypus: Paoli 1307.

Somalia.

**Sphaeranthus zavattarii** Cufod., Nuovo Giorn. Bot.  
Ital., n.s., 50: 107 (1943).

Syntypi: Corradi 1839, 1852.  
Ethiopia.

**Vernonia abyssinica** Sch.Bip. ex Walp. var. *vestita*  
Cufod., Nuovo Giorn. Bot. Ital., n.s., 50: 102 (1943).

Lectotypus: Corradi 1966 (Earle Smith, Agric.  
Handb. 396: 31. 1971).

Syntypi: Corradi 1976, 1982.  
Ethiopia.

**Vernonia afromontana** R.E.Fr. var. *pleiocephala*  
Chiov., Racc. Miss. Consolata Kenya: 61 (1935).

Holotypus: Balbo 735\*.  
Kenya.

It is not certain whether this variety is referable  
to subsp. *nairobiensis*, or to subsp. *afromontana* var.  
*afromontana* of *Vernonia galamensis*; in neither  
instance would the nomenclature of the taxa  
concerned be affected (Jeffrey, Kew Bull. 43 (2): 248.  
1988).

**Vernonia antinoriana** Avetta, Nuovo Giorn. Bot.  
Ital. 21: 348 (1889).

Holotypus: Antinori 2945/3405.  
Ethiopia.

**Vernonia argutidens** Chiov., Ann. Bot. (Rome) 9 (1):  
69 (1911).

Holotypus: Chiovenda 1000.  
Ethiopia.

**Vernonia aschersonii** Sch.Bip. var. *robusta* Cufod.,  
Nuovo Giorn. Bot. Ital., n.s., 50: 102 (1943).

Syntypi: Corradi 1978, 2011.  
Ethiopia.

**Vernonia aschersonioides** Chiov., Fl. Somalia: 195  
(1929).

Holotypus: Puccioni & Stefanini 13 [13].  
Somalia.

(=) **Sphaeranthus ukambensis** Vatke & O.Hoffm.,  
Bot. Jahrb. Syst. 20: 228 (1894).

Typus: Hildebrandt 2612 (? B holotypus; K  
isotypus).

Ref.: Beentje H. in Thulin M. 2006. Flora of  
Somalia 3: 503, ♫ 504.

**Vernonia schimperi** DC., Prodr. 7: 264 (1838).

Typus: Schimper 868 (K isotypus).

Ref.: Mesfin Tadesse in Hedberg I., Friis I. &  
Edwards S. 2004. Fl. of Ethiopia and Eritrea 4 (2):  
95.

(=) **Vernonia urticifolia** A.Rich., Tent. Fl. Abyss. 1:  
378 (1848).

Typus: Petit s.n. (P holotypus).

Ref.: Mesfin Tadesse in Hedberg I., Friis I. &  
Edwards S. 2004. Fl. of Ethiopia and Eritrea 4 (2):  
80.

**Vernonia buchingeri** (Steetz) Oliv. & Hiern,  
Naturw. Reise Mossambique, Bot. 2: 359 (1864).

Typus: Schimper 386 (BM, K, isotypus).

Ref.: Mesfin Tadesse in Hedberg I., Friis I. &  
Edwards S. 2004. Fl. of Ethiopia and Eritrea 4 (2):  
95.

**Vernonia popeana** C.Jeffrey, Kew Bull. 43 (2):  
244 (1988).

Typus: Gilbert 4761 (K holotypus).

Ref.: Mesfin Tadesse in Hedberg I., Friis I. &  
Edwards S. 2004. Fl. of Ethiopia and Eritrea 4 (2):  
100.

**Vernonia aschersonii** Sch.Bip., Beitr. Fl. Aethiop.  
161 (1867).

Typi: Schimper 2185 (P, K, syntypus); Steudner  
s.n. (B syntypus, destr.)

Ref.: Beentje H. in Thulin M. 2006. Flora of  
Somalia 3: 490.

**Vernonia bipontini** Vatke var. **caccaensis** Wattimah & Mesfin, Nordic J. Bot. 14 (2): 219, ♫ 217 (1994).

Isotypus: Mooney 5250.

(ETH holotypus. Wattimah & Mesfin, Nordic J. Bot. 14 (2): 219. 1994).

Ethiopia.

**Vernonia brachycalyx** O.Hoffm. var. **megana** Cufod., (=) Nuovo Giorn. Bot. Ital., n.s., 50: 102 (1943).

Syntypi: Corradi 1742, 1743, 1744, 1760. Ethiopia.

**Vernonia chiarugii** Pic.Serm., Miss. Stud. Lago Tana, VII, Ricerche Bot. I: 155, ♫ t. XXX (1951).

Holotypus: Pichi Sermolli 2426. Ethiopia.

**Vernonia jodopappa** Chiov., Racc. Miss. Consolata Kenya: 60 (1935), nom. illeg., non Sch.Bip. (1861).

Holotypus/Isotypus: Balbo 428\*. Kenya.

Lanza, in Miss. Biol. Borana, Racc. Bot. Angiosp.-Gymnosp.: 244 (1939), published "Vernonia jodopapposa" with the same type.

**Vernonia jodopapposa** Chiov. ex Lanza f. *erecta* Chiov. ex Lanza, Miss. Biol. Borana, Racc. Bot. Angiosp.-Gymnosp.: 244 (1939).

Holotypus/Isotypus: Cufodontis 621. Ethiopia.

**Vernonia leopoldi** (Sch.Bip. ex Walp.) Vatke var. *incana* Avetta, Nuovo Giorn. Bot. Ital. 21: 349 (1889).

Holotypus/Isotypus: Antinori 2945/3405. Ethiopia.

**Vernonia macrophylla** Chiov., Ann. Bot. (Rome) 9 (1): 70 (1911), nom. illeg., non Less. (1831).

Syntypi: Chiovenda 768, 3184. Ethiopia.

**Vernonia mazzocchii-alemannii** Chiov., Bull. Soc. Bot. Ital. 1924: 41 (1924).

Syntypi: Mazzocchi-Alemanni 116, 165. Angola.

**Vernonia melanacrophylla** Cufod., Nuovo Giorn. Bot. Ital., n.s., 50: 102 (1943).

Syntypi: Corradi 1805, 1806, 2035, 2036, 2057, 2058, 2117. Ethiopia.

**Vernonia brachycalyx** O.Hoffm., Pflanzenw. Ost-Afrikas C: 405 (1895).

Typus: Hildebrandt 2466 (BM, K, lectotypus).

Ref.: Mesfin Tadesse in Hedberg I., Friis I. & Edwards S. 2004. Fl. of Ethiopia and Eritrea 4 (2): 81.

**Vernonia myriantha** Hook.f., J. Linn. Soc., Bot. 7: 198 (1864).

Typi: Mann 622, 913 (K syntypi).

Ref.: Mesfin Tadesse in Hedberg I., Friis I. & Edwards S. 2004. Fl. of Ethiopia and Eritrea 4 (2): 82.

**Vernonia brachycalyx** O.Hoffm., Pflanzenw. Ost-Afrikas C: 405 (1895).

Typus: Hildebrandt 2466 (BM, K, lectotypus).

Ref.: Jeffrey C. & Beentje H.J. in Beentje H.J. & Smith S.A.L. 2000. Fl. Trop. East Afr., Compositae (Part 1): 193.

**Vernonia brachycalyx** O.Hoffm., Pflanzenw. Ost-Afrikas C: 405 (1895).

Typus: Hildebrandt 2466 (BM, K, lectotypus).

Ref.: Mesfin Tadesse in Hedberg I., Friis I. & Edwards S. 2004. Fl. of Ethiopia and Eritrea 4 (2): 81.

**Vernonia bipontini** Vatke, Linnaea 39: 478 (1875).

Typus: Schimper 1542 (B holotypus; BM, K, P UPS isotypus).

Ref.: Mesfin Tadesse in Hedberg I., Friis I. & Edwards S. 2004. Fl. of Ethiopia and Eritrea 4 (2): 84.

**Vernonia theophrastifolia** Schweinf. Ex Oliv. & Hiern, in Oliver D., Fl. Trop. Afr. 3: 294 (1877).

Typus: Schweinfurth 2990 (K holotypus).

Ref.: Mesfin Tadesse in Hedberg I., Friis I. & Edwards S. 2004. Fl. of Ethiopia and Eritrea 4 (2): 82.

**Vernonia karaguensis** Oliv. & Hiern, Trans. Linn. Soc. London 29: 91 (1873).

Typus: Grant s.n. (K holotypus).

Ref.: Mesfin Tadesse in Hedberg I., Friis I. & Edwards S. 2004. Fl. of Ethiopia and Eritrea 4 (2): 85.

- Vernonia melanacrophylla* Cufod. var. *hispida* (=) *Vernonia karaguensis* Oliv. & Hiern, Trans. Linn. Soc. London 29: 91 (1873).  
Cufod., Nuovo Giorn. Bot. Ital., n.s., 50: 103 (1943).  
Holotypus: Corradi 1984.  
Ethiopia.
- Vernonia melanacrophylla* Cufod. var. *pseudoblumeoides* Cufod., Nuovo Giorn. Bot. Ital., n.s., 50: 103 (1943).  
Syntypi: Corradi 2065, 2066, 2072.  
Ethiopia.
- Vernonia melanacrophylla* Cufod. var. *pseudo-printzioides* Cufod., Nuovo Giorn. Bot. Ital., n.s., 50: 103 (1943).  
Syntypi: Corradi 1728, 1799, 1874, 1882.  
Ethiopia.
- Vernonia mogadoxensis** Chiov., Result. Sc. Miss. Stefanini-Paoli Somal. Ital. I: 101 (1916).  
Syntypi: Paoli 100, 116 bis.  
Somalia.
- Vernonia papillosissima** Chiov., Bull. Soc. Bot. Ital. 1924: 42 (1924).  
Syntypi: Mazzocchi-Alemani 45, 102.  
Angola.
- Vernonia piovanii* Chiov., Racc. Miss. Consolata Kenya: 61 (1935).  
Holotypus/Isotypus: Balbo 388\*.  
Kenya.
- Vernonia podocoma* Sch.Bip. ex Vatke var. *glabrata* (=) *Vernonia glabra* (Steetz) Vatke var. *laxa* (Steetz) Brenan, Mem. New York Bot. Gard. 8: 460 (1954).  
Fiori, Nuovo Giorn. Bot. Ital., n.s., 47: 43 (1940).  
Holotypus: Saccardo s.n.  
Ethiopia.
- Vernonia printzioides** Muschl. var. **tomentosa** Cufod., Nuovo Giorn. Bot. Ital., n.s., 50: 102 (1943).  
Holotypus: Corradi 1863.  
Ethiopia.
- Vernonia rhodocalymma* Chiov., Atti Reale Accad. Italia, Mem. Cl. Sci. Fis., Ser. 7, 11 (2): 36 (1940).  
Holotypus: Marchetti 40.  
Ethiopia.
- Vernonia sennii* Chiov., Fl. Somalia II: 256 (1932).  
Holotypus: Senni 268.  
Somalia.
- (=) *Vernonia rueppellii* Sch.Bip. ex Walp., Repert. bot. syst. 2: 946 (1843).  
Typus: Rüppell s.n. (P holotypus).  
Ref.: Mesfin Tadesse in Hedberg I., Friis I. & Edwards S. 2004. Fl. of Ethiopia and Eritrea 4 (2): 83.
- (=) *Vernonia biafrae* Oliv. & Hiern, Oliver D., Fl. Trop. Afr. 3: 270 (1877).  
Typus: Mann 1296 (K holotypus).  
Ref.: Mesfin Tadesse in Hedberg I., Friis I. & Edwards S. 2004. Fl. of Ethiopia and Eritrea 4 (2): 81.
- (=) *Vernonia homilantha* S.Moore, J. Bot. 41: 138 (1903).  
Typus: Whyte s.n. (BM holotypus; K, MO isotypus).  
Ref.: Beentje H. in Thulin M. 2006. Flora of Somalia 3: 492.

- Vernonia tephrodoides*** Chiov., Fl. Somalia II: 255 (= 1932).  
Holotypus: Senni 249.  
Somalia.
- Vernonia unicata*** C.Jeffrey, Hooker's Icon. Pl. 7 (4): t. 3683, ♫ t. 3683 (1971).  
Isotypus: Radcliffe-Smith & Lavranos 498.  
(K holotypus. Radcliffe-Smith, Hooker's Icon. Pl. 7 (4): t. 3683. 1971).  
Yemen, Socotra.
- Wedelia abyssinica*** Vatke var. *canescens* Cufod., Nuovo Giorn. Bot. Ital., n.s., 50: 110 (1943).  
Holotypus: Corradi 2068.  
Ethiopia.
- Wedelia abyssinica*** Vatke var. *media* Cufod., Nuovo Giorn. Bot. Ital., n.s., 50: 110 (1943).  
Syntypi: Corradi 1759, 2030.  
Ethiopia.
- Wedelia abyssinica*** Vatke var. *robusta* Cufod., Nuovo Giorn. Bot. Ital., n.s., 50: 109 (1943).  
Syntypi: Corradi 1662, 1663, 1664, 1782, 2084, 2086, 2095, 2102.  
Ethiopia.
- Wedelia magnifica*** Chiov., Ann. Bot. (Rome) 9 (1): 74 (1911).  
Holotypus: Chiovenda 1582.  
Ethiopia.
- Werneria antinorii*** Avetta, Giorn. Bot. Ital. 21: 348 (1889).  
Holotypus: Antinori 3518/4032.  
Ethiopia.
- Vernonia cinerascens*** Sch.Bip., Beitr. Fl. Aethiop.: 162 (1867).  
Typus: Schimper 2133 (BM, K, P isotypus).  
Ref.: Beentje H. in Thulin M. 2006. Flora of Somalia 3: 492.
- Aspilia gilletti*** Wild, Kirkia 5 (2): 215 (1966).  
Typus: Gillett 14355 (K holotypus).  
Ref.: Mesfin Tadesse in Hedberg I., Friis I. & Edwards S. 2004. Fl. of Ethiopia and Eritrea 4 (2): 296.
- Aspilia gilletti*** Wild, Kirkia 5 (2): 215 (1966).  
Typus: Gillett 14355 (K holotypus).  
Ref.: Mesfin Tadesse in Hedberg I., Friis I. & Edwards S. 2004. Fl. of Ethiopia and Eritrea 4 (2): 296.
- Aspilia gilletti*** Wild, Kirkia 5 (2): 215 (1966).  
Typus: Gillett 14355 (K holotypus).  
Ref.: Mesfin Tadesse in Hedberg I., Friis I. & Edwards S. 2004. Fl. of Ethiopia and Eritrea 4 (2): 296.
- Aspilia africana*** (Pers.) Adams subsp. ***magnifica*** (Chiov.) Wild, Kirkia 5 (2): 219 (1966).  
Ref.: Mesfin Tadesse in Hedberg I., Friis I. & Edwards S. 2004. Fl. of Ethiopia and Eritrea 4 (2): 296.
- Euryops antinorii*** (Avetta) S.Moore, J. Linn. Soc. Bot. 35: 362 (1902).  
Ref.: Mesfin Tadesse in Hedberg I., Friis I. & Edwards S. 2004. Fl. of Ethiopia and Eritrea 4 (2): 266, ♫ 265.

## CONVOLVULACEAE

**Astripomoea longituba** Verdc., Kew Bull. 14 (3): 337 (1960).

Isotypus: Verdcourt & Dale 2209  
(EA holotypus. Verdcourt, Kew Bull. 14 (3): 337.  
1960).  
Kenya.

*Astrochlaena nogalensis* Chiov., Fl. Somalia: 236 (1929).

Holotypus: Puccioni & Stefanini 874 [965].  
Somalia.

*Astrochlaena tubiflora* Hallier f., Annuario Reale Ist. Bot. Roma 7 (2): 228 (1898).

Holotypus: Riva 1469.  
Ethiopia.

*Breweria argentea* A.Terracc., Annuario Reale Ist. Bot. Roma 5 (3): 104 (1894).

Holotypus: Terracciano 19.  
Eritrea.

*Convolvulus glomeratus* Choisy var. *abbreviata* A.Terracc., Annuario Reale Ist. Bot. Roma 5 (3): 105 (1894).

Holotypus: Terracciano 148.  
Eritrea.

The Floras of this area consider wrongly 'Terracciano 148' as holotype of *Convolvulus hamphilahensis* A.Terracc. The type of this species, however, seems to be lacking in FT.

*Convolvulus glomeratus* Choisy subsp. *pauciflorus* A.Terracc., Annuario Reale Ist. Bot. Roma 5 (3): 105 (1894).

Holotypus: Terracciano 1297.  
Eritrea.

*Convolvulus glomeratus* Choisy subsp. *subcapitatus* A.Terracc., Annuario Reale Ist. Bot. Roma 5 (3): 105 (1894).

Holotypus: Terracciano 1296.  
Eritrea.

*Convolvulus hystrix* Vahl f. *inermis* Chiov., Fl. Somalia: 230 (1929).

Holotypus: Puccioni & Stefanini 942 [1037].  
Somalia.

**Convolvulus kilimandschari** Engl., Hochgebirgsfl. Afrika: 348 (1892).

Typus: Meyer 302 (B holotypus, destr.).  
Isoneotypus: Verdcourt 1207 (EA neotypus.  
Verdcourt, Fl. Trop. E Afr., Convolvulaceae: 38.  
1963).

Kenya.

(=) **Astripomoea nogalensis** (Chiov.) Verdc., Kew Bull. 1958: 191 (1958).

Ref.: Sebsebe Demissew in Thulin M. 2006. Fl. of Somalia 3: 244.

(=) **Astripomoea tubiflora** (Hallier f.) Verdc., Kew Bull. 13: 191 (1958).

Ref.: Sebsebe Demissew in Hedberg I., Ensermu Kelbessa, Edwards S., Sebsebe Demissew & Persson E. 2006. Fl. of Ethiopia and Eritrea 5: 202.

(=) **Seddera latifolia** Hochst. & Steud., Flora 27, Beil.: 8, ♦ t. 5 (1844).

Typus: Schimper 884 (B holotypus, destr.; G isotypus).

Ref.: Sebsebe Demissew in Hedberg I., Ensermu Kelbessa, Edwards S., Sebsebe Demissew & Persson E. 2006. Fl. of Ethiopia and Eritrea 5: 177, ♦ 177.

(=) **Convolvulus amphilahensis** A.Terracc., Annuario Reale Ist. Bot. Roma 5 (3): 105 (1894).

Typus: Terracciano, Isola Midir (22, III) (ubi?).

Ref.: Sebsebe Demissew in Hedberg I., Ensermu Kelbessa, Edwards S., Sebsebe Demissew & Persson E. 2006. Fl. of Ethiopia and Eritrea 5: 181.

(=) **Convolvulus glomeratus** Choisy in DC., Prodr. 9: 401 (1845).

Typi: Schimper 731, 784 (G syntypi; K, P isosyntypi).

Ref.: Cufodontis G. 1961. Bull. Jard. Bot. État 31 (4), Suppl.: 737.

(=) **Convolvulus glomeratus** Choisy in DC., Prodr. 9: 401 (1845).

Typi: Schimper 731, 784 (G syntypi; K, P isosyntypi).

Ref.: Cufodontis G. 1961. Bull. Jard. Bot. État 31 (4), Suppl.: 737.

(=) **Convolvulus hystrix** Vahl, Symb. bot. 1: 16 (1790).

Typus: Forsskål 454 (C lectotypus).

Ref.: Sebsebe Demissew in Thulin M. 2006. Fl. of Somalia 3: 234.

- Convolvulus rhyniospermus*** Hochst. ex Choisy (=)  
f. *herbaceus* A.Terracc., Annuario Reale Ist. Bot.  
Roma 5 (3): 105 (1894).  
Holotypus: Terracciano 80.  
Eritrea.
- Convolvulus ruspolii*** Dammer ex Hallier f.,  
Annuario Reale Ist. Bot. Roma 7 (2): 225 (1898).  
Holotypus: Riva 297.  
Ethiopia.
- Convolvulus ruspolii*** Dammer ex Hallier f. var.  
***pilosa*** Sebsebe, Kew Bull. 54 (1): 71 (1999).  
Isotypus: Hemming 1530.  
(K holotypus. Sebsebe Demissew, Kew Bull. 54  
(1): 71. 1999).  
Ethiopia.
- Convolvulus stenocladus*** Chiov., Fl. Somalia: 229,  
✧ t. XXVIII (1929).  
Syntypi: Puccioni & Stefanini 414 [466], 584  
[639].  
Somalia.
- Eremosperma pucconianum*** Chiov., Atti Ist. Bot. (=)  
Univ. Pavia 7: 143, ✧ t. VIII (1936).  
Holotypus/Isotypus: Puccioni 17.  
Somalia.
- Evolvulus lavae*** Schweinf. ex Deflers, Bull. Soc. Bot. France 43: 121 (1896).  
Isolectotypus: Schweinfurth & Riva 647 (K  
lectotypus. Sebsebe Demissew, Kew Bull. 51 (2):  
406. 1996).  
Eritrea.
- Hildebrandtia lyciopsis*** Chiov., Result. Sc. Miss. (=)  
Stefanini-Paoli Somal. Ital. I: 121 (1916).  
Holotypus: Paoli 1021.  
Somalia.
- Hildebrandtia sericea*** Hutch. & E.A.Bruce, Bull.  
Misc. Inform. 1941: 164 (1941).  
Isotypus: Gillett 4098.  
(K holotypus. Hutchinson & Bruce, Bull. Misc.  
Inform. 1941: 164. 1941).  
Somalia.
- Hildebrandtia villosa*** Hutch. & E.A.Bruce, Bull. (=)  
Misc. Inform. 1941: 165 (1941).  
Isotypus: Gillett 4770.  
(K holotypus. Hutchinson & Bruce, Bull. Misc.  
Inform. 1941: 165. 1941).  
Somalia.
- Convolvulus rhyniospermus*** Hochst. ex Choisy,  
Prodr. 9: 405 (1845).  
Typus: Kotschy 235 (G holotypus; K  
isotypus).  
Ref.: Cufodontis G. 1961. Bull. Jard. Bot. État  
31 (4), Suppl.: 739.
- Hewittia malabarica* (L.) Suresh, Interpret. Van  
Rheede's Hort. Malab.: 88 (1988).  
Typus: "Kattu-kelengu" in Rheede, Hort.  
Malab. 11: 105, t. 51. 1692 (icon. lectotypus).  
Ref.: Sebsebe Demissew in Thulin M. 2006. Fl.  
of Somalia 3: 237, ✧ 237.**
- Cladostigma dioicum*** Radlk., Abh. Naturwiss.  
Vereine Bremen 8: 412 (1883).  
Typus: Hildebrandt 489 (B holotypus, destr.);  
Schweinfurth & Riva 647 (K neotypus, FT  
isoneotypus).  
Ref.: Sebsebe Demissew 1996. Kew Bull. 51  
(2): 406, ✧ 409.
- Hildebrandtia somalensis*** Engl. ex Peter, Nat.  
Pflanzenfam. (3a): 20 (1891).  
Typus: Hildebrandt 1538 (B holotypus, destr.;  
BM isotypus).  
Ref.: Sebsebe Demissew in Thulin M. 2006. Fl.  
of Somalia 3: 226, ✧ 225.
- Hildebrandtia africana*** Vatke, Sitzungsber. Ges.  
Naturf. Freude Berlin 1876: 7 (1876), J. Bot. 14:  
313 (1876).  
Typi: Hildebrandt 1525, 1534 (BM, K  
syntypi).  
Ref.: Sebsebe Demissew in Thulin M. 2006. Fl.  
of Somalia 3: 224, ✧ 225.

**Hyalocystis viscosa** Hallier f., Annuario Reale Ist. Bot. Roma 7 (2): 228 (1898).

Holotypus: Robecchi-Bricchetti 339.  
Somalia.

*Ipomoea adenoides* Schinz var. *ovatolanceolata* Hallier f., Annuario Reale Ist. Bot. Roma 7 (2): 235 (1898), as 'ovato-lanceolata'.

Holotypus: Robecchi-Bricchetti 499.  
Somalia.

**Ipomoea anemophoba** Chiov., Fl. Somalia: 235, ♦ t. XXVII, f. 1 (1929).

Holotypus: Puccioni & Stefanini 648 [712].  
Somalia.

*Ipomoea calycina* (Roxb.) Benth. ex C.B.Clarke var. *neglecta* Di Capua, Annuario Reale Ist. Bot. Roma 8 (2): 227 (1904).

Syntypi: Ragazzi 135; Pappi 31, 2956, 3361, 4503.  
Eritrea.

**Ipomoea chrysosperma** Hallier f., Annuario Reale Ist. Bot. Roma 7 (2): 234 (1898).

Holotypus: Riva 1438, p.p.  
Kenya.

*Ipomoea donaldsonii* Rendle var. *pubicalyx* Hallier f., Annuario Reale Ist. Bot. Roma 7 (2): 232 (1898).

Holotypus: Riva 233.  
Ethiopia.

*Ipomoea ficiifolia* Lindl. var. *laxiflora* Hallier f. subvar. *auriculata* Hallier f., Annuario Reale Ist. Bot. Roma 7 (2): 230 (1898).

Holotypus: Riva 1208.  
Ethiopia.

*Ipomoea glossophylla* Chiov., Ann. Bot. (Rome) 9 (1): 83 (1911).

Holotypus: Chiovenda 647.  
Ethiopia.

*Ipomoea incana* Chiov., Result. Sc. Miss. Stefanini-Paoli Somal. Ital. I: 123 (1916).

Holotypus: Paoli 901.  
Somalia.

(=) **Ipomoea ovotolanceolata** (Hallier f.) Thulin, Nordic J. Bot. 23 (5): 638 (2005).

Ref.: Sebsebe Demissew in Thulin M. 2006. Fl. of Somalia 3: 255.

(=) **Ipomoea sinensis** (Desr.) Choisy, Mém. Soc. Phys. Genève 6: 459 (1834).

Typus: Moreau (P-JU 6773, holotypus).

Ref.: Cufodontis G. 1961. Bull. Jard. Bot. État 31 (4), Suppl.: 762.

(=) **Ipomoea donaldsonii** Rendle, J. Bot. 34: 37 (1896).

Typus: Donaldson Smith 26 (BM lectotypus).

Ref.: Sebsebe Demissew in Hedberg I., Ensermu Kelbessa, Edwards S., Sebsebe Demissew & Persson E. 2006. Fl. of Ethiopia and Eritrea 5: 224, ♦ 229.

(=) **Ipomoea ficifolia** Lindl., Edwards's Bot. Reg. 26 (Misc.): 90 (1840).

Typus: a plant cultivated in the Victoria Nursery, Bath, Somerset, Nov. 1840 (CGE holotypus).

Ref.: Vollesen B. in Hubbard O.B.E. & Milne-Redhead M.A. 1963. Fl. Trop. East Afr., Convolvulaceae: 111.

(=) **Ipomoea blepharophylla** Hallier f., Bot. Jahrb. Syst. 18: 125 (1893).

Typus: Schweinfurth 1818 (B lectotypus, destr.; K isolectotypus).

Ref.: Sebsebe Demissew in Hedberg I., Ensermu Kelbessa, Edwards S., Sebsebe Demissew & Persson E. 2006. Fl. of Ethiopia and Eritrea 5: 208, ♦ 209.

(=) **Ipomoea paolii** Chiov., Result. Sc. Miss. Stefanini-Paoli Somal. Ital. I: 124, ♦ t. 14 (1916).

Typi: Paoli 681, 894, 1162, 1181 (FT syntypi).

Ref.: Sebsebe Demissew in Thulin M. 2006. Fl. of Somalia 3: 252.

*Ipomoea incana* Chiov. f. *melanoclada* Chiov., Fl. (=) Somala: 236 (1929).

Holotypus: Puccioni & Stefanini 270 [305].  
Somalia.

*Ipomoea lineariloba* Chiov., Miss. Biol. Borana, (=) Racc. Bot. Angiosp.-Gymnosp.: 174, ♦ 175 (1939).

Holotypus/Isotypus: Cufodontis 756.  
Ethiopia.

**Ipomoea nephrosepala** Chiov., Fl. Somalia: 233, ♦ t. XXVI, f. 2 (1929).

Syntypi: Puccioni & Stefanini 817 [903], 1040 [753 bis].  
Somalia.

**Ipomoea paolii** Chiov., Result. Sc. Miss. Stefanini-Paoli Somal. Ital. I: 124, ♦ t. 14 (1916).

Syntypi: Paoli 681, 894, 1162, 1181.  
Somalia.

In the protologue instead of 'Paoli 894' there is  
'Paoli 8941'.

*Ipomoea pedunculosa* Chiov., Fl. Somalia II: 327, ♦ (=) 327 (1932).

Holotypus: Senni 719.  
Somalia.

**Ipomoea spathulata** Hallier f., Annuario Reale Ist. Bot. Roma 7 (2): 234 (1898).

Lectotypus: Riva 1049 (Verdcourt, Fl. Trop. East Afr., Convolvulaceae: 145. 1963).

Syntypus: Riva 1670.  
Ethiopia.

*Ipomoea stenophyton* Chiov., Fl. Somalia: 231, ♦ t. (=) XXV (1929).

Holotypus: Puccioni & Stefanini 32 [32].  
Somalia.

**Ipomoea sultani** Chiov., Fl. Somalia: 234, ♦ t. XXVI, f. 1 (1929).

Holotypus: Puccioni & Stefanini 502 [555].  
Somalia.

*Ipomoea whiteana* Rendle var. *integrata* Chiov., (=) Racc. Bot. Miss. Consolata Kenya: 85 (1935).

Holotypus: Balbo 739\*.  
Kenya.

**Ipomoea paolii** Chiov., Result. Sc. Miss. Stefanini-Paoli Somal. Ital. I: 124, ♦ t. 14 (1916).

Typi: Paoli 681, 894, 1162, 1181 (FT syntypi).  
Ref.: Sebsebe Demissew in Thulin M. 2006. Fl. of Somalia 3: 252.

**Ipomoea oenotherae** (Vatke) Hallier f., Bot. Jahrb. Syst. 18: 125 (1893).

Typus: Hildebrandt 2767 (B holotypus, destr.).  
Ref.: Sebsebe Demissew in Hedberg I., Ensermu Kelbessa, Edwards S., Sebsebe Demissew & Persson E. 2006. Fl. of Ethiopia and Eritrea 5: 208.

**Ipomoea tenuirostris** Steud. ex Choisy, in DC., Prodr. 9: 379 (1845).

Typus: Schimper 1064 (G holotypus; K isotype).  
Ref.: Sebsebe Demissew in Thulin M. 2006. Fl. of Somalia 3: 248.

**Merremia semisagitta** (Griseb. ex Peter) Dandy, Fl. Pl. Sudan 3: 125 (1956).

Typus: none cited, probably from Arabia.  
Ref.: Sebsebe Demissew in Thulin M. 2006. Fl. of Somalia 3: 240.

**Ipomoea wightii** (Wall.) Choisy var. *kilimandschari* (Dammer) Verdc., Kew Bull. 13 (2): 207 (1958).

Typus: Volkens 577 (B holotypus, destr.; BM isotype).  
Ref.: Vollesen B. in Hubbard O.B.E. & Milne-Redhead M.A. 1963. Fl. Trop. East Afr., Convolvulaceae: 110.

- Merremia ampelophylla* Hallier f. subsp. *obtusa* (Verdc.) Kew Bull. 13 (2): 187 (1958).  
 Isotypus: Gillett 14466.  
 (EA holotypus. Verdcourt, Kew Bull. 13 (2): 187. 1958).  
 Ethiopia.
- Merremia cliffordii* Hutch. & E.A.Bruce, Bull. Misc. Inform. 1941: 163 (1941).  
 Isotypus: Gillett 4367.  
 (K holotypus. Hutchinson & Bruce, Bull. Misc. Inform. 1941: 163. 1941).  
 Somalia.
- Merremia gorinii** Chiov., Fl. Somalia II: 324, ♦ 325 (1932).  
 Holotypus: Gorini 184.  
 Somalia.
- Merremia lobata* Verdc., Kew Bull. 21 (1): 84, ♦ 85 (1967).  
 Isotypus: Polhill & Paulo 980.  
 (K holotypus. Verdcourt, Kew Bull. 21 (1): 84. 1967).  
 Kenya.
- Seddera arabica* (Forssk.) Choisy var. *macrophylla* Di Capua, Annuario Reale Ist. Bot. Roma 8 (2): 220 (1904).  
 Syntypi: Schweinfurth & Riva 591; Terracciano & Pappi 880, 2260.  
 Eritrea.
- Seddera arabica* (Forssk.) Choisy var. *microphylla* Di Capua f. *longipedunculata* Di Capua, Annuario Reale Ist. Bot. Roma 8 (2): 220 (1904).  
 Syntypi: Terracciano 18; Terracciano & Pappi 71, 649, 739.  
 Eritrea.
- Seddera arabica* (Forssk.) Choisy var. *microphylla* Di Capua f. *brevipedunculata* Di Capua, Annuario Reale Ist. Bot. Roma 8 (2): 220 (1904).  
 Syntypi: Terracciano & Pappi 602, 603, 909.  
 Eritrea.
- Seddera cinerea** Hutch. & E.A.Bruce, Bull. Misc. Inform. 1941: 165 (1941).  
 Isotypus: Gillett 4426.  
 (K holotypus. Hutchinson & Bruce, Bull. Misc. Inform. 1941: 165. 1941).  
 Somalia.
- Seddera gracilis* Chiov., Fl. Somalia II: 323 (1932).  
 Syntypi: Gorini 201; Senni 430.  
 Somalia.
- (=) **Merremia obtusa** (Verdc.) Thulin, Nordic J. Bot. 23 (5): 638 (2005).  
 Ref.: Thulin M. 2005. Nordic J. Bot. 23 (5): 638.
- (=) **Merremia gorinii** Chiov., Fl. Somalia II: 324, ♦ 325 (1932).  
 Typus: Gorini 184 (FT holotypus).  
 Ref.: Sebsebe Demissew in Thulin M. 2006. Fl. of Somalia 3: 239.
- (=) **Merremia ellenbeckii** Pilg., Bot. Jahrb. Syst. 41: 295 (1908).  
 Typus: Ellenbeck 2179 (ubi?).  
 Ref.: Sebsebe Demissew in Thulin M. 2006. Fl. of Somalia 3: 240, ♦ 239.
- (=) **Seddera arabica** (Forssk.) Choisy, in DC., Prodr. 9: 441 (1845).  
 Typus: Forsskål (C, specimen not found).  
 Ref.: Sebsebe Demissew in Hedberg I., Ensermu Kelbessa, Edwards S., Sebsebe Demissew & Persson E. 2006. Fl. of Ethiopia and Eritrea 5: 174, ♦ 175.
- (=) **Seddera arabica** (Forssk.) Choisy, in DC., Prodr. 9: 441 (1845).  
 Typus: Forsskål (C, specimen not found).  
 Ref.: Sebsebe Demissew in Hedberg I., Ensermu Kelbessa, Edwards S., Sebsebe Demissew & Persson E. 2006. Fl. of Ethiopia and Eritrea 5: 174, ♦ 175.
- (=) **Seddera arabica** (Forssk.) Choisy, in DC., Prodr. 9: 441 (1845).  
 Typus: Forsskål (C, specimen not found).  
 Ref.: Sebsebe Demissew in Hedberg I., Ensermu Kelbessa, Edwards S., Sebsebe Demissew & Persson E. 2006. Fl. of Ethiopia and Eritrea 5: 174, ♦ 175.
- (=) **Seddera hirsuta** Dammer ex Hallier f., Annuario Reale Ist. Bot. Roma 7 (2): 224 (1898).  
 Typus: Riva 1189 (FT lectotypus).  
 Ref.: Sebsebe Demissew in Thulin M. 2006. Fl. of Somalia 3: 229.

**Seddera hirsuta** Dammer ex Hallier f., Annuario Reale Ist. Bot. Roma 7 (2): 224 (1898).

Lectotypus: Riva 1189 (Verdcourt, Fl. Trop. East Africa, Convolvulaceae: 28. 1963).

Syntypus: Riva 465.

Ethiopia.

*Seddera saturejoides* Chiov., Fl. Somalia: 228 (1929). (=)

Holotypus: Puccioni & Stefanini 796 [882].  
Somalia.

*Sopubia candeoi* A.Terracc., Nuovo Giorn. Bot. Ital. 24, Bull. Soc. Bot. Ital.: 424 (1892), as 'candeoi'.

Holotypus: Baudi & Candeo s.n.  
Somalia.

**Seddera latifolia** Hochst. & Steud., Flora 27, Beil.: 8, ♫ t. 5 (1844).

Typus: Schimper 884 (B holotypus, destr.; G isotype).

Ref.: Sebsebe Demissew in Thulin M. 2006. Fl. of Somalia 3: 230.

**Merremia candeoi** (A.Terracc.) Sebsebe, Kew Bull. 56 (4): 936 (2001).

Ref.: Sebsebe Demissew in Thulin M. 2006. Fl. of Somalia 3: 240.

## CUCURBITACEAE

*Adenopus abyssinicus* Hook. f. var. *somalensis* Chiov., Result. Sc. Miss. Stefanini-Paoli Somal. Ital. I: 81 (1916).

Lectotypus: Paoli 519 (Jeffrey, Fl. Trop. East Afr., Cucurbitaceae: 51. 1967).  
Somalia.

The other syntype of this species (Paoli 458) is *Lagenaria sphaerica* (Sond) Naud., fide Jeffrey, l. c., pag. 53.

*Cephalopentandra obbiadensis* Chiov., Fl. Somalia: 187, ♫ t. XX, f. 1 (1929).

Holotypus: Puccioni & Stefanini 458 [510].  
Somalia.

**Lagenaria siceraria** (Molina) Standl., Publ. Field Columbian Mus., Bot. Ser. 3: 435 (1930).

Typus: Molina (not located, probably destroyed).

Ref.: Jeffrey C. & Thulin M. in Thulin M. 1993. Fl. of Somalia 1: 236.

**Coccinia longipetiolata** Chiov., Fl. Somalia II: 223, ♫ 224 (1932).

Syntypi: Gorini 149, 150.  
Somalia.

*Coccinia quercifolia* Hutch. & E.A.Bruce, Bull. Misc. Inform. 1941: 99 (1941). (=)

Isotypus: Gillett 4194.  
(K holotypus. Hutch. & E.A.Bruce, Bull. Misc. Inform. 1941: 99. 1941).  
Somalia.

**Cephalopentandra ecirrhosa** (Cogn.) C.Jeffrey, Kew Bull. 17 (3): 477 (1964).

Typus: Keller 116 (Z holotypus).

Ref.: Jeffrey C. & Thulin M. in Thulin M. 1993. Fl. of Somalia 1: 233, ♫ 233.

*Coccinia stefaninii* Chiov., Result. Sc. Miss. Stefanini-Paoli Somal. Ital. I: 84 (1916).

Syntypi: Paoli 1069, 1179.  
Somalia.

**Cephalopentandra ecirrhosa** (Cogn.) C.Jeffrey, Kew Bull. 17 (3): 477 (1964).

Typus: Keller 116 (Z holotypus).

Ref.: Jeffrey C. & Thulin M. in Thulin M. 1993. Fl. of Somalia 1: 233, ♫ 233.

**Corallocarpus ellipticus** Chiov., Agric. Colon. 20: 45 (1926).

Holotypus/Isotypus: Gorini 87.  
Somalia.

**Dactyliandra stefaninii** (Chiov.) C.Jeffrey, Kew Bull. 40 (1): 209, ♫ 210 (1985).

Ref.: Jeffrey C. & Thulin M. in Thulin M. 1993. Fl. of Somalia 1: 227, ♫ 227.

*Cucumella robecchii* Chiov., Fl. Somalia: 184, ♫ t. XIX, f. 1 (1929).

Syntypi: Robecchi-Bricchetti 230; Puccioni & Stefanini 440 [492], 568 [624].  
Somalia.

**Cucumella kelleri** (Cogn.) C.Jeffrey, Kew Bull. 15 (3): 350 (1962).

Typus: Keller 111 (Z holotypus).

Ref.: Jeffrey C. & Thulin M. in Thulin M. 1993. Fl. of Somalia 1: 222, ♫ 223.

**Cucumis baladensis** Thulin, Nordic J. Bot. 11 (5): 541, ♫ 540 (1991).

Isotypus: Thulin, Hedrén & Abdi Dahir 7464.  
(UPS holotypus. Thulin, Nordic J. Bot. 11 (5): 541. 1991).

Somalia.

*Cucumis colocynthis* L. var. *maior* Almagià, Annuario Reale Ist. Bot. Roma 8 (1): 126 (1903).

Syntypi: Terracciano & Pappi 17, 46, 99, 1131; Ragazzi & Pappi 17, 1278; Pappi 2890; Terracciano 18; Scotti s.n.  
Eritrea.

*Cucumis colocynthis* L. var. *minor* Almagià, Annuario Reale Ist. Bot. Roma 8 (1): 126 (1903).

Syntypi: Terracciano & Pappi 14, 14a, 16, 217, 1112, 2425; Pappi 35, 58; Terracciano 817.  
Eritrea.

*Cucumis halabarda* Chiov., Fl. Somalia: 185 (1929).

Lectotypus: Puccioni & Stefanini 583, only fruiting part (Jeffrey & Thulin, Fl. of Somalia 1: 226. 1993).

Somalia.

The syntypes of *Cucumis halabarda* (Puccioni & Stefanini 407, 583) are *Cucumis pubituberculatus* Thulin, fide Jeffrey e Thulin, Fl. of Somalia 1: 226 (1993).

**Cucumis pubituberculatus** Thulin, Nordic J. Bot. 11 (5): 538, ♫ 537 (1991).

Isotypus: Thulin, Herdén & Abdi Dahir 7288.  
(UPS holotypus. Thulin, Nordic J. Bot. 11 (5): 538. 1991).

Somalia.

*Cucumis pustulatus* Hook. f. var. *echinophorus* A.Terracc., Annuario Reale Ist. Bot. Roma 5 (3): 108 (1894).

Syntypi: Terracciano 77, 186.  
Eritrea.

*Cucumis pustulatus* Hook.f. var. *minor* A.Terracc. ex Almagià, Annuario Reale Ist. Bot. Roma 8 (1): 127 (1903).

Syntypi: Terracciano 38, 449, 772.  
Eritrea.

**Cucumis thulinianus** J.H.Kirkbr., Biosyst. Monogr. Cucumis: 56, ♫ f. 3 (1993).

Isotypus: Hemming 2011.  
(K holotypus. Jeffrey & Thulin, Fl. of Somalia 1: 226. 1993).

Somalia.

*Eureiandra parvifolia* Chiov., Result. Sc. Miss. Stefanini-Paoli Somal. Ital. I: 80 (1916).

Syntypi: Paoli 830, 884, 897.  
Somalia.

(=) **Citrullus colocynthis** (L.) Schrad., Linnea 12: 414 (1838).

Typus: from a plant cultivated at Uppsala, Sweden (LINN, lectotypus).  
Ref.: Cufodontis G. 1965. Bull. Jard. Bot. État 5 (2), Suppl.: 1040.

**Citrullus colocynthis** (L.) Schrad., Linnea 12: 414 (1838).

Typus: from a plant cultivated at Uppsala, Sweden (LINN, lectotypus).  
Ref.: Cufodontis G. 1965. Bull. Jard. Bot. État 35 (2), Suppl.: 1040.

**Cucumis prophetarum** L. subsp. **dissectum** (Naud.) C.Jeffrey, Kew Bull. 15 (3): 351 (1962).

Typus: Schimper 1201 (P holotypus; MPU isotypus).  
Ref.: Jeffrey C. & Thulin M. in Thulin M. 1993. Fl. of Somalia 1: 226.

(=) **Cucumis prophetarum** L. subsp. **prophetarum**, Cent. pl. I: 32 (1755).

Typus: Hasselquist s.n. (LINN 1152/4 holotypus; UPS isotypus).  
Ref.: Jeffrey C. in Edwards S., Mesfin Tadesse & Hedberg I. 1995. Fl. of Ethiopia and Eritrea 2 (2): 36.

(=) **Cucumis pustulatus** Naudin ex Hook. f., in Oliver D., Fl. Trop. Afr. 2: 544 (1871).

Typus: Schimper 835 (K lectotypus).  
Ref.: Cufodontis G. 1965. Bull. Jard. Bot. État 35 (2), Suppl.: 1044.

(=) **Eureiandra cogniauxii** (Gilg) C.Jeffrey, Kew Bull. 15 (3): 352 (1962).

Typus: Ellenbeck 1988 (B holotypus, destr.; BR isotypus).  
Ref.: Jeffrey C. & Thulin M. in Thulin M. 1993. Fl. of Somalia 1: 236, ♫ 237.

- Gerrardanthus aethiopicus* Chiov., Miss. Biol. (=) Borana, Racc. Bot. Angiosp.-Gymnosp.: 233, ♀ 235 (1939).  
Holotypus/Isotypus: Cufodontis 143.  
Ethiopia.
- Kedrostis brevispinosa* Cogn., Pflanzenr. (IV 275 I) (=) 66: 155 (1916).  
Isotypus: Riva 893.  
(B holotypus, destr. Jeffrey, Fl. of Ethiopia and Eritrea 2 (2): 41. 1995).  
Ethiopia.
- Kedrostis cufodontii* Chiov., Miss. Biol. Borana, Racc. Bot. Angiosp.-Gymnosp.: 236, ♀ 237 (1939).  
Holotypus/Isotypus: Cufodontis 720.  
Ethiopia.
- Kedrostis malvifolia* Chiov., Atti Soc. Naturalisti Mat. Modena 63: 37 (1932).  
Holotypus: De Benedictis 202.  
Eritrea.
- Lagenaria vulgaris* Ser. var. *negrii* Fiori, Nuovo Giorn. Bot. Ital., n.s., 47 (1): 42 (1940).  
Syntypi: Negri 904, 1018; Saccardo 26; Mariottini 417.  
Ethiopia.
- Melothria cipriani* Pic.Serm., Miss. Stud. Lago Tana, (=) VII, Ricerche Bot. I: 259, ♀ t. LX (1951).  
Holotypus/Isotypus: Pichi Sermolli 2221.  
Ethiopia.
- Momordica bricchetti* Chiov., Bull. Soc. Bot. Ital. (=) 1917: 39 (1917).  
Holotypus: Robecchi-Bricchetti 229.  
Somalia.
- Momordica littorea** Thulin, Nordic J. Bot. 11 (4): 425, ♀ 426 (1991).  
Isotypus: Thulin, Hedrén & Abdi Dahir 7132.  
(UPS holotypus. Thulin, Nordic J. Bot. 11 (4): 425. 1991).  
Somalia.
- Momordica microphylla* Chiov., Miss. Biol. Borana, Racc. Bot. Angiosp.-Gymnosp.: 239, ♀ 240 (1939).  
Holotypus: Cufodontis 72.  
Ethiopia.
- Cyclantheropsis parviflora** (Cogn.) Harms, Bot. Jahrb. Syst. 23: 169 (1896).  
Typus: Hildebrandt 1140 (W holotypus; L isotypus).  
Ref.: Jeffrey C. in Edwards S., Mesfin Tadesse & Hedberg I. 1995. Fl. of Ethiopia and Eritrea 2 (2): 18, ♀ 21.
- Momordica spinosa** (Gilg) Chiov., Result. Sc. Miss. Stefanini-Paoli Somal. Ital. I: 82 (1916).  
Typus: Engler 1567 (B holotypus, destr.).  
Ref.: Jeffrey C. in Edwards S., Mesfin Tadesse & Hedberg I. 1995. Fl. of Ethiopia and Eritrea 2 (2): 41, ♀ 45.
- Kedrostis leloja** (Forssk. ex J.F.Gmel.) C.Jeffrey, Kew Bull. 15 (3): 354 (1962).  
Typus: Forsskål 661 (C holotypus).  
Ref.: Jeffrey C. in Edwards S., Mesfin Tadesse & Hedberg I. 1995. Fl. of Ethiopia and Eritrea 2 (2): 23, ♀ 24.
- Momordica cymbalaria** Fenzl ex Hook. f., in Oliver D., Fl. Trop. Afr. 2: 540 (1871).  
Typus: Kotschy 147 (K lectotypus).  
Ref.: Jeffrey C. in Edwards S., Mesfin Tadesse & Hedberg I. 1995. Fl. of Ethiopia and Eritrea 2 (2): 44.
- Lagenaria siceraria** (Molina) Standl., Publ. Field Columbian Mus., Bot. Ser. 3: 435 (1930).  
Typus: Molina (not located, probably destroyed).  
Ref.: Cufodontis G. 1965. Bull. Jard. Bot. État 35 (2), Suppl.: 1046.
- Zehneria scabra** (L. f.) Sond., Fl. Cap. 2: 486 (1862).  
Typus: Thunberg s.n. (UPS holotypus).  
Ref.: Jeffrey C. in Edwards S., Mesfin Tadesse & Hedberg I. 1995. Fl. of Ethiopia and Eritrea 2 (2): 27.
- Momordica macrosperma** (Cogn.) Chiov., Fl. Somalia: 182 (1929).  
Ref.: Jeffrey C. in Edwards S., Mesfin Tadesse & Hedberg I. 1995. Fl. of Ethiopia and Eritrea 2 (2): 41.
- Momordica rostrata** A.Zimm., Cucurbitac. 2: 183 (1922).  
Typus: Zimmerman s.n. (EA lectotypus).  
Ref.: Jeffrey C. in Edwards S., Mesfin Tadesse & Hedberg I. 1995. Fl. of Ethiopia and Eritrea 2 (2): 43.

- Momordica pterocarpa* Hochst. ex A.Rich. var. *dongollensis* Fiori, Nuovo Giorn. Bot. Ital., n.s., 20: 383 (1913).  
 Holotype: Fiori 1704.  
 Eritrea.
- Momordica somalensis* Chiov., Fl. Somalia: 181 (1929).  
 Holotype: Puccioni & Stefanini 166 [188].  
 Somalia.
- Peponia urticoides* Gilg, Bot. Jahrb. Syst. 34: 346 (1904). (=)  
 Isotype: Riva 127.  
 (B holotype, destr. Jeffrey, Kew Bull. 15 (3): 360. 1962).  
 Ethiopia.
- Raphanocarpus stefaninii* Chiov., Fl. Somalia: 179, ♦ t. XX, f. 2a (1929).  
 Holotype: Puccioni & Stefanini 1045 [848].  
 Somalia.
- Raphanocarpus stefaninii* Chiov. var. *membranosa* Chiov., Fl. Somalia: 180, ♦ t. XX, f. 2b (1929).  
 Holotype: Puccioni & Stefanini 524 [578].  
 Somalia.
- Zehneria somalensis** Thulin, Nordic J. Bot. 16 (3): 297, ♦ 298 (1996).  
 Isotype: Thulin, Dahir & Hassan 8975.  
 (UPS holotype. Thulin, Nordic J. Bot. 16 (3): 297. 1996).  
 Somalia.

## CYCLOCHEILACEAE

- Cyclocheilon eriantherum* (Vatke) Engl. var. *decurrens* Chiov., Fl. Somalia: 272 (1929). (=) *Cyclocheilon eriantherum* (Vatke) Marais, Kew Bull. 35 (4): 809, ♦ f. 3 (1981).  
 Holotype: Puccioni & Stefanini 552 [606].  
 Somalia.
- Cyclocheilon minutibracteolatum* Engl., Annuario Reale Ist. Bot. Roma 7 (1): 27 (1897). (=) *Cyclocheilon eriantherum* (Vatke) Marais, Kew Bull. 35 (4): 809, ♦ f. 3 (1981).  
 Syntype: Riva 1175.  
 Somalia.
- Cyclocheilon physocalyx** Chiov., Fl. Somalia: 272 (1929).  
 Syntype: Puccioni & Stefanini 791 [876], 816 [902].  
 Somalia.

## DIPSACACEAE

- Dipsacus eremocephalus* Pic.Serm., Miss. Stud. Lago (=) Tana, VII, Ricerche Bot. I: 223, ♫ t. XLIX (1951).  
 Holotypus: Pichi-Sermolli 2619.  
 Ethiopia.
- Pterocephalus frutescens* Hochst. ex A.Rich. var. (=) *dentatus* Chiov., Chiov., Miss. Biol. Borana, Racc. Bot. Angiosp.-Gymnosp.: 233, ♫ 234 (1939).  
 Holotypus/Isotypus: Cufodontis 628.  
 Ethiopia.
- Scabiosa columbaria* L. var. *longebracteolata* Chiov., (=) Ann. Bot. (Rome) 9 (1): 69 (1911).  
 Holotypus: Chiovenda 2892.  
 Ethiopia.
- Scabiosa columbaria* L. var. *longebracteolata* Chiov. (=) *f. soyrae* Chiov., Nuovo Giorn. Bot. Ital., n.s., 23: 156 (1919).  
 Syntypi: Dainelli & Marinelli 314, 315, 316, 317, 318.  
 Eritrea.
- Scabiosa frutescens* (Hochst. ex A.Rich.) Hiern var. *angustissima* Engl., Annuario Reale Ist. Bot. Roma 9: 256 (1902).  
 Holotypus: Riva 73 ter.  
 Ethiopia.
- Dipsacus pinnatifidus*** Steud. Ex A.Rich., Tent. Fl. Abyss. 1: 367 (1847).  
 Typus: Schimper II: 665 (P lectotypus; K, S, isolectotypus).  
 Ref.: Hedberg I. & Hedsberg O. in Hedberg I., Edwards S. & Sileshi Nemomissa, 2003. Fl. of Ethiopia and Eritrea 4 (1): 290, ♫ 289.
- Pterocephalus frutescens*** Hochst. ex A.Rich., Tent. Fl. Abyss. 1: 369 (1847).  
 Typus: Schimper 235 (P holotypus; BM, G, K, M, W isotypus).  
 Ref.: Mattanovich J. & Lack H.W. in Hedberg I., Edwards S. & Sileshi Nemomissa, 2003. Fl. of Ethiopia and Eritrea 4 (1): 290, ♫ 289.
- Scabiosa columbaria*** L., Sp. pl. 1: 99 (1753).  
 Typus: Linnaeus (LINN, holotypus).  
 Ref.: Hedberg I. & Hedsberg O. in Hedberg I., Edwards S. & Sileshi Nemomissa, 2003. Fl. of Ethiopia and Eritrea 4 (1): 287, ♫ 288.
- Scabiosa columbaria*** L., Sp. pl. 1: 99 (1753).  
 Typus: Linnaeus (LINN, holotypus).  
 Ref.: Cufodontis G. 1965. Bull. Jard. Bot. État 35 (2), Suppl.: 1030.
- Pterocephalus frutescens*** Hochst. ex A.Rich., Tent. Fl. Abyss. 1: 369 (1847).  
 Typus: Schimper 235 (P holotypus; BM, G, K, M, W isotypus).  
 Ref.: Mattanovich J. & Lack H.W. in Hedberg I., Edwards S. & Sileshi Nemomissa, 2003. Fl. of Ethiopia and Eritrea 4 (1): 290, ♫ 289.

## EBENACEAE

- Diospyros consolatae*** Chiov., Racc. Bot. Miss. Consolata Kenya: 77 (1935).  
 Holotypus: Balbo 493\*.  
 Kenya.
- Diospyros cornii* Chiov., Fl. Somalia II: 276, ♫ 277 (=) (1932).  
 Lectotypus: Senni 375 (White F. & Verdcourt B., Fl. Trop. East Afr., Ebenaceae: 39. 1996).  
 Syntypi: Senni 55, 288.  
 Somalia.
- Euclea neghellensis* Cufod., Miss. Biol. Borana, Racc. (=) Bot. Angiosp.-Gymnosp.: 155, ♫ 156 (1939).  
 Holotypus: Cufodontis 211.  
 Ethiopia.
- Diospyros bussei*** Gürke, Bot. Jahrb. Syst. 46: 158 (1911).  
 Typi: Hildebrandt 2370; Holtz 1158; Busse 2465 (all B syntypi, destr.).  
 Ref.: Friis I. in Thulin M. 2006. Fl. of Somalia 3: 9.
- Euclea racemosa*** Murray subsp. *schimperi* (A.DC.) F.White, Bull. Jard. Bot. Natl. Belg. 50: 399 (1980).  
 Typus: Schimper 159 (G holotypus).  
 Ref.: Friis I. & White F. in Hedberg I., Edwards S. & Sileshi Nemomissa 2003. Fl. of Ethiopia and Eritrea 4 (1): 51, ♫ 52.

- Maba abyssinica* Hiern, Trans. Cambridge Philos. Soc. 12: 132 (1873).  
 Isolectotypus: Beccari 55 (K lectotypus. Friis & White, Fl. of Ethiopia and Eritrea 4 (1): 50. 2003).  
 Eritrea.
- Maba scabra* Chiov., Webbia 8 (1): 237 (1951).  
 Lectotypus: Corradi 8391 (White F. & Verdcourt B. Fl. Trop. East Afr., Ebenaceae: 18. 1996).  
 Syntypi: Corradi 8390, 8392, 8393, 8394, 8395, 8396, 8397, 9398, 9399.  
 Ethiopia.
- (=) *Diospyros abyssinica* (Hiern) F.White, Bull. Jard. Bot. État 26: 294, ♦ t. 76 F-K (1956).  
 Ref.: Friis I. & White F. in Hedberg I., Edwards S. & Sileshi Nemomissa 2003. Fl. of Ethiopia and Eritrea 4 (1): 50, ♦ 52.
- (=) *Diospyros scabra* (Chiov.) Cufod., Bull. Jard. Bot. État 30 (4), Suppl.: 668 (1960).  
 Ref.: Friis I. & White F. in Hedberg I., Edwards S. & Sileshi Nemomissa 2003. Fl. of Ethiopia and Eritrea 4 (1): 51, ♦ 52.

## ERICACEAE

- Blaeria guguensis* Pic.Serm. & Heiniger, Webbia 9 (1): 44, ♦ 43 (1953).  
 Holotypus: Milchersich 77.  
 Ethiopia.
- Philippia abyssinica* Pic.Serm. & Heiniger, Webbia 9 (1): 29, ♦ 30 (1953).  
 Holotypus: Milchersich 44.  
 Ethiopia.
- (=) *Erica tenuipilosa* (Engl. ex Alm & T.C.E.Fr.) Cheek, Kew Bull. 52 (3): 753 (1997).  
 Typus: Ledermann 1625 (B holotypus, destr.; UPS lectotypus).  
 Ref.: Hedberg I. & Hedberg O. in Hedberg I., Edwards S. & Sileshi Nemomissa 2003. Fl. of Ethiopia and Eritrea 4 (1): 47.
- (=) *Erica trimera* (Engl.) Beentje subsp. **abyssinica** (Pic.Serm. & Heiniger) Dorr, Novon 16 (1): 57 (2006).  
 Ref.: Dorr L.J. 2006. Novon 16 (1): 57.

## FLACOURTIACEAE

- Gerrardina eylesiana** Milne-Redh, Hooker's Icon. Pl. 34: t. 3390, ♦ t. 3390 (1939).  
 Isotypus: McGregor 57/37.  
 Zimbabwe.
- Flacourtie afra* Pic.Serm., Miss. Stud. Lago Tana, VII, Ricerche Bot. I: 97, ♦ t. XVII, XVIII (1951).  
 Syntypi: Pichi-Sermolli 2039, 2064.  
 Ethiopia.
- Lindackeria somalensis* Chiov., Result. Sc. Miss. Stefanini-Paoli Somalia Ital. 1: 24 (1916).  
 Holotypus: Paoli 676.  
 Somalia.
- Rawsonia transjubensis* Chiov., Fl. Somalia II: 12, ♦ 13 (1932).  
 Holotypus: Senni 38.  
 Somalia.
- Scolopia zavattarii* Chiov., Miss. Biol. Borana, Racc. Bot. Angiosp.-Gymnosp.: 140, ♦ 141 (1939).  
 Holotypus/Isotypus: Cufodontis 407.  
 Ethiopia.
- (=) *Flacourtie indica* (Burm.f.) Merr., Interpr. Herb. amboin.: 377 (1917).  
 Typus: Herb. Burman s.n. (G holotypus).  
 Ref.: Vollesen K. in Edwards S., Mesfin Tadesse, Sebsebe Demissew & Hedberg I. 2000. Fl. of Ethiopia and Eritrea 2 (1): 446, ♦ 448.
- (=) *Oncoba somalensis* (Chiov.) Hul & Breteler, Adansonia, Sér. 3, 19 (2): 260 (1997).  
 Ref.: Hul S. & Breteler F.J. 1997. Adansonia, Sér. 3, 19 (2): 260.
- (=) *Rawsonia lucida* Harv. & Sond., Fl. Cap. 1: 67 (1860).  
 Typus: Sanderson 118 (TDC holotypus; K isotypus).  
 Ref.: Thulin M. 1993. Fl. of Somalia 1: 204, ♦ 204.
- (=) *Scolopia theifolia* Gilg, Bot. Jahrb. Syst. 30: 359 (1901).  
 Typus: Goetze 1249 (B holotypus, destr.; BM, BR, Z, isotypus).  
 Ref.: Vollesen K. in Edwards S., Mesfin Tadesse, Sebsebe Demissew & Hedberg I. 2000. Fl. of Ethiopia and Eritrea 2 (1): 446, ♦ 447.

## GENTIANACEAE

*Neurotheca schlechteri* Gilg ex Baker, in Thiselton-Dyer W.T., Fl. Trop. Afr. 561 (1903). (=) *Neurotheca congolana* De Wild. & T.Durand, Bull. Soc. Roy. Bot. Belgique 38: 98 (1899).

Isotypus: Schlechter 12087.

(K holotypus. Paiva & Nogueira, Fl. Zambesiaca 7 (4): 6. 1990).

Mozambique.

*Swertia erythraea* Chiov., Ann. Bot. (Rome) 9 (1): (=) 81 (1911).

Holotypus: Pappi 4637.

Eritrea.

*Swertia gentianifolia* Chiov., Ann. Bot. (Rome) 9 (1): 82 (1911).

Holotypus: Chiovenda 3055.

Ethiopia.

**Swertia macrosepala** Gilg subsp. **microsperma**

Sileshi, Kew Bull. 53 (2): 432 (1998).

Isotypus: Mooney 7248.

(ETH holotypus. Sileshi Nemomissa, Kew Bull. 53 (2): 432. 1998).

Ethiopia.

*Swertia polyantha* Gilg., Bot. Jahrb. Syst., 26: 109 (=) (1898).

Lectotypus: Riva 1228 (Sileshi Nemomissa, Kew Bull. 53 (2): 428. 1998).

Syntypus: Riva 1405.

Ethiopia.

*Neurotheca congolana* De Wild. & T.Durand, Bull. Soc. Roy. Bot. Belgique 38: 98 (1899).

Typus: Dewèvre 1084 (BR isotypus?).

Ref.: Paiva J. & Nogueira I. in Launert E. & Pope G.V. 1990. Fl. Zambesiaca 7 (4): 6, ♀ 5.

**Swertia abyssinica** Hocht., Flora 27: 28 (1844).

Typus: Schimper 22 (B holotypus, destr.; BM, K, P, S, W isotypus).

Ref.: Sileshi Nemomissa in Hedberg I., Ensermu Kelbessa, Edwards S., Sebsebe Demissew & Persson E. 2006. Fl. of Ethiopia and Eritrea 5: 12, ♀ 13.

**Swertia kilimandscharica** Engl., Abh. Königl. Akad. Wiss. Berlin 1891 (2): 339 (1892).

Typus: Johnston 27 (B holotypus, destr.; BM, K, isotypi).

Ref.: Sileshi Nemomissa in Hedberg I., Ensermu Kelbessa, Edwards S., Sebsebe Demissew & Persson E. 2006. Fl. of Ethiopia and Eritrea 5: 16, ♀ 13.

## GESNERIACEAE

**Streptocarpus phaeotrichus** Chiov. ex B.L.Burtt, Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh: 23: 101 (1960).

Holotypus: Benedetto 453.

Ethiopia.

**Swertia usambarensis** Engl., Pflanzenw. Ost-Afrikas C: 314 (1895).

Typus: Holst 622 (K holotypus).

Ref.: Sileshi Nemomissa in Hedberg I., Ensermu Kelbessa, Edwards S., Sebsebe Demissew & Persson E. 2006. Fl. of Ethiopia and Eritrea 5: 14, ♀ 10.

## GUTTIFERAE

*Garcinia ferrandii* Chiov., Result. Sc. Miss. Stefanini-  
Paoli Somal. Ital. I: 26, ♦ t. 21, f. A (1916).

Syntypi: Paoli 847, 1012.  
Somalia.

(=) ***Garcinia livingstonei*** T.Anderson, J. Linn. Soc.,  
Bot. 9: 263 (1866).

Typus: plant cultivated at Calcutta, originally  
from Mozambique collected by Kirk (CAL  
holotypus).

Ref.: Thulin M. & Moggi G. in Thulin M. 1993.  
Fl. of Somalia 1: 258, ♦ 259.

*Garcinia ferrandii* Chiov. var. *affinis* Chiov., Result.  
Sc. Miss. Stefanini-Paoli Somal. Ital. I: 27 (1916).

Holotypus: Paoli 1290.  
Somalia.

***Garcinia livingstonei*** T.Anderson, J. Linn. Soc.,  
Bot. 9: 263 (1866).

Typus: plant cultivated at Calcutta, originally  
from Mozambique collected by Kirk (CAL  
holotypus).

Ref.: Thulin M. & Moggi G. in Thulin M. 1993.  
Fl. of Somalia 1: 258, ♦ 259.

***Hypericum scioanum*** Chiov., Ann. Bot. (Rome) 9  
(3): 317 (1911).

Holotypus: Negrí 332.  
Ethiopia.

***Psorospermum lamianum*** H.Perrier, Notul. Syst.  
(Paris) 13: 278 (1948).

Isotypus: Lam & Meeuse 5990.  
(L, holotypus?).  
Madagascar.

***Garcinia livingstonei*** T.Anderson, J. Linn. Soc.,  
Bot. 9: 263 (1866).

Typus: plant cultivated at Calcutta, originally  
from Mozambique collected by Kirk (CAL  
holotypus).

## ICACINACEAE

*Jobalboa aberdarica* Chiov., Racc. Bot. Miss. (=)  
Consolata Kenya: 20 (1935).

Holotypus: Balbo 149\*.  
Kenya.

***Apodytes dimidiata*** E.Mey. ex Arn. var.  
***dimidiata***, J. Bot. (Hooker) 3: 155 (1840).

Typus: Drège (K syntypus).

Ref.: Lucas G. in Milne-Redhead E. & Polhill  
R.M. 1968. Fl. Trop. East Afr., Icacinaceae: 6, ♦  
5.

*Pyrenacantha ruspolii* Engl., Bot. Jahrb. Syst. 24: 483  
(1898).

Holotypus: Ruspoli & Riva 1010 (517) 910.  
Ethiopia.

***Pyrenacantha malvifolia*** Engl., Sitzungsber.  
Kaiserl. Akad. Wiss., Math.-Naturwiss. Cl., Abt.  
1, 18: 268 (1893).

Typus: Hildebrandt 2355 (B holotypus, destr.);  
Volkens 2366 (BM neotypus).

Ref.: Vollesen K. in Hedberg I. & Edwards S.  
1989. Fl. of Ethiopia 3: 351, ♦ 352.

## LABIATAE (LAMIACEAE)

- Aeollanthus stefaninii* Chiov., Result. Sc. Miss. (=) Stefanini-Paoli Somal. Ital. I: 146 (1916).  
Holotypus: Stefanini 1233 bis.  
Somalia.
- Ballota microphylla* Chiov., Fl. Somalia: 280, ♦ t. IX, (≡) f. 2 (1929), nom. illeg., non (Desr.) Benth. (1834).  
Holotypus: Puccioni & Stefanini 915 [1006].  
Somalia.
- Becium affine* (Hochst. ex Benth.) Chiov. var. (=) *cyclophyllum* Chiov., Fl. Somalia II: 367, ♦ 367 (1932).  
Syntypi: Senni 600, 604.  
Somalia.
- Calamintha cryptantha* Vatke var. *filiformis* Chiov., (≡) Ann. Bot. (Roma) 9 (2): 127 (1911).  
Holotypus: Chiovenda 907.  
Ethiopia.
- Calamintha simensis* Benth. var. *obtusifolia* Avetta, (≡) Annuario Reale Ist. Bot. Roma 6 (1): 61 (1895).  
Holotypus: Ragazzi 5068/9780.  
Ethiopia.
- Coleus burorum* Chiov., Fl. Somalia: 278 (1929). (≡)  
Holotypus: Puccioni & Stefanini 287 [323].  
Somalia.
- Coleus cicatricosus* Hutch. & E.A.Bruce, Bull. Misc. Inform. 1941: 180 (1941).  
Isotypus: Gillett 4880.  
(K holotypus. Huthchinson & Bruce, Bull. Misc. Inform. 1941: 180. 1941).  
Somalia.
- Coleus doba* Hochst. ex Chiov., Ann. Bot. (Rome) 9 (2): 126 (1911).  
Syntypi: Chiovenda 969, 1500.  
Ethiopia.
- Coleus ghindanus* Schweinf. ex Baker, in Thiselton-Dyer W.T., Fl. Trop. Afr. 5 (3): 435 (1900).  
Isotypus: Schweinfurth & Riva 2149.  
(B holotypus, destr. Morton, Fl. of Ethiopia and Eritrea 5: 593. 2006).  
Eritrea.
- Aeollanthus zanzibaricus* S.Moore, J. Bot. 15: 68 (1877).  
Typus: Hildebrandt 1265 (K holotypus).  
Ref.: Ryding O. in Thulin M. 2006. Fl. of Somalia 3: 349, ♦ 349.
- Otosstegia somala* (Patzak) Sebald, Stuttgarter Beitr. Naturk. A, 263: 29, ♦ 30 (1973).  
Ref.: Ryding O. in Thulin M. 2006. Fl. of Somalia 3: 323.
- Ocimum filamentosum* Forssk., Fl. Aegypt.-Arab.: 108 (1775).  
Typus: Forsskål 394 (C holotypus).  
Ref.: Ryding O. in Thulin M. 2006. Fl. of Somalia 3: 341.
- Clinopodium simense* (Benth.) Kuntze, Rev. Gen. Pl. 2: 516 (1891).  
Typus: Schimper II 999 (K holotypus; UPS, BM isotypus).  
Ref.: Ryding O. in Beentje H.J., Ghazanfar S.A & Polhill R.M. 2009. Fl. Trop. East Afr., Lamiaceae (Labiateae): 123.
- Clinopodium uhligii* (Gürke) Ryding, var. *obtusifolium* (Avetta) Ryding, Kew Bull. 61 (3): 425, ♦ 426 (2006).  
Ref.: Ryding O. in Beentje H.J., Ghazanfar S.A & Polhill R.M. 2009. Fl. Trop. East Afr., Lamiaceae (Labiateae): 123.
- Plectranthus burorum* (Chiov.) J.K.Morton, Novon 8 (3): 265 (1998).  
Ref.: Ryding O. in Thulin M. 2006. Fl. of Somalia 3: 351.
- Plectranthus burorum* (Chiov.) J.K.Morton, Novon 8 (3): 265 (1998).  
Typus: Puccioni & Stefanini 287 [323] (FT holotypus).  
Ref.: Ryding O. in Thulin M. 2006. Fl. of Somalia 3: 351.
- Plectranthus punctatus* (L.f.) L'Hér., Stirp. Nov.: 87, ♦ t. 42 (1788).  
Typus: Herb. Willdenow 11081 (B holotypus).  
Ref.: Morton J.K. in Hedberg I., Ensermu Kelbessa, Edwards S., Sebsebe Demissew & Persson E. 2006. Fl. of Ethiopia and Eritrea 5: 595, ♦ 592.
- Plectranthus aegyptiacus* (Forssk.) C.Chr., Dansk Bot. Ark. 4, 3: 21 (1922).  
Typus: Forsskål s.n. (not traced); "Arabia" Herb. Forsskål s.n. (KIEL neotypus).  
Ref.: Paton A. in Beentje H.J., Ghazanfar S.A & Polhill R.M. 2009. Fl. Trop. East Afr., Lamiaceae (Labiateae): 322.

- Coleus giudottii* Chiov., Reale Accad. Italia, Mem. Cl. Sc. Fis., Ser. 7: 11 (2): 54 (1940).  
 Holotypus: Guidotti 776.  
 Eritrea.
- Coleus gracilis* Gürke, Bot. Jahrb. Syst. 38: 170, ♀ f. 2 (1906).  
 Isosyntypus: Riva 1564.  
 (B syntypus, destr. Paton, Fl. Trop. East Afr., Lamiaceae: 298. 2009).  
 Ethiopia.
- Coleus lactiflorus* Vatke var. *velutinus* Fiori, Nuovo Giorn. Bot. Ital., n.s., 47 (1): 39 (1940).  
 Holotypus: Saccardo s.n.  
 Ethiopia.
- Coleus ostinii* Chiov., Ann. Bot. (Rome) 9 (2): 125 (1911).  
 Syntypi: Chiovenda 1450, 1854.  
 Ethiopia.
- Coleus sodalium* Baker, in Thiselton-Dyer W.T., Fl. Trop. Afr. 5 (3): 526 (1900).  
 Isotypus: Schweinfurth & Riva 1810.  
 (K holotypus. Morton, Fl. of Ethiopia and Eritrea 5: 595. 2006).  
 Eritrea.  
 Baker published in same publication (p. 432) this taxon as '*Coleus schweinfurthii*', non Vatke (1872).
- Coleus scebeli* Chiov., Fl. Somalia: 277 (1929).  
 Holotypus: Puccioni & Stefanini 48 [48].  
 Somalia.
- Coleus spicatus* Benth. var. *rondinella* Sprenger, Gartenflora 45: 358, ♀ 359 (1896).  
 Syntypi: Schweinfurth & Riva 1071, 1339, 2202.  
 Eritrea.
- Erythrochlamys cufodontii* Lanza, Miss. Biol. Borana, Racc. Bot. Angiosp.-Gymnosp.: 183, ♀ 184 (1939).  
 Holotypus/Isotypus: Cufodontis 112.  
 Ethiopia.
- (=) **Plectranthus igniarius** (Schweinf.) Agnew, Upl. Kenya Wild Fl.: 638 (1974).  
 Typus: Schimper 1623 (P neotypus).  
 Ref.: Morton J.K. in Hedberg I., Ensermu Kelbessa, Edwards S., Sebsebe Demissew & Persson E. 2006. Fl. of Ethiopia and Eritrea 5: 591, ♀ 592.
- (=) **Plectranthus puberulentus** J.K.Morton, Novon: 8 (3): 265 (1998).  
 Ref.: Morton J.K. in Hedberg I., Ensermu Kelbessa, Edwards S., Sebsebe Demissew & Persson E. 2006. Fl. of Ethiopia and Eritrea 5: 591.
- (=) **Plectranthus lactiflorus** (Vatke) Agnew, Upl. Kenya Wild Fl.: 635, ♀ 634 (1974).  
 Typus: Hildebrandt 2522 (B holotypus, destr.); Taita Hills Expedition 1042 (K neotypus; EA isoneotypus).  
 Ref.: Morton J.K. in Hedberg I., Ensermu Kelbessa, Edwards S., Sebsebe Demissew & Persson E. 2006. Fl. of Ethiopia and Eritrea 5: 590, ♀ 592.
- (=) **Plectranthus autrani** (Briq.) A.J.Paton, Fl. Trop. East. Afr., Lamiaceae (Labiateae): 326 (2009).  
 Typus: Schimper 693 (P holotypus; K isotype).  
 Ref.: Morton J.K. in Hedberg I., Ensermu Kelbessa, Edwards S., Sebsebe Demissew & Persson E. 2006. Fl. of Ethiopia and Eritrea 5: 599, ♀ 600.
- (=) **Plectranthus lanuginosus** (Hochst. ex Benth.) Agnew, Upl. Kenya Wild Fl.: 638 (1974).  
 Typus: Schimper III 1915 (K lectotypus; BM, FI-W, UPS isolectotypus).  
 Ref.: Morton J.K. in Hedberg I., Ensermu Kelbessa, Edwards S., Sebsebe Demissew & Persson E. 2006. Fl. of Ethiopia and Eritrea 5: 595.
- (=) **Plectranthus scebeli** (Chiov.) Ryding, Kew Bull. 54 (1): 125, ♀ 118 (1999).  
 Ref.: Ryding O. in Thulin M. 2006. Fl. of Somalia 3: 354, ♀ 353.
- (=) **Plectranthus caninus** Roth subsp. **caninus**, Nov. Pl. Sp.: 279 (1821).  
 Typus: Heyne s.n. in Wallich Cat. 2729C (B holotypus; K-W isotype).  
 Ref.: Paton A. in Beentje H.J., Ghazanfar S.A. & Polhill R.M. 2009. Fl. Trop. East Afr., Lamiaceae (Labiateae): 344.
- (=) **Ocimum cufodontii** (Lanza) A.J.Paton, Kew Bull. 47 (3): 420, ♀ 405 (1992).  
 Ref.: Sebald O. in Hedberg I., Ensermu Kelbessa, Edwards S., Sebsebe Demissew & Persson E. 2006. Fl. of Ethiopia and Eritrea 5: 572, ♀ 574.

*Erythrochlamys niveus* Chiov., Fl. Somalia: 275 (=) (1929).

Holotypus: Puccioni & Stefanini 684 [750].  
Somalia.

*Geniosporum borzianum* Chiov., Ann. Bot. (Rome) 10 (3): 402 (1912).

Holotypus/Isotypus: Chiovenda 2266.  
Ethiopia.

**Ocimum nummularia** (S.Moore) A.J.Paton, Kew Bull. 47 (3): 421 (1992).

Typus: Hildebrandt 853 (BM holotypus).  
Ref.: Ryding O. in Thulin M. 2006. Fl. of Somalia 3: 339.

**Neohyptis paniculata** (Baker) J.K.Morton, J. Linn. Soc., Bot. 58: 258, 273, ♀ 258 (1962).

Typus: Welwitsch 5528 (K holotypus; BM isotypus).

Ref.: Morton J.K. in Hedberg I., Ensermu Kelbessa, Edwards S., Sebsebe Demissew & Persson E. 2006. Fl. of Ethiopia and Eritrea 5: 601, ♀ 600.

**Leucas abyssinica** (Benth.) Briq. var. **sidamoensis** Sebald, Stuttgarter Beitr. Naturk. A, 308: 21, ♀ 22 (1978).

Isotypus: Gillett 14563.  
(K holotypus. Sebald, Stuttgarter Beitr. Naturk. A, 308: 21. 1978).  
Ethiopia.

*Leucas acanthocalycina* Sebald, Stuttgarter Beitr. (=) Naturk. A, 303: 8, ♀ 7 (1977).

Holotypus: Puccioni & Stefanini 769 [852].  
Somalia.

**Leucas cuneifolia** Baker, in Thiselton-Dyer W.T., Fl. Trop. Afr. 5 (3): 476 (1900).

Typus: James & Thrupp s.n. (K holotypus).  
Ref.: Ryding O. in Thulin M. 2006. Fl. of Somalia 3: 327, ♀ 327.

**Leucas aequistylosa** Sebald, Stuttgarter Beitr. Naturk. A, 303: 2, ♀ 3 (1977).

Holotypus: Saccardo 86.  
Ethiopia.

**Leucas argentea** Gürke, Bot. Jahrb. Syst. 36: 122 (1905).

Holotypus: Riva 100.  
Ethiopia.

*Leucas chiatelliniana* Chiov., Fl. Somalia II: 371, ♀ (≡) 372 (1932).

Holotypus: Senni 530.  
Somalia.

**Leucas glabrata** (Vahl) Sm., Cycl. 20 (2): Leucas no. 10 (1812).

Typi: Forsskål 217, 222 (only the plant on the left) (C syntypi).

Ref.: Bramley G. in Beentje H.J., Ghazanfar S.A. & Polhill R.M. 2009. Fl. Trop. East Afr., Lamiaceae (Labiatae): 65, ♀ 66.

**Leucas discolor** Sebald, Stuttgarter Beitr. Naturk. A, 308: 34, ♀ 35 (1978).

Isotypus: Bally 12538.  
(K holotypus. Sebald, Stuttgarter Beitr. Naturk. A, 308: 34. 1978).  
Kenya.

*Leucas glabrata* (Vahl) Sm. var. *subulifera* Chiov., Result. Sc. Miss. Stefanini-Paoli Somal. Ital. I: 146 (1916).

Syntypi: Paoli 45, 437, 710; Stefanini 1203.  
Somalia.

The specimen 'Paoli 45' is also the syntype of *Leucas mogadoxensis* Chiov.

**Leucas glabrata** (Vahl) Sm., Cycl. 20 (2): Leucas no. 10 (1812).

Typi: Forsskål 217, 222 (only the plant on the left) (C syntypi).

Ref.: Ryding O. in Thulin M. 2006. Fl. of Somalia 3: 328.

- Leucas hirundinaris** Sebald, Stuttgarter Beitr. Naturk. A, 308: 23, ♫ 24 (1978).  
 Isotypus: Tweedie 2277.  
 (K holotypus. Sebald, Stuttgarter Beitr. Naturk. A, 308: 23. 1978).  
 Kenya.
- Leucas minimifolia** Chiov., Fl. Somalia: 281 (1929).  
 Holotypus: Puccioni & Stefanini 703 [780].  
 Somalia.
- Leucas mogadoxensis** Chiov., Fl. Somalia II: 370, ♫ 369 (1932).  
 Syntypi: Senni 610; Paoli 45.  
 Somalia.
- Leucas mwingensis** Sebald, Stuttgarter Beitr. Naturk. A, 308: 25, ♫ 26 (1978).  
 Isotypus: Bally & Smith 15003.  
 (K holotypus. Sebald, Stuttgarter Beitr. Naturk. A, 308: 25. 1978).  
 Kenya.
- Leucas neumannii** Gürke, Bot. Jahrb. Syst. 36: 123 (1905).  
 Holotypus: Neumann 15 (B, destr.).  
 Isoneotypus: Mooney 5088 (K neotypus. Sebald, Stuttgarter Beitr. Naturk. A, 341: 113. 1980).  
 Ethiopia.
- Leucas ogadensis** Gürke, Bot. Jahrb. Syst. 36: 124 (1905).  
 Syntypi: Riva 40; Robecchi-Bricchetti 304, 306, 313, 481.  
 Ethiopia and Eritrea.
- Leucas ruspoliana** Gürke, Bot. Jahrb. Syst. 22: 134 (1895), nom. nud.  
 Exsiccatum: Riva 1313.  
 Ethiopia.
- Leucas tsavoensis** Sebald, Stuttgarter Beitr. Naturk. A, 298: 5, ♫ 7 (1977).  
 Isotypus: Greenway & Kanuri 12998.  
 (K holotypus. Sebald, Stuttgarter Beitr. Naturk. A, 298: 5. 1977).  
 Kenya.
- Leucas tsavoensis** Sebald var. **kilifiensis** Sebald, Stuttgarter Beitr. Naturk. A, 298: 9, ♫ 11 (1977).  
 Isotypus: Polhill & Paulo 815.  
 (K holotypus. Sebald, Stuttgarter Beitr. Naturk. A, 298: 9. 1977).  
 Kenya.
- (=) **Leucas glabrata** (Vahl) Sm., Cycl. 20 (2): Leucas no. 10 (1812).  
 Typi: Forsskål 217, 222 (only the plant on the left) (C syntypi).  
 Ref.: Ryding O. in Thulin M. 2006. Fl. of Somalia 3: 328.
- (=) **Leucas argentea** Gürke var. **neumannii** (Gürke) Sebald, Stuttgarter Beitr. Naturk. A, 341: 113, ♫ 112 (1980).  
 Ref.: Ryding O. in Hedberg I., Ensermu Kelbessa, Edwards S., Sebsebe Demissew & Persson E. 2006. Fl. of Ethiopia and Eritrea 5: 546, ♫ 547.
- (=) **Leucas jamesii** Baker, Bull. Misc. Inform. 1895: 225 (1895).  
 Typi: James & Thrupp s.n.; Cole s.n.; Lort-Phillips s.n. (K syntypi).  
 Ref.: Ryding O. in Hedberg I., Ensermu Kelbessa, Edwards S., Sebsebe Demissew & Persson E. 2006. Fl. of Ethiopia and Eritrea 5: 545, ♫ 547.
- (=) **Leucas cuneifolia** Baker, in Thiselton-Dyer W.T., Fl. Trop. Afr. 5 (3): 476 (1900).  
 Typus: James & Thrupp s.n. (K holotypus).  
 Ref.: Ryding O. in Hedberg I., Ensermu Kelbessa, Edwards S., Sebsebe Demissew & Persson E. 2006. Fl. of Ethiopia and Eritrea 5: 542, ♫ 544.

**Leucas urticifolia** (Vahl) R.Br. var. **angustifolia**  
Sebald, Stuttgarter Beitr. Naturk. A, 341: 137, ♦  
136, f. 75 (1980).

Holotypus/Isotypus: Fiori 27.  
Somalia.

**Micromeria biflora** (Buch.-Ham.ex D.Don) Benth. (=)  
var. **hirsuta** Fiori, Nuovo Giorn. Bot. Ital., n.s., 20:  
371 (1913).

Holotypus/Isotypus: Fiori 1570.  
Eritrea.

**Micromeria parvula** Chiov., Racc. Bot. Miss. (=)  
Consolata Kenya: 103 (1935).

Holotypus: Balbo 271\*.  
Kenya.

**Micromeria unguentaria** Schweinf., Beitr. Fl. Aethiop.:  
124 (1867).

Isolectotypus: Schimper 112.  
(Z lectotypus. Ryding, Bot. J. Linn. Soc. 155 (3):  
444. 2007).

Ethiopia.

**Ocimum falcatum** Gand., Bull. Soc. Bot. France 69: (=)  
349 (1922).

Holotypus/Isotypus: Fiori 4.  
Somalia.

**Ocimum simulans** Chiov., Atti Reale Accad. Italia, (=)  
Mem. Cl. Sci. Fis., Ser. 7: 11 (2): 53 (1940).

Holotypus: de Benedictis 461.  
Eritrea.

**Ocimum tomentosum** Oliv. var. **grandifolium** Chiov., (=)  
Result. Sc. Miss. Stefanini-Paoli Somal. Ital. I: 144  
(1916).

Holotypus: Paoli 588.  
Somalia.

**Orthosiphon bigibber** Chiov., Racc. Bot. Miss. (=)  
Consolata Kenya: 102 (1935).

Syntypi: Balbo 262\*, 263\*.  
Kenya.

**Orthosiphon bullosus** Chiov., Ann. Bot. (Rome)  
13 (3): 406 (1915).

Holotypus: Paoli 938.  
Somalia.

**Orthosiphon glutinosus** Chiov., Result. Sc. Miss. (=)  
Stefanini-Paoli Somal. Ital. I: 145 (1916).

Holotypus: Paoli 1196.  
Somalia.

**Micromeria imbricata** (Forssk.) C.Chr., Dansk  
Bot. Ark. 4, 3: 21 (1922).

Typi: Forsskål 210, 230, 231 (C syntypi).  
Ref.: Ryding O. 2007. Bot. J. Linn. Soc. 155  
(3): 429, ♦ 440.

**Clinopodium abyssinicum** (Benth.) Kuntze var.  
**abyssinicum**, Rev. Gen. Pl. 2: 515 (1891).

Typus: Schimper I 326 (K holotypus; BM, BR,  
S, STU, UPS isotypus).  
Ref.: Ryding O. in Beentje H.J., Ghazanfar S.A.  
& Polhill R.M. 2009. Fl. Trop. East Afr., Lamiaceae  
(Labiatae): 121.

**Ocimum forskoelii** Benth., Labiat. gen. spec. 1: 6  
(1832), as 'forskolei'.

Typus: Forsskål s.n. (BM holotypus; C  
isotypus).  
Ref.: Ryding O. in Thulin M. 2006. Fl. of  
Somalia 3: 337.

**Ocimum forskoelii** Benth., Labiat. gen. spec. 1: 6  
(1832), as 'forskolei'.

Typus: Forsskål s.n. (BM holotypus; C  
isotypus).  
Ref.: Paton A. 1992. Kew Bull. 47 (3): 427.

**Ocimum jamesii** Sebald, Stuttgarter Beitr.  
Naturk. A, 405: 3 (1987).

Typus: James & Thrupp s.n. (K holotypus).  
Ref.: Ryding O. in Thulin M. 2006. Fl. of  
Somalia 3: 340.

**Endostemon tereticaulis** (Poir.) M.Ashby, J. Bot.  
74: 129 (1936).

Typus: Herb. Desfontaines (FI holotypus).  
Ref.: Paton A. in Beentje H.J., Ghazanfar S.A.  
& Polhill R.M. 2009. Fl. Trop. East Afr., Lamiaceae  
(Labiatae): 206.

**Endostemon gracilis** (Benth.) M.Ashby, J. Bot.  
74: 127 (1936).

Typus: Bojer s.n. (K lectotypus).  
Ref.: Ryding O. in Thulin M. 2006. Fl. of  
Somalia 3: 343.

- Orthosiphon grandiflorus** A.Terracc., Bull. Soc. Bot. Ital. 1892: 424 (1892), as 'grandiflorum'.  
 Holotypus: Baudi & Candeo s.n.  
 Ethiopia.
- Orthosiphon obbiadensis* Chiov., Fl. Somalia: 276 (1929).  
 Holotypus: Puccioni & Stefanini 558 [612].  
 Somalia.
- Orthosiphon oblongifolius* Lanza, Miss. Biol. Borana, Racc. Bot. Angiosp.-Gymnos.: 185, ♀ 186 (1939).  
 Holotypus/Isotypus: Cufodontis 15.  
 Ethiopia.
- Otostegia ambigens* Chiov., Malpighia 34: 520 (1937).  
 Holotypus: Taschdjian 131.  
 Ethiopia.
- Otostegia longipetiolata* Chiov., Malpighia 34: 521 (1937).  
 Holotypus: Rovesti 111.  
 Eritrea.
- Otostegia minuccii* Pic.Serm., Miss. Stud. Lago Tana, VII, Ricerche Bot. I: 122, ♀ t. XXII (1951).  
 Holotypus: Pichi-Sermolli 2514.  
 Ethiopia.
- Otostegia modesta** S.Moore var. **buranensis** Sebald, Stuttgarter Beitr. Naturk. A, 263: 53, ♀ 54 (1973).  
 Holotypus/Isotypus: Hemming 2008.  
 Somalia.
- Plectranthus etiolatus* Chiov., Malpighia 34: 518 (1937).  
 Holotypus: Taschdjian 245.  
 Ethiopia.
- (=) **Endostemon obbiadensis** (Chiov.) M.Ashby, J. Bot. 74: 126 (1936).  
 Ref.: Ryding O. in Thulin M. 2006. Fl. of Somalia 3: 343.
- (=) **Endostemon kelleri** (Briq.) Ryding ex Paton & alii, Kew Bull. 49 (4): 712 (1994).  
 Typus: Keller 232 (K lectotypus).  
 Ref.: Ryding O. in Hedberg I., Ensermu Kelbessa, Edwards S., Sebsebe Demissew & Persson E. 2006. Fl. of Ethiopia and Eritrea 5: 580, ♀ 580.
- (=) **Otostegia tomentosa** A.Rich. subsp. **ambigens** (Chiov.) Sebald, Stuttgarter Beitr. Naturk. A, 263: 42, ♀ 41 (1973).  
 Ref.: Sebald O. in Hedberg I., Ensermu Kelbessa, Edwards S., Sebsebe Demissew & Persson E. 2006. Fl. of Ethiopia and Eritrea 5: 539, ♀ 539.
- (=) **Otostegia fruticosa** (Forssk.) Schweinf. ex Penz., Atti Congr. Bot. Genova: 356 (1893).  
 Typi: Forsskål 218, 224, 345, 1119 (C syntypi).  
 Ref.: Sebald O. in Hedberg I., Ensermu Kelbessa, Edwards S., Sebsebe Demissew & Persson E. 2006. Fl. of Ethiopia and Eritrea 5: 540.
- (=) **Otostegia tomentosa** A.Rich. subsp. **ambigens** (Chiov.) Sebald, Stuttgarter Beitr. Naturk. A, 263: 42, ♀ 41 (1973).  
 Typus: Taschdjian 131 (FT holotypus).  
 Ref.: Sebald O. in Hedberg I., Ensermu Kelbessa, Edwards S., Sebsebe Demissew & Persson E. 2006. Fl. of Ethiopia and Eritrea 5: 539, ♀ 539.
- Platostoma rotundifolium** (Briq.) A.J.Paton, Kew Bull. 52 (2): 287 (1997).  
 Typi: Mechow 451; Buchner 43 (B syntypi, destr.).  
 Ref.: Ryding O. in Hedberg I., Ensermu Kelbessa, Edwards S., Sebsebe Demissew & Persson E. 2006. Fl. of Ethiopia and Eritrea 5: 567, ♀ 568.

**Plectranthus gilletii** J.K.Morton, Kew Bull. 53 (4): 998 (1998).

Isotypus: Gillett 13721.

(K holotypus. Morton, Kew Bull. 53 (4): 998. 1998).

Kenya.

*Plectranthus malinvaldii* Briq., Bull. Herb. Boissier 2 (2): 125 (1894). (=)

Isolectotypus: Schimper 529 (G-DC lectotypus. Ryding O. Biol. Skr. 54: 160. 2001). Ethiopia.

**Plectranthus micranthus** Chiov., Nuovo Giorn. Bot. Ital., n.s., Bull. Soc. Bot. Ital. 1924: 44 (1924).

Holotypus: Mazzocchi-Alemanni 58 a. Angola.

*Plectranthus piliferus* Chiov., Nuovo Giorn. Bot. Ital., n.s., Bull. Soc. Bot. Ital. 1924: 44 (1924). (=)

Holotypus: Mazzocchi-Alemanni 58 b. Angola.

*Plectranthus quadridentatus* Schweinf. ex Baker, in Thiselton-Dyer W.T., Fl. Trop. Afr. 5 (3): 409 (1900). (=)

Isotypus: Schweinfurth & Riva 2086.

(K holotypus. Morton, Fl. of Ethiopia and Eritrea 5: 593. 2006).

Eritrea.

*Plectranthus salviiflorus* Chiov., Malpighia 34: 516 (1937). (=)

Syntypi: Taschdjian 124, 188. Ethiopia.

*Plectranthus schimperi* Chiov., Malpighia 34: 517 (1937), non Vatke (1872). (=)

Holotypus: Taschdjian 167. Ethiopia.

**Plectranthus socotranus** Radcl.-Sm., Hooker's Icon. Pl. 7 (4): t. 3692, ♫ t. 3692 (1971).

Isotypus: Radcliffe-Smith & Lavranos 499.

(K holotypus. Radcliffe-Smith, Hooker's Icon. Pl. 7 (4): t. 3692. 1971).

Yemen, Socotra.

**Plectranthus igniarius** (Schweinf.) Agnew, Upl. Kenya Wild Fl.: 638 (1974). (=)

Typus: Schimper 1623 (P neotypus).

Ref.: Morton J.K. in Hedberg I., Ensermu Kelbessa, Edwards S., Sebsebe Demissew & Persson E. 2006. Fl. of Ethiopia and Eritrea 5: 591, ♫ 592.

**Plectranthus djalonensis** (A.Chev.) A.J.Paton, Fl. Trop. East Afr., Lamiaceae (Labiatae): 286 (2009). (=)

Typus: Chevalier s.n. (P holotypus; K isotypus).

Ref.: Paton A. in Beentje H.J., Ghazanfar S.A. & Polhill R.M. 2009. Fl. Trop. East Afr., Lamiaceae (Labiatae): 286.

**Plectranthus prostratus** Gürke, Bot. Jahrb. Syst. 19: 206 (1894). (=)

Typus: Volkens 484; Fischer 497 (B syntypi, destr.).

Ref.: Morton J.K. in Hedberg I., Ensermu Kelbessa, Edwards S., Sebsebe Demissew & Persson E. 2006. Fl. of Ethiopia and Eritrea 5: 593, ♫ 592.

**Plectranthus garckeanaus** (Vatke) J.K.Morton, Novon 8 (3): 265 (1998). (=)

Typus: Schimper 1193 (B holotypus, destr.; BM, K isotypus).

Ref.: Morton J.K. in Hedberg I., Ensermu Kelbessa, Edwards S., Sebsebe Demissew & Persson E. 2006. Fl. of Ethiopia and Eritrea 5: 596.

**Isodon schimperi** (Vatke) J.K.Morton, Novon 8 (3): 265 (1998). (=)

Typus: Schimper 1174, 1179 (JE, W syntypi).

Ref.: Morton J.K. in Hedberg I., Ensermu Kelbessa, Edwards S., Sebsebe Demissew & Persson E. 2006. Fl. of Ethiopia and Eritrea 5: 566, ♫ 566.

- Pycnostachys deflexifolia* Baker var. *gattii* Fiori, (=) *Pycnostachys eminii* Gürke, Bot. Jahrb. Syst. 22: 145 (1895).  
 Nuovo Giorn. Bot. Ital., n.s., 47 (1): 38 (1940).  
 Holotypus: Gatti 338.  
 Ethiopia.
- Sabaudia erythraeae* Chiov., Bull. Soc. Bot. Ital. (≡) *Lavandula erythraeae* (Chiov.) Cufod., Bull. Jard. Bot. État 32 (4), Suppl.: 806 (1962).  
 1917: 54 (1917).  
 Syntypi: Pappi 4646, 4647.  
 Eritrea.
- Salvia simensis* Hochst. ex Avetta, Nuovo Giorn. Bot. Ital. 21: 335 (1889), nom. nud. (=) *Salvia nilotica* Juss. ex Jacq., Hort. bot. vindob. 3: 48, ♀ t. 92 (1776).  
 Exsiccatum: Ragazzi 5081/9793.  
 Ethiopia.
- Satureja contardoi* Pic.Serm., Miss. Stud. Lago Tana, VII, Ricerche Bot. I: 218, ♀ t. XLVII, XLVIII (1951). (=) *Micromeria imbricata* (Forssk.) C.Chr., Dansk Bot. Ark. 4, 3: 21 (1922).  
 Holotypus: Pichi-Sermolli 2689.  
 Ethiopia.
- Satureja ellenbeckii* Gürcke, Bot. Jahrb. Syst. 36: 129 (1905). (=) *Micromeria imbricata* (Forssk.) C.Chr. var. *villosa* (Elly Walther & K.H.Walther) Ryding, Bot. J. Linn. Soc. 155 (3): 442, ♀ 440 (2007).  
 Isoneotypus: Gillett 5319 (K neotypus. Ryding, Bot. J. Linn. Soc. 155 (3): 442. 2007).  
 Ethiopia.
- Scutellaria fulgens* Chiov., Ann. Bot. (Rome) 9 (2): 126 (1911). (=) *Scutellaria violascens* Gürke, Bot. Jahrb. Syst. 30: 392 (1901).  
 Holotypus/Isotypus: Chiovenda 764.  
 Ethiopia.
- Stachys bizensis* Schweinf. ex Baker in Thiselton-Dyer W.T., Fl. Trop. Afr. 5 (3): 468 (1900).  
 Isotypus: Schweinfurth & Riva 1847.  
 (K holotypus. <http://plants.jstor.org/specimen/k000193067>).  
 Eritrea.
- Thymus schimperi* Ronniger var. *pulvinaris* Chiov., Atti Reale Accad. Italia, Mem. Cl. Sci. Fis., Ser. 7: 11 (2): 55 (1940). (=) *Thymus schimperi* Ronniger subsp. *schimperi*, Repert. Spec. Nov. Regni Veg. 31: 98 (1932).  
 Holotypus: Senni 930.  
 Ethiopia.
- Typi: Stuhlmann 943, 3070, 3734 (B syntypi, destr.).  
 Ref.: Ryding O. in Hedberg I., Ensermu Kelbessa, Edwards S., Sebsebe Demissew & Persson E. 2006. Fl. of Ethiopia and Eritrea 5: 602, ♀ 603.
- Ref.: Ryding O. in Hedberg I., Ensermu Kelbessa, Edwards S., Sebsebe Demissew & Persson E. 2006. Fl. of Ethiopia and Eritrea 5: 564.
- Typus: cultivated in Hort. Vindob., not traced.  
 Ref.: Ryding O. in Hedberg I., Ensermu Kelbessa, Edwards S., Sebsebe Demissew & Persson E. 2006. Fl. of Ethiopia and Eritrea 5: 559, ♀ 561.
- Typi: Forsskål 210, 230, 231 (C syntypi).  
 Ref.: Ryding O. 2007. Bot. J. Linn. Soc. 155 (3): 429, ♀ 440.
- Typus: Dale 2695 (K holotypus).  
 Ref.: Ryding O. 2007. Bot. J. Linn. Soc. 155 (3): 442, ♀ 440.
- Typus: Goetze 993 (B holotypus, destr.).  
 Ref.: Ryding O. in Hedberg I., Ensermu Kelbessa, Edwards S., Sebsebe Demissew & Persson E. 2006. Fl. of Ethiopia and Eritrea 5: 530, ♀ 531.
- Typus: Schimper II/1178 (K isotypus).  
 Ref.: Sebsebe Demissew in Hedberg I., Ensermu Kelbessa, Edwards S., Sebsebe Demissew & Persson E. 2006. Fl. of Ethiopia and Eritrea 5: 553.

**Tinnea aethiopica** Kotschy ex Hook. f. subsp. **litoralis** Vollesen, Bot. Tidsskr. 70 (1): 19, ♀ 20 (1975).

Isotypus: Faulkner 1298.

(K holotypus. Vollesen, Bot. Tidsskr. 70 (1): 19. 1975).

Tanzania.

## LOGANIACEAE

**Mostuea sennii** Chiov., Fl. Somalia II: 304, ♀ 303 (=) (1932).

Holotypus: Senni 104.  
Somalia.

**Strychnos barbata** Chiov., Fl. Somalia II: 305, ♀ 306 (=) (1932).

Holotypus: Senni 262.  
Somalia.

**Strychnos mueghe** Chiov., Racc. Bot. Miss. Consolata (=) Kenya: 83 (1935).

Lectotypus: Balbo 687\* (Leeuwenberg. Meded. Landbouwhogeschool Wageningen 69 (1): 239. 1969).

Syntypus: Balbo 686\*.  
Kenya.

**Strychnos spinosa** Lam. var. *arborea* Chiov., Ann. Bot. (Rome) 9 (1): 81 (1911).

Holotypus: Chiovenda 663.  
Ethiopia.

**Strychnos unguacha** A.Rich. var. *retusa* Chiov., Fl. Somalia II: 305 (1932).

Lectotypus: Senni 481 (Leeuwenberg. Meded. Landbouwhogeschool Wageningen 69 (1): 239. 1969).

Syntypus: Senni 89.  
Somalia.

**Mostua microphylla** Gilg, Pflanzenw. Ost-Afrikas C: 310 (1895).

Typus: Stuhlmann 6172 (B holotypus, destr.).  
Ref.: Thulin M. 2006. Fl. of Somalia 3: 112, ♀ 112.

**Strychnos henningsii** Gilg, Bot. Jahrb. Syst. 17: 569 (1893).

Typus: Bachmann 1745 (E lectotypus).  
Ref.: Thulin M. 2006. Fl. of Somalia 3: 112, ♀ 111.

**Strychnos spinosa** Lam., Tabl. Encycl. 2: 38 (1794).

Typus: Lamarck s.n. (P holotypus).  
Ref.: Leeuwenberg A.J.M. 1969. Meded. Landbouwhogeschool Wageningen 69 (1): 239, ♀ 241.

**Strychnos spinosa** Lam., Tabl. Encycl. 2: 38 (1794).

Typus: Lamarck s.n. (P holotypus).  
Ref.: Leeuwenberg A.J.M. 1969. Meded. Landbouwhogeschool Wageningen 69 (1): 239, ♀ 241.

**Strychnos spinosa** Lam., Tabl. Encycl. 2: 38 (1794).

Typus: Lamarck s.n. (P holotypus).  
Ref.: Thulin M. 2006. Fl. of Somalia 3: 112.

## LYTHRACEAE

**Ammannia attenuata** Hochst. ex A.Rich. var. *micromeroides* Chiov., Bull. Soc. Bot. Ital. 1917: 27 (1917).

Syntypi: Pappi 9000, 9052.  
Eritrea.

**Rotala debilissima** Chiov., Ann. Bot. (Rome) 9 (1): 61 (1911).

Holotypus: Pappi 769.  
Eritrea.

**Ammannia baccifera** L. subsp. **baccifera**, Sp. pl. 1: 120 (1753).

Typus: LINN 156.4 (LINN lectotypus).  
Ref.: Gilbert M.G. in Edwards S., Mesfin Tadesse, Sebsebe Demissew & Hedberg I. 2000. Fl. of Ethiopia and Eritrea 2 (1): 405, ♀ 403.

**Rotala filiformis** (Bellardi) Hiern, in Oliver D., Fl. Trop. Afr. 2: 468 (1871).

Typus: Suffren s.n. (TO holotypus).  
Ref.: Gilbert M.G. in Edwards S., Mesfin Tadesse, Sebsebe Demissew & Hedberg I. 2000. Fl. of Ethiopia and Eritrea 2 (1): 408, ♀ 407.

## MALVACEAE

- Abutilon benadirensense* Mattei, Boll. Reale Orto Bot. Giardino Colon. Palermo 1 (2): 96 (1915).  
 Syntypus: Paoli 244.  
 Somalia.
- Abutilon blepharocarpum* Mattei, Boll. Reale Orto Bot. Giardino Colon. Palermo 1 (2): 93 (1915).  
 Syntypus: Scassellati 132/15.  
 Somalia.
- Abutilon smenospermum* Pic.Serm., Miss. Stud. Lago Tana, VII, Ricerche Bot. I: 92, ♀ t. XVI (1951).  
 Holotypus: Pichi Sermolli 2323.  
 Ethiopia.
- Abutilon somalense** Mattei, Boll. Reale Orto Bot. Giardino Colon. Palermo 1 (2): 81 (1915).  
 Syntypi: Paoli 48, 113.  
 Somalia.
- Abutilon webbianum* Mattei, Boll. Reale Orto Bot. Giardino Colon. Palermo 1 (2): 96 (1915).  
 Syntypus: Mangano s.n.  
 Somalia.
- Abutilon sp. = Meyer 8848**, K. Vollesen, Fl. of Ethiopia and Eritrea 2 (2): 242 (1995).  
 Exsicc. (pro typus): Meyer 8848.  
 Ethiopia.
- Cienfuegosia althaeoides* Chiov., Racc. Bot. Miss. Consolata Kenya: 11 (1935).  
 Holotypus: Balbo 316\*.  
 Kenya.
- Cienfuegosia bricchettii* Ulbr., Bot. Jahrb. Syst. 48: 378 (1912).  
 Isotypus: Robecchi-Bricchetti 338.  
 (B holotypus, destr. Thulin, Fl. of Somalia 2: 61, 1999).  
 Somalia.
- Cienfuegosia chiarugii* Chiov., Fl. Somalia: 101, ♀ t. III, f. 3 (1929).  
 Holotypus: Puccioni & Stefanini 617 [680].  
 Somalia.
- Cienfuegosia hildebrandtii** Garcke, Jahrb. Königl. Bot. Gart. Berlin 2: 337 (1883).  
 Neotypus: Drummond & Hemsley 2285 (Fryxell, Ann. Missouri Bot. Gard. 56 (2): 197. 1969).  
 Tanzania.
- Gossypium benadirensense* Mattei, Boll. Stud. Inform. Reale Giardino Coloniale, ii: 223 (1916).  
 Holotypus: Paoli 995.  
 Somalia.
- (=) **Abutilon pannosum** (G.Forst.) Schltdl., Bot. Zeitung (Berlin) 9: 828 (1851).  
 Typus: Forster s.n. (BM holotypus).  
 Ref.: Thulin M. 1999. Fl. of Somalia 2: 78.
- (=) **Abutilon guineense** (Schumach. & Thonn.) Baker f. & Exell, J. Bot. 74 (Suppl.): 22 (1936).  
 Typus: Thonning 38 (C, S syntypus).  
 Ref.: Thulin M. 1999. Fl. of Somalia 2: 79.
- (=) **Abutilon longicuspe** A.Rich. var. **cecilii** (N.E.Br.) Verdc., Fl. Trop. East Afr., Malvaceae: 120 (2009).  
 Typus: Cecil 196 (K holotypus).  
 Ref.: Verdcourt B. in Beentje H.J. & Ghazanfar S.A. 2009. Fl. Trop. East Afr., Malvaceae: 120.
- Abutilon figarianum** Webb, Fragm. fl. aethiop.-aegypt.: 52 (1854).  
 Typus: Kotschy 180 (P lectotypus; E, K, MO isotypus).  
 Ref.: Thulin M. 1999. Fl. of Somalia 2: 78.
- (=) **Hibiscus ludwigii** Eckl. & Zeyh., Enum. pl. afr. austral. 1: 39 (1834).  
 Typus: Ecklon & Zeyher 312 (M isotypus).  
 Ref.: Fryxell P.A. 1969. Ann. Missouri Bot. Gard. 56 (2): 241.
- (=) **Gossypium bricchettii** (Ulbr.) Vollesen, Kew Bull. 42 (2): 349 (1987).  
 Ref.: Thulin M. 1999. Fl. of Somalia 2: 61, ♀ 60.
- (=) **Cienfuegosia welshii** (T.Anderson) Garcke, Jahrb. Königl. Bot. Gart. Berlin 2: 337 (1883).  
 Typus: Hook & T. (K holotypus?).  
 Ref.: Thulin M. 1999. Fl. of Somalia 2: 56, ♀ 58.
- (=) **Gossypium bricchettii** (Ulbr.) Vollesen, Kew Bull. 42 (2): 349 (1987).  
 Typus: Robecchi-Bricchetti 338 (FT isotypus).  
 Ref.: Thulin M. 1999. Fl. of Somalia 2: 61, ♀ 60.

- Gossypium paolii* Mattei, Boll. Stud. Inform. Reale Giardino Colon., ii: 223 (1916). (=) *Gossypium somalense* (Gürke) J.B.Hutch., Silow & S.G.Stephens, Evol. Gossypium: 31 (1947). Holotypus: Paoli 543. Typus: Ellenbeck 220 (B holotypus, destr.). Ref.: Thulin M. 1999. Fl. of Somalia 2: 60, ♦ 60.
- Hibiscus baidoensis* Chiov., Fl. Somalia: 100 (1929). (=) *Hibiscus ovalifolius* (Forssk.) Vahl, Symb. bot. 1: 50 (1790). Syntypi: Puccioni & Stefanini 321 [368], 326 [373]. Typi: Forsskål 600, 1811 (C syntypi). Ref.: Thulin M. 1999. Fl. of Somalia 2: 42, ♦ 43.
- Hibiscus baidoensis* Chiov. var. *parvifolius* Chiov., Fl. Somalia: 101 (1929). (=) *Hibiscus ovalifolius* (Forssk.) Vahl, Symb. bot. 1: 50 (1790). Holotypus: Puccioni & Stefanini 279 [313]. Typi: Forsskål 600, 1811 (C syntypi). Ref.: Thulin M. 1999. Fl. of Somalia 2: 42, ♦ 43.
- Hibiscus benadirensis* Mattei, Result. Sc. Miss. Stefanini-Paoli Somal. Ital. I: 31 (1916). (=) *Hibiscus erlangeri* (Gürke) Thulin, Kew Bull. 53 (4): 1013 (1998). Syntypi: Paoli 560, 862. Typus: Ellenbeck 2227 (B holotypus, destr); Thulin, Hedrén & Abdi Dahir 7750 (UPS neotypus; FT, K isoneotypus). Ref.: Thulin M. 1999. Fl. of Somalia 2: 54, ♦ 55.
- Hibiscus boranensis** Cufod., Ann. Naturhist. Mus. Wien 56: 33 (1948). Isotypus: Cufodontis 187. (W holotypus. Vollesen, Fl. of Ethiopia and Eritrea 2 (2): 208. 1995). Ethiopia.
- Hibiscus capillipes* Mattei, Result. Sc. Miss. Stefanini-Paoli Somal. Ital. I: 31 (1916). (=) *Hibiscus micranthus* L.f., Suppl. pl.: 308 (1781). Syntypi: Paoli 893, 1258. Typus: König s.n. (LINN holotypus). Ref.: Thulin M. 1999. Fl. of Somalia 2: 52, ♦ 53.
- Hibiscus cernuus* A.Terracc., Nuovo Giorn. Bot. Ital. 24: 422 (1892); nom. illeg., non Kuntze (1891). Holotypus: Baudi & Candeo s.n. Ethiopia.
- Hibiscus chiovendae* Cufod., Miss. Biol. Borana, Racc. Bot. Angiosp.-Gymnosp.: 129, ♦ 130 (1939). (=) Holotypus: Cufodontis 332. Ethiopia.
- Hibiscus corymbosus* Hochst. ex A.Rich. var. *integrigolia* Chiov., Ann. Bot. (Rome) 9 (1): 52 (1911). Holotypus: Chiovenda 2691. Ethiopia.
- Hibiscus fallacinus* Chiov., Atti Ist. Bot. Univ. Pavia, serie IV, 7: 125 (1936). (=) Holotypus: Ciferri 71. Somalia.
- Hibiscus dongolensis* Delile, Cent. Pl. Méroé: 59 (1826). Typus: Ellenbeck 1723 (B holotypus, destr.). Ref.: Thulin M. 1999. Fl. of Somalia 2: 42, ♦ 44.

- Hibiscus lanzae* Cufod., Miss. Biol. Borana, Racc. Bot. Angiosp.-Gymnosp.: 131, ♦ 132 (1939). (=) **Hibiscus ovalifolius** (Forssk.) Vahl, Symb. bot. 1: 50 (1790).  
Holotypus: Cufodontis 301.  
Ethiopia.
- Hibiscus micranthus* L.f. var. *grandifolius* Fiori, Agric. Colon. 5, App.: 258 (1912). (=) **Hibiscus meyeri** Harv. subsp. **meyeri**, Fl. Cap. 1: 173 (1861).  
Syntypi: Fiori 643, 644.  
Eritrea.
- Hibiscus minimifolius* Chiov., Fl. Somalia: 98 (1929). (=) **Hibiscus somalensis** Franch., Sert. Som. in Révoil, Faune et Flore des Pays Comalis: 16 (1882).  
Holotypus: Puccioni & Stefanini 495 [548].  
Somalia.  
Typus: Drege s.n. (TCD holotypus).  
Ref.: Mwachala G.M. in Beentje H.J. & Ghazanfar S.A. 2009. Fl. Trop. East Afr., Malvaceae: 49.
- Hibiscus paolii** Mattei, Result. Sc. Miss. Stefanini-Paoli Somal. Ital. I: 32 (1916).  
Holotypus: Paoli 699.  
Somalia.
- Hibiscus pavonoides* Fiori, Nuovo Giorn. Bot. Ital., n.s., 20, Mem. Soc. Bot. Ital.: 46, ♦ 46 (1913). (=) **Hibiscus dictyocarpus** Webb, Fragm. fl. aethiop.-aegypt.: 46 (1854).  
Syntypi: Fiori 3, 19.  
Somalia.  
Typus: Kotschy 124 (WAG, K, M, MO, BM isotypus).  
Ref.: Thulin M. 1999. Fl. of Somalia 2: 50, ♦ 51.
- Hibiscus rupestris* Hochst. ex Cufod., Ann. Naturhist. Mus. Wien 56: 55 (1948). (=) **Hibiscus eriospermus** Hochst. ex Cufod., Ann. Naturhist. Mus. Wien 56: 38 (1948).  
Isotypus: Schimper 301.  
(W holotypus. Vollesen, Fl. of Ethiopia and Eritrea 2 (2): 209. 1995).  
Ethiopia.  
Typus: Schimper I 130 (P holotypus; K, M isotypus).  
Ref.: Vollesen K. in Edwards S., Mesfin Tadesse & Hedberg I. 1995. Fl. of Ethiopia and Eritrea 2 (2): 209.
- Hibiscus socotranus** G.L Lucas, Hooker's Icon. Pl. 7 (4): t. 3675, ♦ t. 3675 (1971).  
Isotypus: Radcliffe-Smith & Lavranos 138.  
(K holotypus. Lucas, Hooker's Icon. Pl. 7 (4): t. 3675. 1971).  
Yemen, Socotra.
- Hibiscus spartoides** Chiov., Fl. Somalia: 99, ♦ t. III, f. 2 (1929).  
Syntypi: Puccioni & Stefanini 645 [709], 755 [836].  
Somalia.
- Lavatera abyssinica** Hutch. & E.A.Bruce, Bull. Misc. Inform. 1941: 107 (1941).  
Isotypus: Gillett 5195.  
(K holotypus. Vollesen, Fl. of Ethiopia and Eritrea 2 (2): 237. 1995).  
Ethiopia.
- Luederitzia pirottae* A.Terracc., Nuovo Giorn. Bot. Ital. 24: 423 (1892). (=) **Pavonia pirottae** (A.Terracc.) Chiov., Ann. Bot. (Rome) 13 (3): 401 (1915).  
Holotypus: Baudi & Candeo s.n.  
Ethiopia.  
Ref.: Vollesen K. in Edwards S., Mesfin Tadesse & Hedberg I. 1995. Fl. of Ethiopia and Eritrea 2 (2): 233, ♦ 235.

- Pavonia arabica** Hochst. & Steud. ex Boiss. var. *procumbens* A.Terracc., Annuario Reale Ist. Bot. Roma 5 (3): 112 (1894).  
 Holotypus: Terracciano 174 (1942).  
 Eritrea.  
 The specimen 'Terracciano 174 (1942)' has been published by Chiovenda (Ann. Bot. (Rome) 13 (3): 400. 1915) as a syntype of '*Pavonia erythraeae*'.
- Pavonia erythraeae** Chiov., Ann. Bot. (Rome) 13 (3): 400 (1915).  
 Syntypi: Terracciano 14, 57, 227, 228; Tellini 252, 534.  
 Eritrea.
- Pavonia flavescens** Mattei, Result. Sc. Miss. Stefanini-Paoli Somal. Ital. I: 28 (1916).  
 Holotypus: Paoli 1050.  
 Somalia.
- Pavonia glechomifolia** (A.Rich.) Garcke var. *glabrescens* Ulbr., Bot. Jahrb. Syst. 57: 120 (1920).  
 Isosyntypi: Schimper 169; Schweinfurth & Riva 573.  
 Eritrea.
- Pavonia haematophthalmos** Chiov., Fl. Somalia 2: 21, ( = ) 22 (1932).  
 Holotypus: Senni 724.  
 Somalia.
- Pavonia kotschyi** Hochst. ex Webb var. *glutinosa* Mattei, Result. Sc. Miss. Stefanini-Paoli Somal. Ital. I: 28 (1916).  
 Syntypi: Paoli 72 bis, 81, 97.  
 Somalia.
- Pavonia kotschyi** Hochst. ex Webb var. *mollissima* Mattei, Result. Sc. Miss. Stefanini-Paoli Somal. Ital. I: 29 (1916).  
 Syntypi: Paoli 31, 104.  
 Somalia.
- Pavonia marginata** Thulin, Nordic J. Bot. 19 (2): 206, ( = ) 205 (1999).  
 Holotypus: Hemming 3398.  
 Somalia.
- Pavonia melhanoides** Thulin, Nordic J. Bot. 5 (2): 153, ( = ) 154 (1985).  
 Isotypus: Thulin, Hunde & Tadesse 3488.  
 (UPS holotypus. Thulin, Nordic J. Bot. 5 (2): 153. 1985).  
 Ethiopia.
- Pavonia arabica** Hochst. & Steud. ex Boiss., Fl. orient. I: 837 (1867).  
 Typus: Schimper 889 (G lectotypus; K, BM, P isolectotypus).  
 Ref.: Vollesen K. in Edwards S., Mesfin Tadesse & Hedberg I. 1995. Fl. of Ethiopia and Eritrea 2 (2): 232, ( = ) 235.
- Pavonia arabica** Hochst. & Steud. ex Boiss., Fl. orient. I: 837 (1867).  
 Typus: Schimper 889 (G lectotypus; K, BM, P isolectotypus).  
 Ref.: Vollesen K. in Edwards S., Mesfin Tadesse & Hedberg I. 1995. Fl. of Ethiopia and Eritrea 2 (2): 232, ( = ) 235.
- Pavonia serrata** Franch., Sert. Som. in Révoil, Faune et Flore des Pays Comalis: 18 (1882).  
 Typus: Révoil 22 (P holotypus).  
 Ref.: Thulin M. 1999. Fl. of Somalia 2: 70, ( = ) 69.
- Pavonia flavoferruginea** (Forssk.) Hepper & J.R.I.Wood, Kew Bull. 38: 85 (1983).  
 Typus: Forsskål 603 (C holotypus).  
 Ref.: Thulin M. 1999. Fl. of Somalia 2: 65, ( = ) 64.  
 Link: *Pavonia glechomifolia* (A.Rich.) Garcke. Vollesen, Fl. of Ethiopia and Eritrea 2 (2): 226, ( = ) 227 (1995).
- Pavonia flavoferruginea** (Forssk.) Hepper & J.R.I.Wood, Kew Bull. 38: 85 (1983).  
 Typus: Forsskål 603 (C holotypus).  
 Ref.: Thulin M. 1999. Fl. of Somalia 2: 65, ( = ) 64.
- Pavonia matteiana** Thulin, Nordic J. Bot. 19 (2): 202, ( = ) 202 (1999).  
 Typus: Thulin & Abdi Dahir 6441 (UPS holotypus; K isotypus).  
 Ref.: Thulin M. 1999. Fl. of Somalia 2: 72, ( = ) 71.
- Pavonia kotschyi** Hochst. ex Webb, Fragm. fl. aethiop.-aegypt.: 43 (1854).  
 Typus: Kotschy 12 (EA, WAG, MO, BR isotypus).  
 Ref.: Thulin M. 1999. Fl. of Somalia 2: 72, ( = ) 69.

- Pavonia minimifolia* Chiov., Fl. Somalia: 96 (1929).  
 Holotypus: Puccioni & Stefanini 650 [714].  
 Somalia.
- Pavonia paolii* Mattei, Result. Sc. Miss. Stefanini-Paoli Somal. Ital. I: 29, ♦ t. 3, f. B (1916).  
 Holotypus: Paoli 78.  
 Somalia.
- Pavonia propinquua** Gärcke, in Schweinf. Beitr. Fl. Aethiop. 55 (1867).  
 Isotypus: Schimper 134.  
 (B holotypus, destr. Verdcourt, Fl. Trop. East Afr., Malvaceae: 20. 2009).  
 Ethiopia.
- Pavonia pseudoarabica* Mattei, Result. Sc. Miss. Stefanini-Paoli Somal. Ital. I: 30 (1916).  
 Holotypus: Paoli 537.  
 Somalia.
- Pavonia rufescens* Mattei, Result. Sc. Miss. Stefanini-Paoli Somal. Ital. I: 30 (1916).  
 Holotypus: Paoli 1231.  
 Somalia.
- Pavonia sennii* Chiov., Fl. Somalia II: 23, ♦ 24 (1932).  
 Holotypus: Senni 270.  
 Somalia.
- Pavonia somalensis* Mattei, nom. illeg., non Franch. 1882, Result. Sc. Miss. Stefanini-Paoli Somal. Ital. I: 30 (1916).  
 Holotypus: Paoli 1239.  
 Somalia.  
 Ulbrich, in Bot. Jahrb. Syst. 57: 143 (1920), published '*Pavonia stefaninii*' with the same type.
- Pavonia zeylanica* Cav. var. *subquinqueloba* Ulbr., Bot. Jahrb. Syst. 57: 154 (1920).  
 Isosyntypus: Schimper 31.  
 Ethiopia.
- Pavonia zeylanica* Cav. var. *viscosa* Mattei, nom. nud., Result. Sc. Miss. Stefanini-Paoli Somal. Ital. I: 31 (1916).  
 Holotypus: Paoli 880.  
 Somalia.
- Pavonia sp. = Corradi 3527**, K. Vollesen, Fl. of Ethiopia and Eritrea 2 (2): 234 (1995).  
 Exsicc. (pro typus): Corradi 3527.  
 Ethiopia.
- (=) **Pavonia pirottae** (A. Terracc.) Chiov., Ann. Bot. (Rome) 13 (3): 401 (1915).  
 Typus: Baudi & Candeo s.n. (FT holotypus).  
 Ref.: Thulin M. 1999. Fl. of Somalia 2: 68, ♦ 69.
- (=) **Pavonia zeylanica** Cav., Diss. 3: 134, ♦ t. XLVIII, f. 2 (1787).  
 Typi: from Ceylon.  
 Ref.: Thulin M. 1999. Fl. of Somalia 2: 67, ♦ 69.
- (=) **Pavonia arabica** Hochst. & Steud. ex Boiss., Fl. orient. 1: 837 (1867).  
 Typus: Schimper 889 (G lectotypus; K, BM, P isolectotypus).  
 Ref.: Thulin M. 1999. Fl. of Somalia 2: 68, ♦ 69.
- (=) **Pavonia ellenbeckii** Gürke, Bot. Jahrb. Syst. 33: 378 (1904).  
 Typi: Ellenbeck 1031, 2232 (B syntypi, destr.?).  
 Ref.: Thulin M. 1999. Fl. of Somalia 2: 70, ♦ 69.
- (=) **Pavonia mollissima** (Gärcke) Ulbr., Bot. Jahrb. Syst. 57: 150 (1920).  
 Typus: Hildebrandt 1928 (B holotypus, destr.; BM, K isotypus).  
 Ref.: Thulin M. 1999. Fl. of Somalia 2: 70.
- (=) **Pavonia procumbens** (Wight & Arn.) Walp., Repert. bot. syst. 1: 301 (1842).  
 Typi: from India, not known, Wallich 2688 (K-W lectotypus).  
 Ref.: Thulin M. 1999. Fl. of Somalia 2: 65, ♦ 64.
- (=) **Pavonia zeylanica** Cav., Diss. 3: 134, ♦ t. XLVIII, f. 2 (1787).  
 Typi: from Ceylon.  
 Ref.: Vollesen K. in Edwards S., Mesfin Tadesse & Hedberg I. 1995. Fl. of Ethiopia and Eritrea 2 (2): 233, ♦ 235.
- (=) **Pavonia zeylanica** Cav., Diss. 3: 134, ♦ t. XLVIII, f. 2 (1787).  
 Typi: from Ceylon.  
 Ref.: Thulin M. 1999. Fl. of Somalia 2: 67, ♦ 69.

- Senra incana* Cav. subsp. *migiurtinorum* Chiov., Fl. Somalia: 97 (1929).  
 Syntypi: Puccioni & Stefanini 641 [702], 675 [741].  
 Somalia.
- Senra nubica* Webb var. *scassellatii* Mattei, Boll. Reale Orto Bot. Giardino Colon. Palermo, n.s., 2 (1): 67 (1917).  
 Holotypus: Scassellati 132.  
 Somalia.
- Sida massaica** Vollesen, Kew Bull. 41 (1): 97, ♀ 93 (1986).  
 Isotypus: Kabuye & Ng'weno 507.  
 (K holotypus. Vollesen, Kew Bull. 41 (1): 97. 1986).  
 Kenya.
- Sida ogadensis** Thulin & Vollesen, Nordic J. Bot. 19 (4): 422, ♀ 422 (1999).  
 Isotypus: Kuchar 17741.  
 (UPS holotypus. Thulin, Nordic J. Bot. 19 (4): 422. 1999).  
 Somalia.
- Sympyochlamys erlangeri* Gürke, Bot. Jahrb. Syst. 33: 379 (1903).  
 Isoneotypus: Thulin, Hedrén & Abdi Dahir 7750.  
 (UPS neotypus. Thulin, Kew Bull. 53 (4): 1013. 1998).  
 Somalia.
- Thespisia danis* Oliv. var. *grandibracteata* Chiov., Fl. Somalia II: 28 (1932).  
 Syntypi: Senni 99, 537.  
 Somalia.
- Thespisia danis* Oliv. var. *somalica* Chiov., Fl. Somalia II: 28 (1932).  
 Syntypi: Senni 5, 32, 149, 177; Gorini 28, 86, 156, 216, 250, 420.  
 Somalia.
- Senra incana** Cav., Diss. 2: 83, ♀ t. XXXV, f. 3 (1786).  
 Typus: Arabia, opposite Socotra island, collector unknown but communicated by Joseph Banks (MA holotypus).  
 Ref.: Thulin M. 1999. Fl. of Somalia 2: 56, ♀ 57.
- Senra incana** Cav., Diss. 2: 83, ♀ t. XXXV, f. 3 (1786).  
 Typus: Arabia, opposite Socotra island, collector unknown but communicated by Joseph Banks (MA holotypus).  
 Ref.: Thulin M. 1999. Fl. of Somalia 2: 56, ♀ 57.
- Hibiscus erlangeri** (Gürke) Thulin, Kew Bull. 53 (4): 1013 (1998).  
 Ref.: Thulin M. 1999. Fl. of Somalia 2: 54, ♀ 55.
- Thespisia danis** Oliv., Hooker's Icon. Pl. t. 1336 (1881).  
 Typus: Wakefield s.n. (K holotypus).  
 Ref.: Thulin M. 1999. Fl. of Somalia 2: 61, ♀ 62.
- Thespisia danis** Oliv., Hooker's Icon. Pl. t. 1336 (1881).  
 Typus: Wakefield s.n. (K holotypus).  
 Ref.: Thulin M. 1999. Fl. of Somalia 2: 61, ♀ 62.

## MELIANTHACEAE

- Bersama giuliarelli* Chiov., Atti Reale Accad. Ital., (=) Mem. Cl. Sci. Fis., Ser. 7, 11 (2): 26 (1940).  
 Holotypus/Isotypus: Giugliarelli 550.  
 Ethiopia.
- Bersama abyssinica** Fresen. subsp. **abyssinica**, Mus. Senckenberg. 2: 281 (1837).  
 Typus: Rüppell (FR holotypus).  
 Ref.: Verdcourt B. in Hedberg I. & Edwards S. 1989. Fl. of Ethiopia 3: 511, ♀ 512.

## MYRTACEAE

- Eugenia somalensis* Chiov., Fl. Somalia II: 217, ♫ 217 (=) *Eugenia capensis* (Eckl. & Zeyh.) Sond. subsp. *multiflora* Verdc., Kew Bull. 54 (1): 43, ♫ 45 (1999).  
Holotypus: Senni 154.  
Somalia.
- Typus: Verdcourt 5283 (K holotypus; EA isotypus).  
Ref.: Verdcourt B. in Beentje H.J. & Smith S.A.L. 2001. Fl. Trop. East Afr., Myrtaceae: 58.  
Link: *Eugenia capensis* (Eckl. & Zeyh.) Sond. subsp. *aschersoniana* (F.Hoffm.) F.White. Thulin & Moggi, Fl. of Somalia 1: 244 (1993).

## OCHNACEAE

- Heteroporidium abyssinicum* Tiegh., Ann. Sci. Nat., Bot. sér. 8, 16: 378 (1902). (=) *Ochna inermis* (Forssk.) Schweinf. ex Penz., Atti Congr. Bot. Int. Genova 1892: 335 (1893).  
Isosyntypi: Schweinfurth & Riva 664, 1726.  
Eritrea.
- Typus: Forsskål 760 (C holotypus).  
Ref.: Vollesen K. in Edwards S., Mesfin Tadesse & Hedberg I. 1995. Fl. of Ethiopia and Eritrea 2 (2): 67, ♫ 68.
- Ochna boranensis* Cufod., Miss. Biol. Borana, Racc. Bot. Angiosp.-Gymnosp.: 138, ♫ 139 (1939). (=) *Ochna insculpta* Sleumer, Notizbl. Bot. Gart. Berlin-Dahlem 12: 68 (1934).  
Syntypi: Cufodontis 291, 353.  
Ethiopia.
- Typus: R.E. & T.C.E. Fries 2028 (UPS holotypus).  
Ref.: Vollesen K. in Edwards S., Mesfin Tadesse & Hedberg I. 1995. Fl. of Ethiopia and Eritrea 2 (2): 67, ♫ 69.
- Ochna leucophloeos* Hochst. ex A.Rich. var. *micropetala* Fiori, Boschi e piante legn. Eritr.: 264 (1912). (=) *Ochna inermis* (Forssk.) Schweinf. ex Penz., Atti Congr. Bot. Int. Genova 1892: 335 (1893).  
Syntypi: Beccari 16, 259.  
Eritrea.
- Typus: Forsskål 760 (C holotypus).  
Ref.: Vollesen K. in Edwards S., Mesfin Tadesse & Hedberg I. 1995. Fl. of Ethiopia and Eritrea 2 (2): 67, ♫ 68.
- Ochna rivae* Engl., Annuario Reale Ist. Bot. Roma 7 (1): 21 (1897). (=) *Ochna inermis* (Forssk.) Schweinf. ex Penz., Atti Congr. Bot. Int. Genova 1892: 335 (1893).  
Holotypus: Riva 1618.  
Ethiopia.
- Typus: Forsskål 760 (C holotypus).  
Ref.: Vollesen K. in Edwards S., Mesfin Tadesse & Hedberg I. 1995. Fl. of Ethiopia and Eritrea 2 (2): 67, ♫ 68.

## OLEACEAE

- Jasminum abyssinicum* Hochst. ex DC. var. *amplifolium* Fiori, Nuovo Giorn. Bot. Ital., n.s. 47: 34 (1940). (=) *Jasminum abyssinicum* Hochst. ex DC., Prodr. 8: 311 (1844).  
Syntypi: Saccardo 9, 29.  
Ethiopia.
- Typus: Schimper I 169 (BM, K, BR, M isotypi).  
Ref.: Green P.S. in in Hedberg I., Edwards S. & Sileshi Nemomissa 2003. Fl. of Ethiopia and Eritrea 4 (1): 85, ♫ 85.

- Jasminum bogosense* Becc. ex Martelli, Fl. Bogos.: 51 (= 1886).  
 Holotypus: Beccari 184.  
 Eritrea.
- Jasminum floribundum* R.Br. ex Fresen. f. *decipiens* Di Capua, Annuario Reale Ist. Bot. Roma 8: 208 (1904).  
 Syntypi: Schweinfurth & Riva 997; Pappi 3398, 3814; Terracciano & Pappi 221, 225, 332, 372, 908, 1128, 1264, 2561.  
 Eritrea.
- Jasminum fluminense*** Vell. subsp. ***socotranum*** P.S.Green, Kew Bull. 24 (1): 228 (1970).  
 Isotypus: Radcliffe-Smith & Lavranos 307 (K holotypus. Green, Kew Bull. 24 (1): 228. 1970).  
 Yemen, Socotra.
- Jasminum mathildae* Chiov., Ann. Bot. (Rome) 9 (= 1): 79 (1911).  
 Syntypi: Chiovenda 506, 3196.  
 Ethiopia.
- Jasminum punctulatum*** Chiov., Fl. Somalia II: 279, ♫ 278 (1932).  
 Syntypi: Senni 85, 90.  
 Somalia.
- Jasminum schweinfurthii* Gilg var. *chisimajense* (= Chiov., Fl. Somalia II: 279, ♫ 280 (1932).  
 Holotypus: Gorini 371.  
 Somalia.
- Jasminum tomentosum* Knobl. var. *somalense* Fiori, Result. Sc. Miss. Stefanini-Paoli Somal. Ital. I: 111 (1916).  
 Syntypi: Paoli 98, 99.  
 Somalia.
- Linociera giordanii* Chiov., Atti Reale Accad. Italia, Mem. Cl. Sc. Fis., Ser. 7: 11 (2): 50 (1940).  
 Holotypus: Giordano 2396 bis.  
 Ethiopia.
- Olea mussolini* Chiov., Atti Reale Accad. Italia, Mem. Cl. Sc. Fis., Ser. 7: 11 (2): 48 (1940).  
 Syntypi: Capuano 2511, 2532; Milizia Forestale 184, 648; Giordano 2459.  
 Ethiopia.  
 The year listed for the specimens Capuano 2511 and Giordano 2459 is 1938, which differs from the year published in the protologue (1937).
- Jasminum streptopus*** E.Mey., Comm. Pl. Afr. Austr. 1: 173 (1838).  
 Typus: Drège s.n. (B holotypus, destr?).  
 Ref.: Green P.S. in in Hedberg I., Edwards S. & Sileshi Nemomissa 2003. Fl. of Ethiopia and Eritrea 4 (1): 84.
- Jasminum grandiflorum*** L. subsp. ***floribundum*** (R.Br. ex Fresen.) P.S.Green, Kew Bull. 41 (2): 414 (1986).  
 Typus: Rüpell (FR holotypus).  
 Ref.: Green P.S. in in Hedberg I., Edwards S. & Sileshi Nemomissa 2003. Fl. of Ethiopia and Eritrea 4 (1): 86.
- Jasminum dichotomum*** Vahl, Enum. Pl. 1: 26 (1804).  
 Typus: Thonning 76 (C holotypus).  
 Ref.: Green P.S. in in Hedberg I., Edwards S. & Sileshi Nemomissa 2003. Fl. of Ethiopia and Eritrea 4 (1): 84.
- Jasminum punctulatum*** Chiov., Fl. Somalia II: 279, ♫ 278 (1932).  
 Typi: Senni 85, 90 (both FT syntypi).  
 Ref.: Thulin M. 2006. Fl. of Somalia 3: 262, ♫ t. 3 C.
- Jasminum punctulatum*** Chiov., Fl. Somalia II: 279, ♫ 278 (1932).  
 Typi: Senni 85, 90 (both FT syntypi).  
 Ref.: Thulin M. 2006. Fl. of Somalia 3: 262, ♫ t. 3 C.
- Chionanthus mildbraedii*** (Gilg & G.Schellenb.) Stearn, J. Linn. Soc., Bot. 80: 202 (1980).  
 Typus: Mildbraed 4409 (B holotypus, destr.).  
 Ref.: Green P.S. in in Hedberg I., Edwards S. & Sileshi Nemomissa 2003. Fl. of Ethiopia and Eritrea 4 (1): 81, ♫ 82.
- Olea welwitschii*** (Knobl.) Gilg & Schellenb., Bot. Jahrb. Syst. 51: 76 (1915).  
 Typus: Welwitsch 945 (K isotypus).  
 Ref.: Green P.S. in in Hedberg I., Edwards S. & Sileshi Nemomissa 2003. Fl. of Ethiopia and Eritrea 4 (1): 81.

- Olea subtrinervata* Chiov., Atti Reale Accad. Italia, (=) *Olea europaea* L. subsp. **cuspidata** (Wall. ex G.Don) Cif., L'Olivicoltore 19 (5): 96 (1942).  
Mem. Cl. Sc. Fis., Ser. 7: 11 (2): 49 (1940).  
Holotypus/Isotypus: Reghini 49.  
Ethiopia.
- Typus: Wallich 2817.  
Ref.: Green P.S. in in Hedberg I., Edwards S. & Sileshi Nemomissa 2003. Fl. of Ethiopia and Eritrea 4 (1): 79, ♀ 80.

## OROBANCHACEAE

- Cistanche allochroa* Chiov., Result. Sc. Miss. (=) *Cistanche phelypaea* (L.) Cout., Fl. Portugal: 571 (1913).  
Stefanini-Paoli Somal. Ital. I: 131 (1916).  
Syntypi: Paoli 252, 297.  
Somalia.
- Typus: Herb. Tournefort 6443 (P-TOURN, neotypus).  
Ref.: Thulin M. 2006. Fl. of Somalia 3: 295, ♀ 295.

## PASSIFLORACEAE

- Adenia manganiana* Chiov., Result. Sc. Miss. (=) *Adenia aculeata* (Oliv. ex Hook.f.) Engl. subsp. **manganiana** (Chiov.) W.J.de Wilde, Meded. Landbouwhogeschool 71 (18): 68 (1971).  
Stefanini-Paoli Somal. Ital. I: 212 (1916).  
Holotypus: Mangano s.n.  
Somalia.
- Ref.: de Wilde W.J. & Gilbert M.G. in Edwards S., Mesfin Tadesse & Hedberg I. 1995. Fl. of Ethiopia and Eritrea 2 (2): 9.
- Adenia vitifolia* Hutch. & E.A.Bruce, Kew Bull. 1941: (=) *Adenia ellenbeckii* Harms, Veg. Erde 9 (3 II): 606, ♀ f. 270 (1921).  
98 (1941).  
Isotypus: Gillett 4202.  
(B holotypus. Hutchinson & Bruce, Kew Bull. 1941: 98. 1941).  
Somalia.
- Typi: Ellenbeck 2133, 2291 (both B syntypi, destr.).  
Ref.: Thulin M. 1993. Fl. of Somalia 1: 212.

**Basananthe aciphylla** Thulin, Nordic J. Bot. 10 (6): 625, ♀ 626 (1991).  
Holotypus: Hemming 3289.  
Somalia.

**Basananthe merolae** Raimondo & Moggi, Delpinoa n.s., 23-24: 326, ♀ 327 (1981-1982) publ. 1985.  
Isotypus: Raimondo 17/82.  
(PAL holotypus. Raimondo & Moggi, Delpinoa n.s., 23-24: 326. 1981-1982; publ. 1985).  
Somalia.

*Carania berberoides* Chiov., Fl. Somalia: 176, ♀ t. XIX (1929).

Lectotypus: Puccioni & Stefanini 172 [194] (de Wilde, Blumea 21 (2): 355. 1973).

Syntypus: Puccioni & Stefanini 674 [740].  
Somalia.

*Modecca abyssinica* Hochst. ex A.Rich., Tent. Fl. Abyss. 1: 297 (1847).

Typus: Schimper 242 (207/4) (fide de Wilde & Gilbert, Fl. of Ethiopia and Eritrea 2 (2): 7. 1995).  
Ethiopia.

**Basananthe berberoides** (Chiov.) W.J.de Wilde, Blumea 21 (2): 355, ♀ f. 4n (1973).

Ref.: Thulin M. 1993. Fl. of Somalia 1: 214.

**Adenia venenata** Forssk., Fl. Aegypt.-Arab.: 77 (1775).

Typus: Forsskål 655 (C holotypus).  
Ref.: de Wilde W.J. & Gilbert M.G. in Edwards S., Mesfin Tadesse & Hedberg I. 1995. Fl. of Ethiopia and Eritrea 2 (2): 7, ♀ 8.

## PEDALIACEAE

**Pterodiscus coeruleus** Chiov., Fl. Somalia II: 341, ♦  
342 (1932).

Holotypus: Senni 545.  
Somalia.

**Pterodiscus purpureus** Chiov., Fl. Somalia: 244  
(1929).

Syntypi: Robecchi-Bricchetti 551; Puccioni &  
Stefanini 557 [611].

Somalia and Ethiopia.

Ihlenfeldt, in Fl. of Ethiopia and Eritrea 5:  
338. 2006, considers *Pterodiscus purpureus* Chiov.  
synonym of *Pterodiscus undulatus* Baker f.

**Pterodiscus ruspolii** Engl., Annuario Reale Ist. Bot.  
Roma 7 (1): 31 (1897).

Syntypi: Riva 1089, 1101.  
Ethiopia and Somalia.

The type numbers of *Pterodiscus ruspolii*  
Engl. and *Sesamothamnus rivae* Engl. have  
been inadvertently interchanged in the original  
descriptions. The right numbers are: *Pterodiscus*  
*ruspolii* Engl.: Riva 1089; *Sesamothamnus rivae*  
Engl.: Riva 1657 (Bruce, Kew Bull. 3: 419. 1953).

*Pterodiscus ruspolii* Engl. var. *aureus* Chiov., Result. (=)  
Sc. Miss. Stefanini-Paoli Somal. Ital. I: 135 (1916).

Syntypi: Paoli 960, 1043.  
Somalia.

*Pterodiscus ruspolii* Engl. var. *roseus* Chiov., Result. (=)  
Sc. Miss. Stefanini-Paoli Somal. Ital. I: 135 (1916).

Syntypi: Paoli 1044, 1199.  
Somalia.

**Sesamothamnus rivae** Engl., Annuario Reale Ist.  
Bot. Roma 7 (1): 30 (1897).

Holotypus: Riva 1657.  
Ethiopia.

*Sesamum somalense* Chiov., Fl. Somalia II: 343 (=)  
(1932).

Holotypus: Gorini 176.  
Somalia.

**Pterodiscus ruspolii** Engl., Annuario Reale Ist.  
Bot. Roma 7 (1): 31 (1897).

Typi: Riva 1089, 1101 (FT syntypi).

Ref.: Ihlenfeldt H.-D. in Thulin M. 2006. Fl. of  
Somalia 3: 370, ♦ 371.

**Pterodiscus undulatus** Baker f., J. Bot. 37: 62  
(1899).

Typus: Lort-Phillips s.n. (BM holotypus).

Ref.: Ihlenfeldt H.-D. in Thulin M. 2006. Fl. of  
Somalia 3: 371.

**Sesamum indicum** L., Sp. pl. 2: 634 (1753).

Typi: "India" in Herb. Sloane (BM syntypus);  
no locality or collector (LINN, syntypus).

Ref.: Ihlenfeldt H.-D. in Thulin M. 2006. Fl. of  
Somalia 3: 373, ♦ 373.

## PLUMBAGINACEAE

- Bubania migiurtina* Chiov., Fl. Somalia: 212, ♦ t. XXIV, f. 2 (1929).  
 Lectotypus: Puccioni & Stefanini 840 [928].  
 (Crespo & Lledó, Bot. J. Linn. Soc. 132: 171. 2000).  
 Syntypus: Puccioni & Stefanini 10 [10].  
 Somalia.
- Limonium distichum* Wilmot-Dear, Kew Bull. 31 (4): 847 (1977).  
 Isotypus: Hemming 1676.  
 (K holotypus. Thulin. Fl. of Somalia 3: 29. 2006).  
 Somalia.
- Limonium guigliae** Raimondo & Domina, Pl. Biosystems 143 (3): 504, ♦ 505 (2009).  
 Isotypus: Domina, Guiglia, Raimondo, Scafidi & Schimmenti s.n.  
 (PAL holotypus. Pl. Biosystems 143 (3): 504. 2009).  
 Yemen, Socotra.
- Statice arabica* Jaub. & Spach forma *glomerata* A.Terracc., Annuario Reale Ist. Bot. Roma 5 (3): 106 (1894).  
 Holotypus: Terracciano 129.  
 Eritrea.
- Statice axillaris* Forssk. forma *attenuata* A.Terracc., Annuario Reale Ist. Bot. Roma 5 (3): 106 (1894).  
 Syntypus: Terracciano 27.  
 Eritrea.
- Statice carinensis* Chiov., Fl. Somalia: 210, ♦ t. XXIII, f. 1 (1929).  
 Holotypus: Puccioni & Stefanini 1031 [1133].  
 Somalia.
- Statice nogalensis* Chiov., Fl. Somalia: 211, ♦ t. XXIII, f. 2 (1929).  
 Holotypus: Puccioni & Stefanini 859 [948].  
 Somalia.
- (=) **Ceratolimon migiurtinum** (Chiov.) M.B.Crespo & M.D.Lledó, Bot. J. Linn. Soc. 132: 171 (2000).  
 Ref.: Thulin M. 2006. Fl. of Somalia 3: 28, ♦ 28.
- (=) **Limonium maurocordatae** (Volkens & Schweinf.) Cufod., Bull. Jard. Bot. Nat. Belg. 39, Suppl.: XXIX (1969).  
 Typus: IECAMA I-86, sheet 1 and 2 (K neotypus).  
 Ref.: Thulin M. 2004. Kew Bull. 59: 164.
- (=) **Limonium axillare** (Forssk.) Kuntze, Revis. Gen. Pl. 2: 395 (1891).  
 Typus: Forsskål 522 (C holotypus).  
 Ref.: Cufodontis G. 1960. Bull. Jard. Bot. État Brux. 30 (4), Suppl.: 661.
- (=) **Limonium axillare** (Forssk.) Kuntze, Revis. Gen. Pl. 2: 395 (1891).  
 Typus: Forsskål 522 (C holotypus).  
 Ref.: Cufodontis G. 1960. Bull. Jard. Bot. État Brux. 30 (4), Suppl.: 661.
- (=) **Limonium xipholepis** (Baker) Hutch. & E.A.Bruce, Bull. Misc. Inform. 1941: 158 (1941).  
 Typi: Cole s.n.; Lort Phillips s.n. (K syntypi).  
 Ref.: Thulin M. 2006. Fl. of Somalia 3: 29.
- (=) **Limonium xipholepis** (Baker) Hutch. & E.A.Bruce, Bull. Misc. Inform. 1941: 158 (1941).  
 Typi: Cole s.n.; Lort Phillips s.n. (K syntypi).  
 Ref.: Thulin M. 2006. Fl. of Somalia 3: 29.

## PRIMULACEAE

- Anagallis quartiniana* (A.Rich.) Engl. var. *angustiloba* Engl., Bot. Jahrb. Syst. 28: 447 (1901).  
 Isoneotypus: Drummond & Hemsley 1569.  
 (K neotypus. Taylor, Kew Bull. 1955: 337. 1956).  
 Tanzania.
- Lysimachia saganeitensis* Schweinf. ex Knuth, Pflanzenr. 22 (IV 237): 292 (1905).  
 Isotypus: Schweinfurth & Riva 1684.  
 (B holotypus, destr. Bizzarri, Fl. of Ethiopia and Eritrea 5: 18. 2006).  
 Eritrea.
- (=) **Anagallis angustiloba** (Engl.) Engl., Bot. Jahrb. Syst. 30: 372 (1902).  
 Ref.: Taylor P. in Hubbard C.E. & Milne-Redhead E. 1958. Fl. Trop. East Afr., Primulaceae: 14, ♦ 12.
- (=) **Lysimachia ruhmeriana** Vatke, Linnaea 40: 104 (1876).  
 Typus: Schimper 1231 (B holotypus, destr.; BM lectotypus).  
 Ref.: Bizzarri P. in Hedberg I., Ensermu Kelbessa, Edwards S., Sebsebe Demissew & Persson E. 2006. Fl. of Ethiopia and Eritrea 5: 18, ♦ 19.

## RHAMNACEAE

- Lamellisepalum hildebrandtii* Engl., Annuario Reale Ist. Bot. Roma 7 (1): 19 (1897). (=) **Sageretia thea** (Osbeck) M.C.Johnst., J. Arnold Arbor. 49 (3): 378 (1968).  
Syntypi: Robecchi-Bricchetti 244, 245, 246, 247.  
Ethiopia.
- Rhamnus deflersii* Schweinf. ex Fiori, Agric. Colon. V, suppl.: 15 (1912). (=) **Rhamnus staddo** A.Rich., Tent. Fl. Abyss. 1: 138 (1847).  
Isotypi: Schweinfurth & Riva 1040.  
(M holotypus. Vollesen, Fl. of Ethiopia 3: 390. 1989).  
Eritrea.
- Sageretia theezans* (L.) Brongn. var. *schweinfurthii* Chiov., Ann. Bot. (Rome) 10 (3): 445 (1912). (=) **Sageretia thea** (Osbeck) M.C.Johnst., J. Arnold Arbor. 49 (3): 378 (1968).  
Syntypi: Schweinfurth & Riva 1207; Fiori 449, 573.  
Eritrea.
- Ziziphus abyssinica* Hochst. ex A.Rich. f. *obliquifolia* Engl., Abh. Konigl. Preuss. Akad. Wiss. 1891: 294 (1892). (=) **Ziziphus abyssinica** Hochst. ex A.Rich., Tent. Fl. Abyss. 1: 136 (1847).  
Isosyntypus: Beccari 85 (ubi? syntypus. Vollesen, Fl. of Ethiopia 3: 396. 1989).  
Eritrea.
- Ziziphus hamur** Engl., Annuario Reale Ist. Bot. Roma 7 (1): 19 (1897).  
Lectotypus: Robecchi-Bricchetti 186 (Johnston, Fl. Trop. E. Afr., Rhamnaceae: 31. 1972, sub holotypus).  
Syntypus: Robecchi-Bricchetti 187.  
Somalia.
- Ziziphus spina-christi* (L.) Desf. var. *mitissima* Chiov., Fl. Somalia II: 139 (1932). (=) **Ziziphus spina-christi** (L.) Desf., Fl. Atlant. 1: 201 (1798).  
Holotypus: Scassellati 172.  
Somalia.

## RIZOPHORACEAE

- Cassipourea adami** Jacq.-Fél., Rev. Int. Bot. Appl. Agric. Trop. 1952: 268, ♀ 267 (1952).  
Isosyntypus: Adam 4108.  
Guinea.
- Ceriops somalensis* Chiov., Fl. Somalia II: 205, ♀ 204, 206. (=) **Ceriops tagal** (Perr.) C.B.Rob., Philipp. J. Sci. 3 (5): 306 (1908).  
Syntypus: Senni 18, 100, 134.  
Somalia.
- Weihea avettiae* Chiov., Ann. Bot. (Rome) 9 (3): 321 (1911);  
Holotypus: Negri 262.  
Ethiopia.
- Alston in Bull. Misc. Inform. 1925: 253 (1925) published '*Cassipourea avettiae* (Chiov.) Alston'.
- Cassipourea malosana** (Baker) Alston, Bull. Misc. Inform. 1925: 258 (1925).  
Typus: Whyte (K holotypus).  
Ref.: Friis I. in Edwards S., Mesfin Tadesse & Hedberg I. 1995. Fl. of Ethiopia and Eritrea 2 (2): 134, ♀ 134.

- Weihea boranensis* Chiov., Miss. Biol. Borana, Racc. Bot. Angiosp.-Gymnosp.: 143, ♫ 144 (1939).  
 Holotypus: Cufodontis 644.  
 Ethiopia.
- Weihea salvago-raggiii* Chiov., Ann. Bot. (Rome) 9 (1): 62 (1911).  
 Lectotypus: Pappi 2577 (Friis, Fl. of Ethiopia and Eritrea 2 (2): 134. 1995, sub holotypus).  
 Syntypi: Terracciano & Pappi 608, 740.  
 Eritrea.  
 Alston in Bull. Misc. Inform. 1925: 254 (1925) considers the species under the name '*Cassipourea salvago-reggei* (Chiov.) Alston'.
- Cassipourea malosana* (Baker) Alston, Bull. Misc. Inform. 1925: 258 (1925).  
 Typus: Whyte (K holotypus).  
 Ref.: Friis I. in Edwards S., Mesfin Tadesse & Hedberg I. 1995. Fl. of Ethiopia and Eritrea 2 (2): 134, ♫ 134.
- Cassipourea malosana* (Baker) Alston, Bull. Misc. Inform. 1925: 258 (1925).  
 Typus: Whyte (K holotypus).  
 Ref.: Friis I. in Edwards S., Mesfin Tadesse & Hedberg I. 1995. Fl. of Ethiopia and Eritrea 2 (2): 134, ♫ 134.

## RUBIACEAE

- Anthospermum mazzocchi-alemannii* Chiov., Bull. Soc. Bot. Ital. 1924: 40 (1924).  
 Holotypus: Mazzocchi-Alemanni 244.  
 Angola.
- Borreria paolii* Chiov., Result. Sc. Miss. Stefanini-Paoli Somal. Ital. I: 98 (1916).  
 Holotypus: Paoli 697.  
 Somalia.
- Borreria tenuiflora* Chiov., Result. Sc. Miss. Stefanini-Paoli Somal. Ital. I: 98 (1916).  
 Syntypi: Paoli 240, 675, 704.  
 Somalia.
- Canthium giordanii* Chiov., Atti Reale Accad. Italia, Mem. Cl. Sci. Fis., Ser. 7: 11 (2): 35 (1940).  
 Syntypi: Giordano 2450, 2539.  
 Ethiopia.
- Canthium maleolens* Chiov., Miss. Biol. Borana, Racc. Bot. Angiosp.-Gymnosp.: 228, ♫ 229 (1939).  
 Holotypus/Isotypus: Cufodontis 731.  
 Ethiopia.
- Canthium sarogliae* Chiov., Racc. Miss. Consolata Kenya: 55 (1935).  
 Syntypi: Balbo 17\*, 826\*.  
 Kenya.
- Spermacoce subvulgata* (K.Schum.) J.G.García var. *subvulgata*, Mem. Junta Invest. Ultramar, ser. 2, 6: 49 (1959).  
 Typi: Schlechter 12184; Buchner 3, 21; Mechow 579 (B syntypi, destr.).  
<http://www.villege.ch/musinfo/bd/cjb/africa/recherche.php>.
- Spermacoce paolii* (Chiov.) Verdc., Kew Bull. 30 (2): 302 (1975).  
 Ref.: Thulin M. 2006. Fl. of Somalia 3: 80.
- Spermacoce filituba* (K.Schum.) Verdc., Kew Bull. 30 (2): 302 (1975).  
 Typus: F. Thomas 213 (B holotypus, destr.; BM, K isotypus).  
 Ref.: Thulin M. 2006. Fl. of Somalia 3: 79, ♫ 79.
- Psydrax parviflora* (Afzel.) Bridson subsp. *parviflora*, Kew Bull. 40 (4): 700 (1985).  
 Typus: Afzelius 3441a (UPS-THUNB holotypus).  
 Ref.: Puff C. in Hedberg I., Edwards S. & Sileshi Nemomissa 2003. Fl. of Ethiopia and Eritrea 4 (1): 274.
- Vangueria madagascariensis* J.F.Gmel. var. *madagascariensis*, Syst. nat. ed 13 (bis), 2: 367 (1791).  
 Typus: Commerson (P holotypus).  
 Ref.: Puff C. in Hedberg I., Edwards S. & Sileshi Nemomissa 2003. Fl. of Ethiopia and Eritrea 4 (1): 279.
- Rytigynia uhligii* (K.Schum. & K.Krause) Verdc., Kew Bull. 42: 165 (1987).  
 Typus: Uhlig 521 (B holotypus, destr.; EA isotypus).  
 Ref.: Verdcourt B. & Bridson D. in Polhill R.M. 1991. Fl. Trop. East Afr., Rubiaceae (Part 3): 818.

- Canthium socotranum* Radcl.-Sm., Hooker's Icon. (≡) Pl. 7 (4): t. 3681, ♀ t. 3681 (1971).  
Isotypus: Radcliffe-Smith & Lavranos 507.  
(K holotypus. Radcliffe-Smith, Hooker's Icon. Pl. 7 (4): t. 3681. 1971).  
Yemen, Socotra.
- Canthium urophyllum* Chiov., Racc. Miss. Consolata Kenya: 54 (1935), as "urophyllum".  
Holotypus: Balbo 24\*.  
Kenya.
- Coffea carrissoi** A.Chev., Rev. Bot. Appl., 19: 401 (1939).  
Typus?: Carrisso & Mendonça 82.  
Angola.
- Conostomium brevirostratum* Bremek., Verh. Kon. Ned. Akad. Wetensch., Afd. Natuurk., Tweede Sect., 48 (2): 129 (1952).  
Holotypus: Riva 1094.  
Ethiopia/Somalia border.
- Conostomium hispidulum* Bremek., Verh. Kon. Ned. Akad. Wetensch., Afd. Natuurk., Tweede Sect., 48 (2): 131 (1952).  
Holotypus: Puccioni & Stefanini 873 [964].  
Somalia.
- Conostomium kenyense* Bremek. var. *subglabrum* Bremek., Verh. Kon. Ned. Akad. Wetensch., Afd. Natuurk., Tweede Sect., 48 (2): 132 (1952).  
Holotypus: Corradi 2705.  
Ethiopia.
- Diodia physotricha* Chiov., Agric. Colon. 20: 45 (1926).  
Holotypus: Gorini 43.  
Somalia.
- Diodia physotricha* Chiov. var. *cyclophylla* Chiov., Atti Ist. Bot. Univ. Pavia, ser. IV, 7: 135, ♀ t. 6 (1936).  
Holotypus: Ciferri 93.  
Somalia.
- Dirichletia giumbensis* Chiov., Result. Sc. Miss. Stefanini-Paoli Somal. Ital. I: 86 (1916).  
Syntypi: Paoli 165, 970.  
Somalia.
- Dirichletia paolii* Chiov., Result. Sc. Miss. Stefanini-Paoli Somal. Ital. I: 86 (1916).  
Holotypus: Paoli 1321.  
Somalia.
- Pyrostria socotrana** (Radcl.-Sm.) Bridson, Kew Bull. 42 (3): 625 (1987).  
Ref.: Bridson D.M. 1987. Kew Bull. 42 (3): 625.
- Rytigynia bugoyensis** (K.Krause) Verdc. subsp. *bugoyensis*, Bull. Jard. Bot. Natl. Belg. 50: 515 (1980).  
Typus: Mildbraed 1484 (B holotypus, destr.; BM isotypus).  
Ref.: Verdcourt B. & Bridson D. in Polhill R.M. 1991. Fl. Trop. East Afr., Rubiaceae (Part 3): 833, ♀ 834.
- Pentanopsis fragrans** Rendle, J. Bot. 36: 29 (1898).  
Typus: Lort Phillips s.n. (BM holotypus).  
Ref.: Thulin M. 2006. Fl. of Somalia 3: 77.
- Conostomium longitubum** (Beck) Cufod., Nuovo Giorn. Bot. Ital., n.s., 55: 85 (1948).  
Typus: Hardegger s.n. (W holotypus).  
Ref.: Thulin M. 2006. Fl. of Somalia 3: 76, ♀ 76.
- Conostomium kenyense** Bremek., Verh. Kon. Ned. Akad. Wetensch., Afd. Natuurk., Tweede Sect., 48 (2): 132 (1952).  
Typus: Leakey 35 in F.D. 3466 (K holotypus; EA isotypus).  
Ref.: Verdcourt B. in Polhill R.M. 1976. Fl. Trop. East Afr., Rubiaceae (Part 1): 245.
- Diodia aulacosperma** K.Schum., Pflanzenw. Ost-Afrikas C: 394 (1895).  
Typus: Hildebrandt 1093 (B holotypus, destr.; K isotypus).  
Ref.: Thulin M. 2006. Fl. of Somalia 3: 79, ♀ 78.
- Diodia aulacosperma** K.Schum., Pflanzenw. Ost-Afrikas C: 394 (1895).  
Typus: Hildebrandt 1093 (B holotypus, destr.; K isotypus).  
Ref.: Thulin M. 2006. Fl. of Somalia 3: 79, ♀ 78.
- Carphelea glaucescens** (Hiern) Verdc., Kew Bull. 28 (3): 424 (1974).  
Typus: Kirk s.n. (K holotypus).  
Ref.: Thulin M. 2006. Fl. of Somalia 3: 63, ♀ 64.
- Carphelea glaucescens** (Hiern) Verdc., Kew Bull. 28 (3): 424 (1974).  
Typus: Kirk s.n. (K holotypus).  
Ref.: Thulin M. 2006. Fl. of Somalia 3: 63, ♀ 64.

- Eionitis psammophila* (Chiov.) Verdc. var. *compactehirtella* Bremek., Verh. Kon. Ned. Akad. Wetensch., Afd. Natuurk., Tweede Sect., 48 (2): 168 (1952).  
 Holotypus/Isotypus: Senni 1337.  
 Somalia.
- Eionitis psammophila* (Chiov.) Bremek. var. *laxiflora* Bremek., Verh. Kon. Ned. Akad. Wetensch., Afd. Natuurk., Tweede Sect., 48 (2): 168 (1952).  
 Holotypus: Senni 615, pro parte.  
 Somalia.
- Galium abyssinicum* Chiov., Ann. Bot. (Rome) 9 (1): 68 (1911).  
 Syntypi: Chiovenda 911, 2929.  
 Ethiopia.
- Galium boreo-aethiopicum** Puff, Bull. Jard. Bot. Natl. Belg. 59 (3/4): 411 (1989).  
 Holotypus: Chiovenda 1744.  
 Ethiopia.
- Galium scioanum** Chiov., Ann. Bot. (Rome) 9 (2): 322 (1911).  
 Holotypus: Negri 1410.  
 Ethiopia.
- Galium sidamense* Chiov., Webbia 8: 239 (1951).  
 Holotypus: Vatova 2278.  
 Ethiopia.
- Gardenia fiorii** Chiov., Result. Sc. Miss. Stefanini-Paoli Somal. Ital. I: 90 (1916).  
 Syntypi: Paoli 783, 976, 1220.  
 Somalia.
- Gardenia somalensis* Chiov., Result. Sc. Miss. Stefanini-Paoli Somal. Ital. I: 92 (1916).  
 Syntypus/Isosyntypus: Paoli 438.  
 Somalia.  
 The syntype 'Paoli 632' is lacking in FT.
- Gardenia somalensis* Chiov. var. *tubicalyx* Chiov., Result. Sc. Miss. Stefanini-Paoli Somal. Ital. I: 93 (1916).  
 Holotypus: Paoli 666.  
 Somalia.
- Hypodematum somalense* Chiov., Result. Sc. Miss. Stefanini-Paoli Somal. Ital. I: 99 (1916).  
 Syntypi: Paoli 124, 241, 254, 267, 277.  
 Somalia.
- (=) **Oldenlandia richardsonioides** (K.Schum.) Verdc., Kew Bull. 28 (3): 420 (1974).  
 Typus: Riva 1650 (FT holotypus).  
 Ref.: Thulin M. 2006. Fl. of Somalia 3: 70.
- (=) **Oldenlandia richardsonioides** (K.Schum.) Verdc., Kew Bull. 28 (3): 420 (1974).  
 Typus: Riva 1650 (FT holotypus).  
 Ref.: Thulin M. 2006. Fl. of Somalia 3: 70.
- (=) **Galium simense** Fresen., Mus. Senckenberg. 2: 165 (1837).  
 Typus: Rüppell s.n. (FR holotypus).  
 Ref.: Puff C. in Hedberg I., Edwards S. & Sileshi Nemomissa 2003. Fl. of Ethiopia and Eritrea 4 (1): 237, ♦ 238.
- (=) **Galium scioanum** Chiov., Ann. Bot. (Rome) 9 (2): 322 (1911).  
 Typus: Negri 1410 (FT holotypus).  
 Ref.: Puff C. in Hedberg I., Edwards S. & Sileshi Nemomissa 2003. Fl. of Ethiopia and Eritrea 4 (1): 237.
- (=) **Gardenia volkensii** K.Schum., Bot. Jahrb. Syst. 34: 332 (1904).  
 Typus: Engler (1902) 2199 (B holotypus, destr.).  
 Ref.: Thulin M. 2006. Fl. of Somalia 3: 105, ♦ 105.
- (=) **Gardenia volkensii** K.Schum., Bot. Jahrb. Syst. 34: 332 (1904).  
 Typus: Engler (1902) 2199 (B holotypus, destr.).  
 Ref.: Thulin M. 2006. Fl. of Somalia 3: 105, ♦ 105.
- (=) **Diodia aulacosperma** K.Schum., Pflanzenw. Ost-Afrikas C: 394 (1895).  
 Typus: Hildebrandt 1093 (B holotypus, destr.; K isotypus).  
 Ref.: Thulin M. 2006. Fl. of Somalia 3: 79, ♦ 78.

- Jaubertia putoroides* Radcl.-Sm., Hooker's Icon. Pl. 7 (4): t. 3682, ♫ t. 3682 (1971).  
 Isotypus: Radcliffe-Smith & Lavranos 457.  
 (K holotypus. Radcliffe-Smith, Hooker's Icon. Pl. 7 (4): t. 3682. 1971).  
 Yemen, Socotra.
- Kohautia baddadensis* Bremek., Verh. Kon. Ned. Akad. Wetensch., Afd. Natuurk., Tweede Sect., 48 (2): 103 (1952).  
 Holotypus: Senni 307.  
 Somalia.
- Kohautia caespitosa* Schnizl. var. *eritreensis* Bremek., Verh. Kon. Ned. Akad. Wetensch., Afd. Natuurk., Tweede Sect., 48 (2): 107 (1952).  
 Holotypus: Schweinfurth & Riva 663.  
 Eritrea.
- Kohautia caespitosa* Schnizl. var. *hispidula* Bremek., (=) Kew Bull. 3: 439 (1953).  
 Isotypus: Gillett 13341.  
 (K holotypus. Bremekamp, Kew Bull. 3: 439. 1953).  
 Kenya.
- Kohautia caespitosa* Schnizl. var. *ramosior* Bremek., (=) Verh. Kon. Ned. Akad. Wetensch., Afd. Natuurk., Tweede Sect., 48 (2): 106 (1952).  
 Holotypus: Pappi 6363.  
 Eritrea.
- Kohautia gracillima* Bremek., Verh. Kon. Ned. Akad. Wetensch., Afd. Natuurk., Tweede Sect., 48 (2): 102 (1952).  
 Holotypus: Pappi 6415.  
 Eritrea.
- Kohautia lasiocarpa* Klotzsch var. *eritreensis* Bremek., Verh. Kon. Ned. Akad. Wetensch., Afd. Natuurk., Tweede Sect., 48 (2): 113 (1952).  
 Holotypus: Pappi 6384.  
 Eritrea.
- Kohautia pappii* Bremek., Verh. Kon. Ned. Akad. Wetensch., Afd. Natuurk., Tweede Sect., 48 (2): 104 (1952).  
 Holotypus: Pappi 6327.  
 Eritrea.
- Plocama putoroides** (Radcl.-Sm.) M.Backlund & Thulin, Taxon 56 (2): 324 (2007).  
 Ref.: Backlund M., Bremer B. & Thulin M. 2007. Taxon 35 (2): 324.
- Kohautia caespitosa** Schnizl., Flora 25, Beibl. 1: 145 (1842).  
 Typus: Kotschy 138 (W holotypus; K isotypus).  
 Ref.: Thulin M. 2006. Fl. of Somalia 3: 69.
- Kohautia caespitosa** Schnizl. subsp. *caespitosa*, Flora 25, Beibl. 1: 145 (1842).  
 Typus: Kotschy 138 (W holotypus; K isotypus).  
 Ref.: Puff C. in Hedberg I., Edwards S. & Sileshi Nemomissa 2003. Fl. of Ethiopia and Eritrea 4 (1): 210, ♫ 212.
- Kohautia caespitosa** Schnizl. subsp. *amaniensis* (K.Krause) Govaerts, Bot. J. Linn. Soc. 157: 122 (2008).  
 Typus: Braun in Herb. Amani 1383 (B holotypus; EA isotypus).  
 Ref.: Puff C. in Hedberg I., Edwards S. & Sileshi Nemomissa 2003. Fl. of Ethiopia and Eritrea 4 (1): 210.
- Kohautia caespitosa** Schnizl. subsp. *caespitosa*, Flora 25, Beibl. 1: 145 (1842).  
 Typus: Kotschy 138 (W holotypus; K isotypus).  
 Ref.: Puff C. in Hedberg I., Edwards S. & Sileshi Nemomissa 2003. Fl. of Ethiopia and Eritrea 4 (1): 210, ♫ 212.
- Kohautia caespitosa** Schnizl. subsp. *caespitosa*, Flora 25, Beibl. 1: 145 (1842).  
 Typus: Kotschy 138 (W holotypus; K isotypus).  
 Ref.: Puff C. in Hedberg I., Edwards S. & Sileshi Nemomissa 2003. Fl. of Ethiopia and Eritrea 4 (1): 210, ♫ 212.
- Kohautia subverticillata** (K.Schum.) D.Mantell subsp. *eritreensis* (Bremek.) D.Mantell ex Puff, Fl. of Ethiopia and Eritrea 4 (1): 211 (2003).  
 Ref.: Puff C. in Hedberg I., Edwards S. & Sileshi Nemomissa 2003. Fl. of Ethiopia and Eritrea 4 (1): 211.
- Kohautia caespitosa** Schnizl. subsp. *caespitosa*, Flora 25, Beibl. 1: 145 (1842).  
 Typus: Kotschy 138 (W holotypus; K isotypus).  
 Ref.: Puff C. in Hedberg I., Edwards S. & Sileshi Nemomissa 2003. Fl. of Ethiopia and Eritrea 4 (1): 210, ♫ 212.

- Kohautia sennii* Bremek., Verh. Kon. Ned. Akad. Wetensch., Afd. Natuurk., Tweede Sect., 48 (2): 71 (1952).  
 Holotypus: Senni 522.  
 Somalia.
- Kohautia somalensis* Bremek., Verh. Kon. Ned. Akad. Wetensch., Afd. Natuurk., Tweede Sect., 48 (2): 100 (1952).  
 Isotypus: Gillett 4344.  
 (K holotypus. Thulin, Fl. of Somalia 3: 69. 2006).  
 Somalia.
- Lasianthus pedunculatus** E.A.Bruce, Kew Bull. 1936: 480 (1936).  
 Isotypus: E.M.Bruce 1096.  
 (K holotypus. Verdcourt, Fl. Trop. East Afr., Rubiaceae (Part 1): 136. 1976).  
 Tanzania.
- Mitratheca richardsonioides* K.Schum., Bot. Jahrb. Syst. 33: 335 (1903).  
 Holotypus: Riva 1650.  
 Kenya.
- Mussaenda abyssinica* Chiov., Ann. Bot. (Rome) 9 (1): 67 (1911).  
 Holotypus: Chiovenda 705.  
 Ethiopia.
- Neurocarpaea lanceolata* (Forssk.) R.Br. var. *stenostygma* Chiov., Ann. Bot. (Rome) 9 (1): 66 (1911).  
 Holotypus: Chiovenda 1377.  
 Ethiopia.
- Neurocarpaea aemulans* Bremek., Verh. Kon. Ned. Akad. Wetensch., Afd. Natuurk., Tweede Sect., 48 (2): 257 (1952).  
 Holotypus: Baldrati 2138.  
 Eritrea.
- Oldenlandia borrioioides* Verdc., Kew Bull. 30 (2): 292, ♦ 294 (1975).  
 Isotypus: Polhill & Paulo 601.  
 (K holotypus. Verdcourt, Kew Bull. 30 (2): 292. 1975).  
 Kenya.
- Oldenlandia breviflora* Chiov., Bull. Soc. Bot. Ital. 1924: 39 (1924).  
 Holotypus/Isotypus: Mazzocchi-Alemanni 36.  
 Angola.
- Oldenlandia commutata* Cufod., Nuovo Giorn. Bot. Ital., n.s., 55: 82 (1948).  
 Lectotypus: Corradi 2856 (? Bremekamp, Verh. Kon. Ned. Akad. Wetensch., Afd. Natuurk., Tweede Sect., 48 (2): 108. 1952).  
 Syntypi: Corradi 2866; Cufodontis 246, 525.  
 Ethiopia.
- (=) **Kohautia longifolia** Klotzsch, in Peters, Naturw. Reise Mossambique Bot. 1: 297 (1861).  
 Typus: Schlechter 12181 (K neotypus).  
 Ref.: Thulin M. 2006. Fl. of Somalia 3: 69.
- (=) **Kohautia caespitosa** Schnizl., Flora 25, Beibl. 1: 145 (1842).  
 Typus: Kotschy 138 (W holotypus; K isotypus).  
 Ref.: Thulin M. 2006. Fl. of Somalia 3: 69.
- (=) **Oldenlandia richardsonioides** (K.Schum.) Verdc., Kew Bull. 28 (3): 420 (1974).  
 Ref.: Thulin M. 2006. Fl. of Somalia 3: 70.
- (=) **Mussaenda arcuata** Lam. ex Poir., Encycl. 4: 392 (1797).  
 Typus: Commerson 304 (P-LAM holotypus).  
 Ref.: Puff C. in Hedberg I., Edwards S. & Sileshi Nemomissa 2003. Fl. of Ethiopia and Eritrea 4 (1): 246, ♦ 248.
- (=) **Pentas lanceolata** (Forssk.) Deflers subsp. *lanceolata*, Voy. Yemen: 142 (1889).  
 Typus: Forsskål 1525, 1526, 1527 (C syntypi).  
 Ref.: Puff C. in Hedberg I., Edwards S. & Sileshi Nemomissa 2003. Fl. of Ethiopia and Eritrea 4 (1): 205.
- (=) **Oldenlandia corymbosa** L. var. *corymbosa*, Sp. Pl.: 119 (1753).  
 Typus: from America.  
 Ref.: Puff C. in Hedberg I., Edwards S. & Sileshi Nemomissa 2003. Fl. of Ethiopia and Eritrea 4 (1): 221, ♦ 222.
- (=) **Oldenlandia cryptocarpa** Chiov., Result. Sc. Miss. Stefanini-Paoli Somal. Ital. I: 88 (1916).  
 Typus: Paoli 626 (FT holotypus).  
 Ref.: Thulin M. 2006. Fl. of Somalia 3: 70, ♦ 71.
- (=) **Kohautia cynanchica** DC., Prodr. 4: 430 (1830).  
 Typus: Burchell 1772 (M isotypus).  
 Ref.: Verdcourt B. in Launert E. 1989. Fl. Zambesiaca 5 (1): 91.
- (=) **Kohautia caespitosa** Schnizl. subsp. *amaniensis* (K.Krause) Govaerts, Bot. J. Linn. Soc. 157: 122 (2008).  
 Typus: Braun in Herb. Amani 1383 (B holotypus; EA isotypus).  
 Ref.: Puff C. in Hedberg I., Edwards S. & Sileshi Nemomissa 2003. Fl. of Ethiopia and Eritrea 4 (1): 210.

**Oldenlandia cryptocarpa** Chiov., Result. Sc. Miss.

Stefanini-Paoli Somal. Ital. I: 88 (1916).

Holotypus: Paoli 626.

Somalia.

*Oldenlandia dichotoma* A.Rich. var. *papillosa* (=) Chiov., Result. Sc. Miss. Stefanini-Paoli Somal. Ital. I: 89 (1916).

Holotypus: Paoli 703.

Somalia.

*Oldenlandia graminifolia* Chiov., Bull. Soc. Bot. Ital. (=) 1924: 39 (1924), non (L.) DC. (1830).

Holotypus: Mazzocchi-Alemanni 4.

Angola.

**Oldenlandia ichthyoderma** Cufod., Nuovo Giorn.

Bot. Ital., n.s., 55: 83 (1948).

Lectotypus: Corradi 2754 (? Bremekamp, Verh. Kon. Ned. Akad. Wetensch., Afd. Natuurk., Tweede Sect., 48 (2): 242. 1952).

Syntypi: Corradi 2755, 2756, 2757, 2758, 2759, 2760.

Ethiopia.

*Oldenlandia littoralis* Chiov., Result. Sc. Miss. (=) Stefanini-Paoli Somal. Ital. I: 89 (1916), nom. illeg., non C.T.Mohr (1897).

Syntypi: Paoli 16, 27.

Somalia.

Bremekamp, in Verh. Kon. Ned. Akad. Wetensch., Afd. Natuurk., Tweede Sect., 48 (2): 166 (1952), published '*Eionitis chiovendii*' with the same syntypes.

*Oldenlandia micrantha* Chiov., Bull. Soc. Bot. Ital. (=) 1924: 39 (1924).

Holotypus: Mazzocchi-Alemanni 64.

Angola.

*Oldenlandia obbiadensis* Chiov., Fl. Somalia: 191 (=) (1929).

Holotypus: Puccioni & Stefanini 496 [549].

Somalia.

*Oldenlandia platyphylla* K.Schum., Bot. Jahrb. Syst. (=) 33: 334 (1903).

Lectotypus: Riva 1290 (? Bremekamp, Verh. Kon. Ned. Akad. Wetensch., Afd. Natuurk., Tweede Sect., 48 (2): 81. 1952).

Ethiopia.

In the protologue the name of the collector is 'Robecchi-Bricchetti' instead of 'Riva'.

*Oldenlandia psammophila* Chiov., Fl. Somalia II: 232 (=) (1932).

Lectotypus: Senni 615, pro parte.

Somalia.

*Oldenlandia psammophila* Chiov. f. *hirtella* Chiov., (=) Fl. Somalia II: 232 (1932).

Holotypus: Senni 629.

Somalia.

**Oldenlandia herbacea** (L.) Roxb. var. **herbacea**,

Hort. bengal.: 11 (1814).

Typus: Hermann 4.19 (BM holotypus).

Ref.: Thulin M. 2006. Fl. of Somalia 3: 73, ♦ 73.

**Kohautia cynanchica** DC., Prodr. 4: 430 (1830).

Typus: Burchell 1772 (M isotypus).

Ref.: Verdcourt B. in Launert E. 1989. Fl. Zambesiaca 5 (1): 91.

**Oldenlandia chiovendae** (Bremek.) Verdc., Kew Bull. 28 (3): 421 (1974).

Ref.: Thulin M. 2006. Fl. of Somalia 3: 72.

**Amphasma micranthum** (Chiov.) Bremek., Verh. Kon. Ned. Akad. Wetensch., Afd. Natuurk., Tweede Sect., 48 (2): 172 (1952).

Ref.: <http://www.vilge.ch/musinfo/bd/cjb/africa>.

**Kohautia caespitosa** Schnizl., Flora 25, Beibl. 1: 145 (1842).

Typus: Kotschy 138 (W holotypus; K isotypus).

Ref.: Thulin M. 2006. Fl. of Somalia 3: 69.

**Kohautia platyphylla** (K.Schum.) Bremek., Verh. Kon. Ned. Akad. Wetensch., Afd. Natuurk., Tweede Sect., 48 (2): 81 (1952).

Ref.: Puff C. in Hedberg I., Edwards S. & Sileshi Nemomissa 2003. Fl. of Ethiopia and Eritrea 4 (1): 210.

**Oldenlandia richardsonioides** (K.Schum.) Verdc., Kew Bull. 28 (3): 420 (1974).

Typus: Riva 1650 (FT holotypus).

Ref.: Thulin M. 2006. Fl. of Somalia 3: 70.

**Oldenlandia richardsonioides** (K.Schum.) Verdc., Kew Bull. 28 (3): 420 (1974).

Typus: Riva 1650 (FT holotypus).

Ref.: Thulin M. 2006. Fl. of Somalia 3: 70.

- Oldenlandia rhynchotheca* K.Schum., Bot. Jahrb. Syst. 33: 334 (1903);  
 Syntypi: Riva 54; Robecchi-Bricchetti 611.  
 Somalia.
- Oldenlandia saganensis* Cufod., Nuovo Giorn. Bot. Ital., n.s., 55: 84 (1948).  
 Lectotypus: Corradi 2865 (? Bremekamp, Verh. Kon. Ned. Akad. Wetensch., Afd. Natuurk., Tweede Sect., 48 (2): 108. 1952).  
 Syntypi: Corradi 2846, 2847, 2848, 2849, 2850, 2851, 2852, 2853, 2854, 2855, 2857, 2858, 2859, 2860, 2861, 2862, 2864, 2867, 2868.  
 Ethiopia.
- Oldenlandia sarcophylla* Chiov., Fl. Somalia II: 233 (1932).  
 Holotypus: Senni 572.  
 Somalia.
- Oldenlandia saxifragoides** Chiov., Fl. Somalia: 190, ♦ t. XXI, f. 1 (1929).  
 Holotypus: Puccioni & Stefanini 427 [478].  
 Somalia.
- Oldenlandia schweinfurthii* A.Terracc., Annuario Reale Ist. Bot. Roma 5 (3): 107 (1894).  
 Holotypus: Terracciano 20.  
 Eritrea.
- Oldenlandia somala* Bremek., Verh. Kon. Ned. Akad. Wetensch., Afd. Natuurk., Tweede Sect., 48 (2): 251 (1952).  
 Holotypus: Bisi 134.  
 Somalia.
- Otocephalus umbelliferus* Chiov., Bull. Soc. Bot. Ital. 1924: 41 (1924).  
 Syntypi: Mazzocchi-Alemani 62, 129, 178.  
 Angola.
- Otomeria (?) heterophylla* K.Schum., Bot. Jahrb. Syst. 33: 336 (1903).  
 Holotypus: Riva 159.  
 Ethiopia.
- Paolia jasminoides* Chiov., Result. Sc. Miss. Stefanini-Paoli Somal. Ital. I: 94 (1916).  
 Syntypi: Paoli 931 bis, 948.  
 Somalia.
- Pavetta corradiana* Cufod., Nuovo Giorn. Bot. Ital., n.s., 55: 88 (1948).  
 Syntypi: Corradi 2697, 2698, 2699.  
 Somalia.
- (=) **Conostomium longitudine** (Beck) Cufod., Nuovo Giorn. Bot. Ital., n.s., 55: 85 (1948).  
 Typus: Hardeger s.n. (W holotypus).  
 Ref.: Thulin M. 2006. Fl. of Somalia 3: 76, ♦ 76.
- (=) **Kohautia caespitosa** Schnizl. subsp. **amaniensis** (K.Krause) Govaerts, Bot. J. Linn. Soc. 157: 122 (2008).  
 Typus: Braun in Herb. Amani 1383 (B holotypus; EA isotypus).  
 Ref.: Puff C. in Hedberg I., Edwards S. & Sileshi Nemomissa 2003. Fl. of Ethiopia and Eritrea 4 (1): 210.
- (=) **Kohautia caespitosa** Schnizl., Flora 25, Beibl. 1: 145 (1842).  
 Typus: Kotschy 138 (W holotypus; K isotypus).  
 Ref.: Thulin M. 2006. Fl. of Somalia 3: 69.
- (=) **Kohautia caespitosa** Schnizl. subsp. **caespitosa**, Flora 25, Beibl. 1: 145 (1842).  
 Typus: Kotschy 138 (W holotypus; K isotypus).  
 Ref.: Puff C. in Hedberg I., Edwards S. & Sileshi Nemomissa 2003. Fl. of Ethiopia and Eritrea 4 (1): 210, ♦ 212.
- (=) **Oldenlandia fastigiata** Bremek. var. **somala** (Bremek.) Verdc., Kew Bull. 30 (2): 299 (1975).  
 Ref.: Thulin M. 2006. Fl. of Somalia 3: 73, ♦ 73.
- (=) **Calanda rubricaulis** K.Schum., Kunene-Sambesi-Exped.: 386 (1903).  
 Typus: Baum 899 (M,W isotypus).  
 Ref.: <http://www.villege.ch/musinfo/bd/cjb/africa>.
- (=) **Conostomium quadrangulare** (Rendle) Cufod., Nuovo Giorn. Bot. Ital., n.s., 55: 85 (1948).  
 Typus: Donaldson-Smith s.n. (BM holotypus).  
 Ref.: Puff C. in Hedberg I., Edwards S. & Sileshi Nemomissa 2003. Fl. of Ethiopia and Eritrea 4 (1): 213, ♦ 213.
- (=) **Coffea rhamnifolia** (Chiov.) Bridson, Kew Bull. 38 (2): 320 (1983).  
 Typus: Paoli 1163 (FT holotypus).  
 Ref.: Thulin M. 2006. Fl. of Somalia 3: 110, ♦ 110.
- (=) **Pavetta microphylla** Chiov., Fl. Somalia: 194 (1929).  
 Typus: Puccioni & Stefanini 265 [300] (FT lectotypus).  
 Ref.: Bridson D. & Thulin M. in Thulin M. 2006. Fl. of Somalia 3: 98.

- Pavetta eritreensis* Bremek., Repert. Spec. Nov. (=) Regni Veg. 37: 143 (1934).  
Holotypus: Pappi 5214.  
Eritrea.
- Pavetta fossorum* Bremek., Kew Bull.: 1948, 357 (=) (1949).  
Isosyntypus: Collenette 284.  
(K syntypus. Bridson & Thulin, Fl. of Somalia 3: 99. 2006).  
Somalia.
- Pavetta gardeniifolia* Hochst. ex A.Rich. var. ( $\equiv$ ) *longiflora* Vatke, Oesterr. Bot. Z. 25: 231 (1875).  
Syntypus: Beccari 148.  
Eritrea.  
The specimen 'Beccari 148' has been published by Beccari (Fl. Bogos.: 43. 1886) as the holotype of '*Pavetta kerrenensis*'.
- Pavetta hochstetteri* Bremek. var. *mollirama* Bremek., (=) Repert. Spec. Nov. Regni Veg. 37: 183 (1934).  
Holotypus: Riva 122.  
Ethiopia.
- Pavetta ligustriodora* Chiov., Result. Sc. Miss. (=) Stefanini-Paoli Somal. Ital. I: 96 (1916).  
Syntypi: Paoli 306, 486, 725, 1154.  
Somalia.
- Pavetta microphylla** Chiov., Fl. Somalia: 194 (1929).  
Lectotypus: Puccioni & Stefanini 265 [300] (Bremekamp, Repert. Spec. Nov. Regni Veg. 37: 160. 1934).  
Somalia.  
The syntype 'Puccioni & Stefanini 252' is lacking in FT.
- Pavetta murleensis* Cufod., Nuovo Giorn. Bot. Ital., (=) n.s., 55: 89 (1948).  
Syntypi: Corradi 2791, 2792, 2793, 2794 p.p.  
Ethiopia.
- Pavetta murleensis* Cufod. var. *glabrescens* Cufod., (=) Nuovo Giorn. Bot. Ital., n.s., 55: 89 (1948).  
Syntypi: Corradi 2790, 2794 p.p.  
Ethiopia.
- Pavetta abyssinica** Fresen. var. **dolichosiphon** (Bremek.) Bridson, Kew Bull. 32 (3): 636 (1978).  
Typus: Quartin Dillon & Petit 132 (K holotypus; P isotypus).  
Ref.: Puff C. in Hedberg I., Edwards S. & Sileshi Nemomissa 2003. Fl. of Ethiopia and Eritrea 4 (1): 265.
- Pavetta gardeniifolia** A.Rich. var. **gardeniifolia**, Tent. Fl. Abyss. 1: 351 (1848).  
Typus: Schimper 1141 (P lectotypus; K, WU isolectotypus).  
Ref.: Bridson D. & Thulin M. in Thulin M. 2006. Fl. of Somalia 3: 99.
- Pavetta subcana** Hiern var. **longiflora** (Vatke) Bridson, Kew Bull. 32 (3): 646 (1978).  
Ref.: Puff C. in Hedberg I., Edwards S. & Sileshi Nemomissa 2003. Fl. of Ethiopia and Eritrea 4 (1): 266.
- Pavetta gardeniifolia** A.Rich. var. **gardeniifolia**, Tent. Fl. Abyss. 1: 351 (1848).  
Typus: Schimper 1141 (P lectotypus; K, WU isolectotypus).  
Ref.: Puff C. in Hedberg I., Edwards S. & Sileshi Nemomissa 2003. Fl. of Ethiopia and Eritrea 4 (1): 265.
- Coptosperma graveolens** (S.Moore) Degreef subsp. **graveolens**, Syst. & Geogr. Pl. 71(2): 374 (2002).  
Typus: Bagshawe 1173 (BM holotypus).  
Ref.: Degreef J. & Bridson D. in Thulin M. 2006. Fl. of Somalia 3: 102.
- Pavetta subcana** Hiern var. **longiflora** (Vatke) Bridson, Kew Bull. 32 (3): 646 (1978).  
Typus: Beccari 148 (FT syntypus).  
Ref.: Puff C. in Hedberg I., Edwards S. & Sileshi Nemomissa 2003. Fl. of Ethiopia and Eritrea 4 (1): 266.
- Pavetta subcana** Hiern var. **longiflora** (Vatke) Bridson, Kew Bull. 32 (3): 646 (1978).  
Typus: Beccari 148 (FT syntypus).  
Ref.: Puff C. in Hedberg I., Edwards S. & Sileshi Nemomissa 2003. Fl. of Ethiopia and Eritrea 4 (1): 266.

- Pavetta platyphylla** Chiov., Fl. Somalia II: 248, ♦ 247 (1932).  
 Holotypus: Senni 396.  
 Somalia.
- Pavetta rudolphina** Cufod., Nuovo Giorn. Bot. Ital., n.s., 55: 89 (1948).  
 Syntypi: Corradi 2789, 2795, 2796, 2797, 2798.  
 Ethiopia.
- Pavetta rudolphina** Cufod. var. *robusta* Cufod., Nuovo Giorn. Bot. Ital., n.s., 55: 90 (1948).  
 Holotypus: Corradi 2799.  
 Ethiopia.
- Pavetta sennii** Chiov., Fl. Somalia II: 251, ♦ 251 (1932).  
 Holotypus: Senni 544.  
 Somalia.
- Pavetta venenata** Hutch. & E.A.Bruce, Kew Bull. 1941: 149 (1941).  
 Isotypus: Gillett 4290.  
 (K holotypus. Hutchinson & Bruce, Kew Bull. 1941: 149. 1941).  
 Somalia.
- Pentanisia longepedunculata** Verdc., Bull. Jard. Bot. État 22: 278 (1952).  
 Holotypus: Puccioni & Stefanini 582 [637].  
 Somalia.
- Pentanisia ouranogyne** S.Moore var. *glabrifolia* Cufod., Nuovo Giorn. Bot. Ital., n.s., 55: 87 (1948).  
 Syntypi: Corradi 2731, 2732, 2733.  
 Ethiopia.
- Pentas caffensis** Chiov., Atti Reale Accad. Italia, Mem. Cl. Sci. Fis., Ser. 7: 11 (2): 33 (1940).  
 Holotypus: Paiella 275.  
 Ethiopia.
- Pentas coerulea** Chiov., Atti Reale Accad. Italia, Mem. Cl. Sci. Fis., Ser. 7: 11 (2): 34 (1940).  
 Holotypus: Giordano 2452.  
 Ethiopia.
- Pentas flammea** Chiov., Fl. Somalia II: 231 (1929).  
 Holotypus: Senni 395.  
 Somalia.
- (=) **Pavetta crebrifolia** Hiern var. **pubescens** Bridson, Kew Bull. 32 (3): 624 (1978).  
 Typus: Gillespie (K holotypus).  
 Ref.: Bridson D. & Thulin M. in Thulin M. 2006. Fl. of Somalia 3: 98.
- (=) **Pavetta subcana** Hiern var. **longiflora** (Vatke) Bridson, Kew Bull. 32 (3): 646 (1978).  
 Typus: Beccari 148 (FT syntypus).  
 Ref.: Puff C. in Hedberg I., Edwards S. & Sileshi Nemomissa 2003. Fl. of Ethiopia and Eritrea 4 (1): 266.
- (=) **Pavetta subcana** Hiern var. **longiflora** (Vatke) Bridson, Kew Bull. 32 (3): 646 (1978).  
 Typus: Beccari 148 (FT syntypus).  
 Ref.: Puff C. in Hedberg I., Edwards S. & Sileshi Nemomissa 2003. Fl. of Ethiopia and Eritrea 4 (1): 266.
- (=) **Pentanisia ouranogyne** S.Moore, J. Bot. 18: 4 (1880).  
 Typus: Hildebrandt 2754 (BM holotypus; K, W isotypus).  
 Ref.: Puff C. in Hedberg I., Edwards S. & Sileshi Nemomissa 2003. Fl. of Ethiopia and Eritrea 4 (1): 282.
- (=) **Pentas lanceolata** (Forssk.) Deflers subsp. **quartiniana** (A.Rich.) Verdc., Bull. Jard. Bot. État 23 (3-4): 346 (1953).  
 Typus: Quartin Dillon 6 (P holotypus; S, W isotypus).  
 Ref.: Puff C. in Hedberg I., Edwards S. & Sileshi Nemomissa 2003. Fl. of Ethiopia and Eritrea 4 (1): 206.
- (=) **Pentas bussei** K.Krause, Bot. Jahrb. Syst. 43: 134 (1909).  
 Tyus: Busse 2628 (B holotypus, destr.; BR, EA, K isotypus).  
 Ref.: Thulin M. 2006. Fl. of Somalia 3: 66.

**Pentas nervosa** Hepper, Kew Bull. 14 (2): 254 (1960).

Isotypus: Hepper 1535.

(K holotypus. Hepper, Kew Bull. 14 (2): 254. 1960).

Nigeria.

*Pentas parvifolia* Hiern var. *nemorosa* Chiov. f. (=) *brachystyla* Chiov., Racc. Miss. Consolata Kenya: 52 (1935).

Lectotypus: Balbo 678\* (Verdcourt, Bull. Jard. Bot. État 23 (3-4): 349. 1953).

Syntypus: Balbo 544\*.

Kenya.

*Pentas parvifolia* Hiern var. *nemorosa* Chiov. f. (=) *macrostyla* Chiov., Racc. Miss. Consolata Kenya: 52 (1935).

Holotypus: Balbo 138\*.

Kenya.

**Pentas tenuis** Verdc., Kirkia 5: 273 (1966).

Isotypus: Mooney 8454.

(K holotypus. Puff, Fl. of Ethiopia and Eritrea 4 (1): 203. 2003).

Ethiopia.

*Pentas verruculosa* Chiov., Atti Reale Accad. Italia, (=) Mem. Cl. Sci. Fis., Ser. 7: 11 (2): 34 (1940).

Holotypus: Senni 2258.

Ethiopia.

**Pentodon laurentioides** Chiov., Fl. Somalia: 192 (1929).

Holotypus: Puccioni & Stefanini 201 [229].

Somalia.

*Plectronia bogosensis* Martelli, Fl. Bogos.: 42 (1886). (=) Holotypus: Beccari 155.

Eritrea.

*Plectronia graniticola* Chiov., Result. Sc. Miss. (=) Stefanini-Paoli Somal. Ital. I: 94 (1916).

Holotypus: Paoli 721.

Somalia.

*Plectronia rhamnifolia* Chiov., Result. Sc. Miss. (=) Stefanini-Paoli Somal. Ital. I: 95 (1916).

Holotypus: Paoli 1163.

Somalia.

**Pentas lanceolata** (Forssk.) Deflers subsp. *quartiniana* (A.Rich.) Verdc. var. *nemorosa* (Chiov.) Verdc., Bull. Jard. Bot. État 23 (3-4): 349 (1953).

Ref.: Verdcourt B. in Polhill R.M. 1976. Fl. Trop. East Afr., Rubiaceae (Part 1): 211.

**Pentas lanceolata** (Forssk.) Deflers subsp. *quartiniana* (A.Rich.) Verdc. var. *nemorosa* (Chiov.) Verdc., Bull. Jard. Bot. État 23 (3-4): 349 (1953).

Ref.: Verdcourt B. in Polhill R.M. 1976. Fl. Trop. East Afr., Rubiaceae (Part 1): 211.

**Pentas lanceolata** (Forssk.) Deflers subsp. *quartiniana* (A.Rich.) Verdc., Bull. Jard. Bot. État 23 (3-4): 346 (1953).

Typus: Quartin Dillon 6 (P holotypus; S, W isotypus).

Ref.: Puff C. in Hedberg I., Edwards S. & Sileshi Nemomissa 2003. Fl. of Ethiopia and Eritrea 4 (1): 206.

**Pyrostria phyllanthoidea** (Baill.) Bridson, Kew Bull. 42 (3): 629 (1987).

Typus: Boivin s.n. (P holotypus).

Ref.: Puff C. in Hedberg I., Edwards S. & Sileshi Nemomissa 2003. Fl. of Ethiopia and Eritrea 4 (1): 274, ♀ 275.

**Psydrax graniticola** (Chiov.) Bridson, Kew Bull. 40 (4): 717 (1985).

Ref.: Thulin M. 2006. Fl. of Somalia 3: 92.

**Coffea rhamnifolia** (Chiov.) Bridson, Kew Bull. 38 (2): 320 (1983).

Ref.: Thulin M. 2006. Fl. of Somalia 3: 110, ♀ 110.

- Plectronia sennii* Chiov., Fl. Somala II: 243, ♀ 244 (1932).  
 Holotypus: Senni 479.  
 Somalia.
- Polysphaeria jubense* Chiov., Fl. Somala II: 242 (1932), nom. eventuale.  
 Holotypus: Tozzi 268.  
 Somalia.
- Psychotria punctata* Vatke var. *hirtella* Chiov., Miss. Biol. Borana, Racc. Bot. Angiosp.-Gymnosp.: 231, ♀ 232 (1939).  
 Syntypi: Cufodontis 387, 626.  
 Ethiopia.  
 The specimens 'Cufodontis 387 and 626' have been published by Cufodontis (Nuovo Giorn. Bot. Ital., n.s., 55: 90. 1948) as the syntypes of '*Psychotria ciliatocostata*'.
- Randia scabra* Chiov., Flora Somala II: 236, ♀ 237 (1932).  
 Syntypi: Senni 225, 553, 554.  
 Somalia.
- Tarennia boranensis* Cufod., Nuovo Giorn. Bot. Ital., n.s., 55: 86 (1948).  
 Lectotypus: Corradi 2765 (Puff, Fl. of Ethiopia and Eritrea 4 (1): 262. 2003).  
 Syntypi: Corradi 2766, 2767, 2776, 2778, 2779, 2780, 2781, 2782, 2783, 2784, 2785, 2786, 2787, 2788.  
 Ethiopia.
- Tarennia drummondii** Bridson, Kew Bull. 34 (2): 379, ♀ 384 (1979).  
 Isotypus: Drummond & Hemsley 4024.  
 (K holotypus. Bridson, Kew Bull. 34 (2): 379. 1979).  
 Kenya.
- Tarennia edgardi* Chiov., Racc. Miss. Consolata Kenya: 52 (1935), as 'edgardi', *nomen eventuale*; Miss. Biol. Borana, Racc. Bot. Angiosp.-Gymnosp.: 227 (1939).  
 Syntypi/Isosyntypi: Cufodontis 209, 356.  
 Ethiopia.
- Tricalysia sennii* Chiov., Fl. Somala II: 240, ♀ 241 (1929).  
 Holotypus: Senni 437.  
 Somalia.
- (=) **Pavetta uniflora** Bremek., Hooker's Icon. Pl. 32: t. 3194, ♀ t. 3194 (1933).  
 Typus: Graham in F.D. 1856 (K holotypus; EA isotypus).  
 Ref.: Bridson D. & Thulin M. in Thulin M. 2006. Fl. of Somalia 3: 100, ♀ 100.
- (=) **Polysphaeria multiflora** Hiern subsp. **pubescens** Verdc., Kew Bull. 35 (1): 127 (1980).  
 Typus: Greenway 9239 (K holotypus; EA isotypus).  
 Ref.: Verdcourt B. 1980. Kew Bull. 35 (1): 127.
- (=) **Psychotria kirkii** Hiern var. **nairobiensis** (Bremek.) Verdc., Kew Bull. 30 (2): 262 (1975).  
 Typus: Dawson 490 (K holotypus).  
 Ref.: Puff C. in Hedberg I., Edwards S. & Sileshi Nemomissa 2003. Fl. of Ethiopia and Eritrea 4 (1): 201.
- (=) **Oxyanthus zanguebaricus** (Hiern) Bridson, Kew Bull. 34 (1): 119 (1979).  
 Typus: Hildebrandt 1268 (K holotypus; BM isotypus).  
 Ref.: Thulin M. 2006. Fl. of Somalia 3: 108.
- (=) **Coptosperma graveolens** (S.Moore) Degreef subsp. **graveolens**, Syst. & Geogr. Pl. 71 (2): 374 (2002).  
 Typus: Bagshawe 1173 (BM holotypus).  
 Ref.: Degreef J. & Bridson D. in Thulin M. 2006. Fl. of Somalia 3: 102.  
 Link: *Tarennia graveolens* (S.Moore) Bremek. subsp. *graveolens*, Puff, Fl. of Ethiopia and Eritrea 4 (1): 262 (2003).
- (=) **Coptosperma graveolens** (S.Moore) Degreef subsp. **graveolens**, Syst. & Geogr. Pl. 71(2): 374 (2002).  
 Typus: Bagshawe 1173 (BM holotypus).  
 Ref.: Degreef J. & Bridson D. in Thulin M. 2006. Fl. of Somalia 3: 102.  
 Link: *Tarennia graveolens* (S.Moore) Bremek. subsp. *graveolens*. Puff, Fl. of Ethiopia and Eritrea 4 (1): 262 (2003).
- (=) **Tenantia sennii** (Chiov.) Verdc. & Bridson, Kew Bull., 36 (3): 511 (1981).  
 Ref.: Thulin M. 2006. Fl. of Somalia 3: 102, ♀ 103.

*Vangueria edulis* Lam. var. *pubescens* Fiori, Agric. Colon. 5, Suppl.: 140 (1912).  
Holotypus/Isotypus: Fiori 434.  
Eritrea.

*Vignaldia quartiniana* A.Rich. var. *grandiflora* (=)  
Schweinf., Beitr. Fl. Aethiop.: 140 (1867).  
Isotypus: Schimper 338.  
(B holotypus, destr. Puff, Fl. of Ethiopia and Eritrea 4 (1): 205. 2003).  
Ethiopia.

*Vangueria madagascariensis* J.F.Gmel. var. *abyssinica* (A.Rich.) Puff, Fl. of Ethiopia and Eritrea 4 (1): 279 (2003).

Typus: Quartin-Dillon s.n. (P holotypus).

Ref.: Puff C. in Hedberg I., Edwards S. & Sileshi Nemomissa 2003. Fl. of Ethiopia and Eritrea 4 (1): 279.

*Pentas lanceolata* (Forssk.) Deflers subsp. *lanceolata*, Voy. Yemen: 142 (1889).

Typus: Forsskål 1525, 1526, 1527 (C syntypi).

Ref.: Puff C. in Hedberg I., Edwards S. & Sileshi Nemomissa 2003. Fl. of Ethiopia and Eritrea 4 (1): 205.

## SALVADORACEAE

*Salvadora cyclophylla* Chiov., Fl. Somalia II: 282, ♀ (=) 281, 282 (1932).  
Holotypus: Senni 145.  
Somalia.

*Salvadora persica* L. var. *cyclophylla* (Chiov.) Verdc., Kew Bull. 19 (1): 152 (1964).

Ref.: Abdi M. Dahir in Thulin M. 1999. Fl of Somalia 2:126.

## SAPINDACEAE

**Allophylus africanus** P.Beauv. forma **acuminatus**  
Robyns ex Hauman, Bull. Jard. Bot. État 28: 100 (1958).  
Isotypus: Robyns 346.  
(BR holotypus. Hauman, Fl. Congo Belg. & Ruanda Urundi 9: 292. 1960).  
Democratic Republic of the Congo.

**Bottegoa insignis** Chiov., Result. Sc. Miss. Stefanini-Paoli Somal. Ital. I: 58, ♀ t. 6, f. B, 59 (1916).  
Holotypus: Stefanini & Paoli 923.  
Somalia.  
In Fl. of Somalia 2: 254 (1999) the genus Bottegoa is placed in Ptaeroxylaceae.

*Cardiospermum canescens* Wall. var. *glabrescens* (=) Almagia, Annuario Reale Ist. Bot. Roma 8 (1): 146 (1903).  
Syntypi: Terracciano & Pappi 649, 1254, 2272, 2434, 2511; Pappi 3698; Pullino 6.  
Eritrea.

*Chiarinia jubae-fluvii* Chiov., Fl. Somalia II: 149, ♀ (=) 148, 149 (1932).  
Holotypus: Tozzi 339.  
Somalia.

**Cardiospermum corindum** L., Sp. Pl. (ed. 2): 1: 526 (1762).

Type: Corindum villosum, foliis quinato-ternatis incisis obtusis, petiolis brevibus, Mill., Gard. Dict., ed. 7 (1759) (holotypus).

Ref.: Vollesen K. in Hedberg I. & Edwards S. 1989. Fl. of Ethiopia 3: 497.

**Lecaniodiscus fraxinifolius** Baker subsp. **scassellatii** (Chiov) Friis, Kew Bull. 39 (4): 781 (1984).

Types: Scassellati & Mazzocchi 2 (FT lectotypus); Scassellati & Mazzocchi 20, 40 (FT syntypi).

Ref.: Friis I. & Vollesen K. in Thulin M. 1999. Fl. of Somalia 2: 248, ♀ 248.

- Filicium somalense* Chiov., Fl. Somalia II: 143, ♫ 144 (1932).  
 Holotypus: Senni 110.  
 Somalia.
- Haplocoelum jubense* Chiov., Result. Sc. Miss. Stefanini-Paoli Somal. Ital. I: 56, 206 (1916).  
 Syntypi: Stefanini & Paoli 464, 465, 477; Scassellati & Mazzocchi 76.  
 Somalia.
- Haplocoelum scassellatii* Chiov., Result. Sc. Miss. Stefanini-Paoli Somal. Ital. I: 206 (1916).  
 Lectotypus: Scassellati & Mazzocchi 2 (Friis, Kew Bull. 39 (4): 781. 1984).  
 Syntypi: Scassellati & Mazzocchi 20, 40.  
 Somalia.
- Pappea radikoferi* Schweinf., Bull. Herb. Boissier 7, App. 2: 338 (1899).  
 Isosyntypi: Schweinfurth & Riva 1041, 1614.  
 (ubi? syntypi. Vollesen, Fl. of Ethiopia 3: 508. 1989).  
 Eritrea.
- (=) *Haplocoelum inoploaeum* Radlk., Sitzungsber. Math.-Phys. Cl. Konigl. Bayer. Akad. Wiss. Munchen 8: 337 (1878).  
 Type: Boivin (P holotypus).  
 Ref.: Friis I. & Vollesen K. in Thulin M. 1999. Fl. of Somalia 2: 250, ♫ 249.
- (=) *Camptolepis ramiflora* (Taub.) Radlk., in Engler & Prantl, Nat. Pflanzenfam., Nachtr. 3: 207 (1907).  
 Type: Sthulmann 142 (B holotypus, destr.); Sacleux 682 (P neotypus).  
 Ref.: Friis I. & Vollesen K. in Thulin M. 1999. Fl. of Somalia 2: 250, ♫ 251.
- (=) *Lecaniodiscus fraxinifolius* Baker subsp. *scassellatii* (Chiov) Friis, Kew Bull. 39 (4): 781 (1984).  
 Ref.: Friis I. & Vollesen K. in Thulin M. 1999. Fl. of Somalia 2: 248, ♫ 248.
- (=) *Pappea capensis* Eckl. & Zeyh., Enum. pl. afric. austral. 53 (1834).  
 Type: Zeyher 151 (K lectotypus).  
 Ref.: Vollesen K. in Hedberg I. & Edwards S. 1989. Fl. of Ethiopia 3: 508, ♫ 509.

## SAPOTACEAE

- Manilkara butugi** Chiov., Atti Reale Accad. Italia, Mem. Cl. Sc. Fis., Ser. 7: 11 (2): 46 (1940).  
 Syntypi: Giordano 2465; Giugliarelli 596.  
 Ethiopia.
- Mimusops angel** Chiov., Fl. Somalia: 213, ♫ t. XXIV, f. 3; t. XL, f. 1, 2; t. XLIV, f. 1, 2 (1929).  
 Syntypi: Puccioni & Stefanini 652 [716], 680 [746], 702 [777].  
 Somalia.
- Mimusops degan* Chiov., Result. Sc. Miss. Stefanini-Paoli Somal. Ital. I: 110, ♫ t. 24, f. C (1916).  
 Syntypi: Paoli 482, 1289.  
 Somalia.
- Mimusops densiflora* Engl. var. *paolii* Chiov., Result. Sc. Miss. Stefanini-Paoli Somal. Ital. I: 111 (1916).  
 Holotypus: Paoli 632.  
 Somalia.
- Mimusops somalensis** Chiov., Result. Sc. Miss. Stefanini-Paoli Somal. Ital. I: 109 (1916).  
 Holotypus/Isotypus: Paoli 837.  
 Somalia.
- (=) *Mimusops obtusifolia* Lam., Encyd. 4: 186 (1797).  
 Typus: a specimen at P, without indication of locality or collector.  
 Ref.: Friis I. in Thulin M. 2006. Fl. of Somalia 3: 13.
- (=) **Manilkara mochisia** (Baker) Dubard, Ann. Ist. Bot.-Geol. Colon. Marseille 3: 26 (1915).  
 Typus: Kirk 304 (K lectotypus).  
 Ref.: Friis I. in Thulin M. 2006. Fl. of Somalia 3: 16, ♫ 15.

- Mimusops stenopetala* Chiov., Atti Reale Accad. Italia, Mem. Cl. Sc. Fis., Ser. 7: 11 (2): 47 (1940). (=)  
 Holotypus/Isotypus: Milizia Forestale 1015.  
 Ethiopia.
- Pouteria ferruginea* Chiov., Atti Reale Accad. Italia, Mem. Cl. Sc. Fis., Ser. 7: 11 (2): 42 (1940).  
 Syntypi: Giuliarelli 583; Giordano 2447;  
 Capuano 2530.  
 Ethiopia.
- Pouteria giordani* Chiov., Atti Reale Accad. Italia, Mem. Cl. Sc. Fis., Ser. 7: 11 (2): 43 (1940).  
 Holotypus/Isotypus: Giordano 2455.  
 Ethiopia.
- Pouteria rufinervis* Chiov., Atti Reale Accad. Italia, Mem. Cl. Sc. Fis., Ser. 7: 11 (2): 44 (1940).  
 Syntypi: Giordano 2478; Milizia Forestale 564.  
 Ethiopia.
- Sideroxylon buxifolium* Hutch., Bull. Misc. Inform. 1931: 413 (1931).  
 Isotypus: Collenette 371.  
 (K holotypus. Friis, Fl. of Somalia 3: 17. 2006).  
 Somalia.
- Sideroxylon corradii* Chiov., Webbia 8 (1): 236 (1951).  
 Holotypus/Isotypus: Corradi 8252.  
 Ethiopia.
- Sideroxylon discolor** Radcl.-Sm., Hooker's Icon. Pl. 7 (4): t. 3684, ♀ t. 3684 (1971).  
 Isotypus: Radcliffe-Smith & Lavranos 428.  
 (K holotypus. Radcliffe-Smith, Hooker's Icon. Pl. 7 (4): t. 3684. 1971).  
 Yemen, Socotra.
- Sideroxylon gillettii* Hutch. & E.A.Bruce. Bull. Misc. Inform. 1941: 142 (1941).  
 Isotypus: Gillett 4733.  
 (K holotypus. Hutchinson & E.A.Bruce, Bull. Misc. Inform. 1941: 142. 1941).  
 Somalia.
- Mimusops kummel** A.DC. in DC., Prodr. 8: 203 (1844).  
 Typus: Schimper 280 (K lectotypus; BM, OXF isolectotypus).  
 Ref.: Friis I. in Hedberg I., Edwards S. & Sileschi Nemomissa 2003. Fl. of Ethiopia and Eritrea 4 (1): 55, ♀ 56.
- Pouteria adolfi-friedericii** (Engl.) A.Meeuse, Bothalia 7: 341 (1960).  
 Typi: Mildbraed 1447, 1481, 2528 (all B syntypi, destr.).  
 Ref.: Friis I. in Hedberg I., Edwards S. & Sileschi Nemomissa 2003. Fl. of Ethiopia and Eritrea 4 (1): 61, ♀ 62.
- Pouteria altissima** (A.Chev.) Baehni, Candollea 9: 292 (1942).  
 Typi: Chevalier 13129, 13141 (bouth P syntypi).  
 Ref.: Friis I. in Hedberg I., Edwards S. & Sileschi Nemomissa 2003. Fl. of Ethiopia and Eritrea 4 (1): 63, ♀ 62.
- Pouteria adolfi-friedericii** (Engl.) A.Meeuse, Bothalia 7: 341 (1960).  
 Typi: Mildbraed 1447, 1481, 2528 (all B syntypi, destr.).  
 Ref.: Friis I. in Hedberg I., Edwards S. & Sileschi Nemomissa 2003. Fl. of Ethiopia and Eritrea 4 (1): 61, ♀ 62.
- Sideroxylon mascatense** (A.DC.) T.D.Penn., in G.E. Wickens, J.R. Goodin & D.V. Field (eds.), Pl. Arid Lands: 273 (1985).  
 Typus: Aucher-Eloy 4916 (G-DC lectotypus).  
 Ref.: Friis I. in Thulin M. 2006. Fl. of Somalia 3: 17.
- Sideroxylon mascatense** (A.DC.) T.D.Penn., in G.E. Wickens, J.R. Goodin & D.V. Field (eds.), Pl. Arid Lands: 273 (1985).  
 Typus: Aucher-Eloy 4916 (G-DC lectotypus).  
 Ref.: Friis I. in Hedberg I., Edwards S. & Sileschi Nemomissa 2003. Fl. of Ethiopia and Eritrea 4 (1): 60, ♀ 59.
- Sideroxylon mascatense** (A.DC.) T.D.Penn., in G.E. Wickens, J.R. Goodin & D.V. Field (eds.), Pl. Arid Lands: 273 (1985).  
 Typus: Aucher-Eloy 4916 (G-DC lectotypus).  
 Ref.: Friis I. in Thulin M. 2006. Fl. of Somalia 3: 17.

## SCROPHULARIACEAE

- Anticharis glandulosa* Asch. var. *intermedia* A.Terracc., Annuario Reale Ist. Bot. Roma 5 (3): 103 (1894).  
 Holotypus: Terracciano 61.  
 Eritrea.
- Campylanthus spinosus* Balf.f. var. *kuriensis* Radcl.- Sm., Kew Bull. 25 (2): 189 (1971).  
 Isotypus: Radcliffe-Smith & Lavranos 706.  
 (K holotypus. Radcliffe-Smith, Kew Bull. 25 (2): 189. 1971).  
 Yemen, Socotra.
- Celsia foliosa* Chiov., Ann. Bot. (Rome) 9 (1): 84 (1911).  
 Holotypus: Chiovenda 931.  
 Ethiopia.
- Celsia micrantha* Chiov., Ann. Bot. (Rome) 10 (3): 398 (1912).  
 Holotypus: Negri 1202.  
 Ethiopia.
- Chamaeacanthus pumilus* Chiov., Fl. Somalia: 267, t. XXIX, f. 3 (1929).  
 Holotypus: Puccioni & Stefanini 616 [679].  
 Somalia.
- Craterostigma boranense* Chiov., Miss. Biol. Borana, Racc. Bot. Angiosp.-Gymnos.: 206, ♫ 207 (1939).  
 Syntypi/Isosyntypi: Cufodontis 207, 315.  
 Ethiopia.
- Cycniopsis humifusa* (Forssk.) Engl. f. *hispida* Fiori, Nuovo Giorn. Bot. Ital., n.s., 47 (1): 37 (1940).  
 Holotypus: Saccardo s.n.  
 Ethiopia.
- Cycinum bricchettii* Engl., Annuario Reale Ist. Bot. Roma 7 (1): 30 (1897).  
 Holotypus: Robecchi-Bricchetti s.n.  
 Ethiopia.
- Cycinum gallaense* Engl., Annuario Reale Ist. Bot. Roma 7 (1): 29 (1897).  
 Holotypus: Riva 1251.  
 Ethiopia.
- (=) **Anticharis glandulosa** Asch., Monatsber. Königl. Preuss. Akad. Wiss. Berlin 1866: 880 (1867).  
 Typus: Schweinfurth 149 (B holotypus, destr.).  
 Ref.: Nepi C. 2004. In schedis.
- (=) **Campylanthus spinosus** Balf.f., Proc. Roy. Soc. Edinburgh 12: 84 (1884).  
 Typus: Balfour 101 (K lectotypus).  
 Ref.: Hjertson M. 1997. Acta Univ. Ups. 331: 43.
- (=) **Rhabdotosperma scrophulariifolia** (Hochst. ex A.Rich.) Hartl subsp. **foliosa** (Chiov.) Hartl, Beitr. Biol. Pflanzen 53 (1): 58 (1977).  
 Ref.: Hartl D. 1977. Beitr. Biol. Pflanzen 53 (1): 58.
- (=) **Verbascum chiovendae** Hub.-Mor., Bauhinia 5 (1): 11 (1973).  
 Ref.: Fischer E. in in Hedberg I., Ensermu Kelbessa, Edwards S., Sebsebe Demissew & Persson E. 2006. Fl. of Ethiopia and Eritrea 5: 251, ♫ 250.
- (=) **Campylanthus spinosus** Balf.f., Proc. Roy. Soc. Edinburgh 12: 84 (1884).  
 Typus: Balfour 101 (K lectotypus).  
 Ref.: Hjertson M. in Thulin M. 2006. Fl. of Somalia 3: 278.
- (=) **Craterostigma smithii** S.Moore, J. Bot. 38: 461 (1900).  
 Typus: D. Smith s.n. (BM holotypus).  
 Ref.: Fischer E. in in Hedberg I., Ensermu Kelbessa, Edwards S., Sebsebe Demissew & Persson E. 2006. Fl. of Ethiopia and Eritrea 5: 270, ♫ 269.
- (=) **Cycniopsis humifusa** (Forssk.) Engl., Bot. Jahrb. Syst. 36: 233 (1905).  
 Typus: Forsskål 401 (C lectotypus).  
 Ref.: Backlund A., Hunde A. & Långström E. 1993. Nordic J. Bot. 13 (2): 190, ♫ 189.
- (=) **Cycinum volvensii** Engl., Pflanzenw. Ost-Afrikas 5, C: 360 (1895).  
 Typus: Volkens 366 (B holotypus, destr.; BM lectotypus).  
 Ref.: Fischer E. in Hedberg I., Ensermu Kelbessa, Edwards S., Sebsebe Demissew & Persson E. 2006. Fl. of Ethiopia and Eritrea 5: 302, ♫ 304.
- (=) **Cycinum volvensii** Engl., Pflanzenw. Ost-Afrikas 5, C: 360 (1895).  
 Typus: Volkens 366 (B holotypus, destr.; BM lectotypus).  
 Ref.: Fischer E. in Hedberg I., Ensermu Kelbessa, Edwards S., Sebsebe Demissew & Persson E. 2006. Fl. of Ethiopia and Eritrea 5: 302, ♫ 304.

- Cycnium tomentosum*** Engl., Annuario Reale Ist. (=) Bot. Roma 7 (1): 29 (1897).  
Holotypus: Riva 1219.  
Ethiopia.
- Ghikaea spectabilis*** Schweinf. & Volkens var. *denticulata* Engl., Annuario Reale Ist. Bot. Roma 7 (1): 28 (1897).  
Holotypus: Riva 322.  
Ethiopia.
- Ilysanthes rupicola*** Lanza, Miss. Biol. Borana, Racc. (=) Bot. Angiosp.-Gymnosp.: 208, ♫ 209 (1939).  
Holotypus/Isotypus: Cufodontis 374.  
Ethiopia.
- Kickxia kuriensis*** Radcl.-Sm., Hooker's Icon. Pl. 7 (4): t. 3689, ♫ t. 3689 (1971).  
Isotypus: Smith & Lavranos 665.  
(K holotypus. Radcliffe-Smith A., Hooker's Icon. Pl. 7 (4): t. 3689. 1971).  
Yemen, Socotra.
- Limosella semiensis*** Pic.Serm., Miss. Stud. Lago (=) Tana, VII, Ricerche Bot. I: 221, ♫ t. XLV (1951).  
Holotypus: Pichi Sermolli 2651.  
Ethiopia.
- Lindenbergia pirottae*** Almagià, Annuario Reale Ist. (=) Bot. Roma 8 (2): 140 (1904).  
Lectotypus: Terracciano 32 (Hjertson, Bot. J. Linn. Soc. 119: 306. 1995).  
Syntypi: Terracciano 51, 352, 353, 786.  
Eritrea.
- Lindenbergia pirottae*** Almagià var. *incana* Almagià, (=) Annuario Reale Ist. Bot. Roma 8 (2): 140 (1904).  
Lectotypus: Terracciano 911 (Hjertson, Bot. J. Linn. Soc. 119: 306. 1995).  
Syntypi: Terracciano 747, 856.  
Eritrea.
- Nanorrhinum roseiflorum*** Mosti, Raffaelli & Tardelli, Webbia 63 (1): 50 (2008).  
Holotypus: Raffaelli, Tardelli & Mosti 112.  
Oman.
- Cycnium erectum*** Rendle, J. Bot. 34: 128 (1896).  
Typus: Donaldson-Smith s.n. (BM holotypus).  
Ref.: Fischer E. in Hedberg I., Ensermu Kelbessa, Edwards S., Sebsebe Demissew & Persson E. 2006. Fl. of Ethiopia and Eritrea 5: 301, ♫ 304.
- Ghikaea speciosa*** (Rendle) Diels, Nat. Pflanzenfam. Nachtr. 3: 314 (1908).  
Typus: Donaldson-Smith s.n. (BM holotypus).  
Ref.: Fischer E. in Hedberg I., Ensermu Kelbessa, Edwards S., Sebsebe Demissew & Persson E. 2006. Fl. of Ethiopia and Eritrea 5: 292, ♫ 293.  
Link: *Ghikaea spectabilis* Schweinf. & Volkens, Cufodontis G., Bull. Jard. Bot. État 33 (4): 904 (1963).
- Lindernia serpens*** Philcox, in Ghazanfar S.A. & Beentje H.J., Fl. Trop. East Afr., Scrophulariaceae: 89 (2008).  
Typus: Grant 211 (K holotypus).  
Ref.: Ghazanfar S.A., Beentje H.J. & Philcox D. in Ghazanfar S.A. & Beentje H.J. 2008. Fl. Trop. East Afr., Scrophulariaceae: 89.
- Limosella capensis*** Thunb., Prodr. Pl. Cap.: 104 (1800).  
Typus: from South Africa (UPS).  
Ref.: Fischer E. in Hedberg I., Ensermu Kelbessa, Edwards S., Sebsebe Demissew & Persson E. 2006. Fl. of Ethiopia and Eritrea 5: 266.
- Lindenbergia indica* (L.) Vatke, Oesterr. Bot. Z. 25 (1): 10 (1875).  
Typus: Herb. Linn. 800.3 (LINN, holotypus).  
Ref.: Hjertson M. in Hedberg I., Ensermu Kelbessa, Edwards S., Sebsebe Demissew & Persson E. 2006. Fl. of Ethiopia and Eritrea 5: 263.**
- Lindenbergia indica* (L.) Vatke, Oesterr. Bot. Z. 25 (1): 10 (1875).  
Typus: Herb. Linn. 800.3 (LINN, holotypus).  
Ref.: Hjertson M. in Hedberg I., Ensermu Kelbessa, Edwards S., Sebsebe Demissew & Persson E. 2006. Fl. of Ethiopia and Eritrea 5: 263.**

- Pseudosopubia obtusifolia* Engl., Annuario Reale Ist. Bot. Roma 7 (1): 28 (1897).  
 Holotypus: Riva 950.  
 Ethiopia.
- Pseudosopubia polemonioides* Chiov., Fl. Somalia II: 338, ♦ 339 (1932).  
 Holotypus: Balladelli 287.  
 Somalia.
- Pseudosopubia verruculosa* Chiov., Miss. Biol. Borana, Racc. Bot. Angiosp.-Gymnosp.: 211, ♦ 212 (1939).  
 Holotypus/Isotypus: Cufodontis 168.  
 Ethiopia.
- Rhamphicarpa neghellensis* Fiori, Nuovo Giorn. Bot. Ital., n.s., 47 (1): 36 (1940).  
 Holotypus: Saccardo s.n.  
 Ethiopia.
- Sopubia lanata* Engl. var. *angustifolia* Engl., Annuario Reale Ist. Bot. Roma 7 (1): 27 (1897).  
 Holotypus: Riva 1285.  
 Ethiopia.
- Sopubia lanata** Engl. var. **glabrescens** Chiov., Agric. Colon. 18 (11-12): 387 (1924).  
 Holotypus: Mazzocchi-Alemanni 238.  
 Angola.
- Stemodiopsis rivae** Engl., Annuario Reale Ist. Bot. Roma 7 (1): 25 (1897).  
 Holotypus: Riva 162.  
 Ethiopia.
- Sutera cymbalariaefolia* Chiov., Result. Sc. Miss. Stefanini-Paoli Somal. Ital. I: 129, ♦ t. 15, f. A (1916).  
 Holotypus: Paoli 713.  
 Somalia.
- Veronica consolatae* Chiov., Racc. Bot. Miss. Consolata Kenya: 90 (1935).  
 Holotypus: Balbo 63\*.  
 Kenya.
- Xylocalyx recurvus** S.Carter, Kew Bull. 16: 150, ♦ 150 (1962).  
 Isotypus: Bally 11886.  
 (K holotypus. Carter, Kew Bull. 16: 150. 1962).  
 Somalia.
- (=) **Pseudosopubia hildebrandtii** (Vatke) Engl., Annuario Reale Ist. Bot. Roma 7 (1): 28 (1897).  
 Typus: Hildebrandt 2314b (B holotypus, destr.).  
 Gillett 12843 (K neotypus).  
 Ref.: Fischer E. in Hedberg I., Ensermu Kelbessa, Edwards S., Sebsebe Demissew & Persson E. 2006. Fl. of Ethiopia and Eritrea 5: 290, ♦ 291.
- (=) **Pseudosopubia hildebrandtii** (Vatke) Engl., Annuario Reale Ist. Bot. Roma 7 (1): 28 (1897).  
 Typus: Hildebrandt 2314b (B holotypus, destr.).  
 Gillett 12843 (K neotypus).  
 Ref.: Fischer E. in Thulin M. 2006. Fl. of Somalia 3: 285, ♦ 285.
- (=) **Pseudosopubia procumbens** Hemsl. in Thiselton-Dyer W.T., Fl. Trop. Afr. 4 (2): 441 (1906).  
 Typus: Lort Phillips s.n. (K lectotypus).  
 Ref.: Fischer E. in Hedberg I., Ensermu Kelbessa, Edwards S., Sebsebe Demissew & Persson E. 2006. Fl. of Ethiopia and Eritrea 5: 291, ♦ 291.
- (=) **Cycnium tubulosum** (L.f.) Engl. subsp. **montanum** (N.E.Br.) O.J.Hansen, Dansk Bot. Ark. 32 (3): 35 (1978).  
 Typus: Elliot s.n. (K lectotypus).  
 Ref.: Fischer E. in Hedberg I., Ensermu Kelbessa, Edwards S., Sebsebe Demissew & Persson E. 2006. Fl. of Ethiopia and Eritrea 5: 301, ♦ 302.
- (=) **Sopubia karaguensis** Oliv., Trans. Linn. Soc. London 29: 123, ♦ t. 87, f. B (1875).  
 Typus: Speke & Grant s.n. (K holotypus).  
 Ref.: Hofmann H.P. & Fischer E. in Hedberg I., Ensermu Kelbessa, Edwards S., Sebsebe Demissew & Persson E. 2006. Fl. of Ethiopia and Eritrea 5: 288.
- (=) **Stemodiopsis buchananii** Skan in Thiselton-Dyer W.T., Fl. Trop. Afr. 4 (2): 315 (1906).  
 Typi: Buchanan 365, 1220.  
 Ref.: Fischer E. in Thulin M. 2006. Fl. of Somalia 3: 281, ♦ 280.
- (=) **Veronica glandulosa** Benth. in DC., Prodr. 10: 482 (1846).  
 Typus: Schimper II: 1149 (K holotypus; BM, P, S isotypus).  
 Ref.: Hedberg O. 1957. In schedis.

## SOLANACEAE

**Discopodium eremanthum** Chiov., Racc. Bot.

Miss. Consolata Kenya: 89 (1935).

Holotypus: Balbo 121\*.

Kenya.

*Lycium cufodontii* Lanza, Miss. Biol. Borana, Racc. (=) Bot. Angiosp.-Gymnosp.: 202, ♦ 203 (1939).

Syntypi/Isosyntypi: Cufodontis 73, 99.

Ethiopia.

**Lycium shawii** Roem. & Schult., Syst. Veg. 4: 693 (1819).

Typus: Shaw s.n. (OXF-Herb. Sherard lecto., selected by Schombeck-Temesy, Fl. Iranica 100: 37 (1972); typification rejected by A.M. Venter who instead selected Shaw, *Travels in Barbery*: fig. 349 (1738).

Ref.: Friis I. in Hedberg I., Ensermu Kelbessa, Edwards S., Sebsebe Demissew & Persson E. 2006. Fl. of Ethiopia and Eritrea 5: 110, ♦ 111.

*Lycium javellense* Lanza, Miss. Biol. Borana, Racc. (=) Bot. Angiosp.-Gymnosp.: 204, ♦ 205 (1939).

Holotypus/Isotypus: Cufodontis 561.

Ethiopia.

**Lycium shawii** Roem. & Schult., Syst. Veg. 4: 693 (1819).

Typus: Shaw s.n. (OXF-Herb. Sherard lecto., selected by Schombeck-Temesy, Fl. Iranica 100: 37 (1972); typification rejected by A.M. Venter who instead selected Shaw, *Travels in Barbery*: fig. 349 (1738).

Ref.: Friis I. in Hedberg I., Ensermu Kelbessa, Edwards S., Sebsebe Demissew & Persson E. 2006. Fl. of Ethiopia and Eritrea 5: 110, ♦ 111.

*Solanum adoense* Hochst. ex A.Br. var. *horridum* (=) Fiori, Boschi e piante legn. Eritr.: 337 (1912).

Syntypi: Fiori 682; Terracciano & Pappi 505, 722.

Eritrea.

**Solanum adoense** Hochst. ex A.Br., Flora 24 (1): 278 (1841).

Typi: Schimper 147, 1865 (P syntypi).

Ref.: Friis I. in Hedberg I., Ensermu Kelbessa, Edwards S., Sebsebe Demissew & Persson E. 2006. Fl. of Ethiopia and Eritrea 5: 131, ♦ 133.

*Solanum adoense* Hochst. ex A.Br. f. *parvofolium* (=) Fiori, Boschi e piante legn. Eritr.: 337 (1912).

Holotypus: Fiori 683.

Eritrea.

**Solanum adoense** Hochst. ex A.Br., Flora 24 (1): 278 (1841).

Typi: Schimper 147, 1865 (P syntypi).

Ref.: Friis I. in Hedberg I., Ensermu Kelbessa, Edwards S., Sebsebe Demissew & Persson E. 2006. Fl. of Ethiopia and Eritrea 5: 131, ♦ 133.

*Solanum adoense* Hochst. ex A.Br. var. *schweinfurthii* (=) Engl., Abh. Königl. Akad. Wiss. Berlin 1891-1892: 373 (1892).

Isotypus: Schimper 236.

(B holotypus, destr. Friis, Fl. of Ethiopia and Eritrea 5: 132. 2006).

Ethiopia.

**Solanum hastifolium** Hochst. ex Dunal, Prodr. 13 (1): 284 (1852).

Typus: Kotschy 393 (G holotypus; K isotypus).

Ref.: Friis I. in Hedberg I., Ensermu Kelbessa, Edwards S., Sebsebe Demissew & Persson E. 2006. Fl. of Ethiopia and Eritrea 5: 132, ♦ 136.

*Solanum albicaule* Kotschy ex Dunal var. *kotschyana* (=) Boselli, Annuario Reale Ist. Bot. Roma 8 (2): 242 (1904).

Syntypi: Terracciano & Pappi 2224, 2424.

Eritrea.

**Solanum forskalii** Dunal, Hist. nat. Solanum: 237 (1813).

Typus: Forsskål 414 (C holotypus).

Ref.: Friis I. in Hedberg I., Ensermu Kelbessa, Edwards S., Sebsebe Demissew & Persson E. 2006. Fl. of Ethiopia and Eritrea 5: 134, ♦ 136.

- Solanum albicaule* Kotschy ex Dunal var. *major* (=) ***Solanum forskalii*** Dunal, Hist. nat. Solanum: 237 (1813).  
Boselli, Annuario Reale Ist. Bot. Roma 8 (2): 242 (1904).  
Syntypi: Terracciano & Pappi 2425, 2692.  
Eritrea.
- Solanum albicaule* Kotschy ex Dunal var. *spinosior* (=) ***Solanum forskalii*** Dunal, Hist. nat. Solanum: 237 (1813).  
Boselli, Annuario Reale Ist. Bot. Roma 8 (2): 242 (1904).  
Syntypi: Terracciano & Pappi 28, 30, 63, 2190, 2422, 2825; Terracciano 32, 293; Pappi 54, 2953, 3996.  
Eritrea.
- Solanum angustifolium* Lanza, Miss. Biol. Borana, Racc. Bot. Angiosp.-Gymnosp.: 191, ♦ 190 (1939), nom. illeg., non Mill. (1768), non Lam. (1794).  
Holotypus/Isotypus: Cufodontis 499.  
Ethiopia.
- Solanum baidoense* Chiov., Result. Sc. Miss. Stefanini-Paoli Somal. Ital. I: 125 (1916). (=) ***Solanum lanzae*** J.-P.Lebrun & Stork, Candollea 50: 217 (1995).  
Holotypus: Paoli 1120.  
Somalia.  
Friis, in Fl. of Somalia 3: 209 (2006) considers '*Solanum tettense* Klotzsch in Peters var. *renschii* (Vatke) A.E.Gonç.' a synonym of '*Solanum tettense* Klotzsch.'
- Solanum balboanum*** Chiov., Racc. Bot. Miss. Consolata Kenya: 87 (1935).  
Syntypi: Balbo 425\*, 579\*.  
Kenya.
- Solanum benadirens*e** Chiov., Result. Sc. Miss. Stefanini-Paoli Somal. Ital. I: 126 (1916).  
Syntypi: Paoli 41, 68.  
Somalia.
- Solanum boselliae* Chiov., Ann. Bot. (Rome) 9 (1): 83 (1911). (=) ***Solanum glabratum*** Dunal, Hist. nat. Solanum: 240 (1813).  
Syntypi: Pappi 4089, 4176; Ragazzi 1262/87.  
Eritrea.
- Solanum campylacanthum* Hochst. ex A.Rich. var. *subinerme* Boselli, Annuario Reale Ist. Bot. Roma 8 (2): 246 (1904). (=) ***Solanum campylacanthum*** Hochst. ex A.Rich., Tent. Fl. Abyss. 2: 102 (1851).  
Syntypi: Terracciano & Pappi 982, 2091, 2140, 2268; Ragazzi 38.  
Eritrea.
- Solanum chiovendae* Lanza, Miss. Biol. Borana, Racc. Bot. Angiosp.-Gymnosp.: 191, ♦ 192 (1939). (=) ***Solanum tettense*** Klotzsch in Peters var. *renschii* (Vatke) A.E.Gonç., Kirkia 16 (1): 86 (1997).  
Holotypus/Isotypus: Cufodontis 734.  
Ethiopia.
- Typus: Forsskål 414 (C holotypus).  
Ref.: Friis I. in Hedberg I., Ensermu Kelbessa, Edwards S., Sebsebe Demissew & Persson E. 2006. Fl. of Ethiopia and Eritrea 5: 134, ♦ 136.
- Typus: Forsskål 414 (C holotypus).  
Ref.: Friis I. in Hedberg I., Ensermu Kelbessa, Edwards S., Sebsebe Demissew & Persson E. 2006. Fl. of Ethiopia and Eritrea 5: 134, ♦ 136.
- Typus: Forsskål 414 (C holotypus).  
Ref.: Friis I. in Hedberg I., Ensermu Kelbessa, Edwards S., Sebsebe Demissew & Persson E. 2006. Fl. of Ethiopia and Eritrea 5: 134, ♦ 136.
- Typus: Hildebrandt 2735 (B holotypus, destr.; K isotypus).  
Ref.: Friis I. in Hedberg I., Ensermu Kelbessa, Edwards S., Sebsebe Demissew & Persson E. 2006. Fl. of Ethiopia and Eritrea 5: 126, ♦ 127.

- Solanum cicaticosum* Chiov., Fl. Somalia: 238, ♦ t. (=) XXVII, f. 2 (1929).  
Syntypi: Puccioni & Stefanini 420 [472]; 578 [633].  
Somalia.
- Solanum cicaticosum* Chiov. var. *gorinii* Chiov., (=) Agric. Colon. 20 (2): 47 (1926).  
Syntypi: Gorini 71, 88.  
Somalia.
- Solanum cufodontii* Lanza, Miss. Biol. Borana, Racc. (=) Bot. Angiosp.-Gymnosp.: 193, ♦ 194 (1939).  
Holotypus: Cufodontis 51.  
Ethiopia.
- Solanum cymbalariifolium** Chiov., Fl. Somalia: 241, ♦ t. XXVIII, f. 2 (1929), as 'cymbalarifolium'.  
Holotypus: Puccioni & Stefanini 1062 [868 bis].  
Somalia.
- Solanum cynanchoides* Chiov., Fl. Somalia II: 333, ♦ (=) 332 (1932).  
Holotypus: Senni 444.  
Somalia.
- Solanum depressum* Bitter, Repert. Spec. Nov. Regni Veg., Beih. 16: 303 (1923).  
Holotypus: Riva 1147 [496].  
Ethiopia.
- Solanum dubium* Fresen. var. *dolichoplocalyx* Bitter, (=) Repert. Spec. Nov. Regni Veg., Beih. 16: 302 (1923).  
Holotypus: Riva 877 (265).  
Ethiopia.
- Solanum ellenbeckii* Dammer var. *oligoplum* Bitter, (=) Repert. Spec. Nov. Regni Veg., Beih. 16: 305 (1923).  
Holotypus: Riva 1231 (792).  
Somalia/Ethiopia border.
- Solanum goniocalyx* Lanza, Miss. Biol. Borana, Racc. (=) Bot. Angiosp.-Gymnosp.: 195, ♦ 196 (1939).  
Holotypus/Isotypus: Cufodontis 581.  
Ethiopia.
- Solanum grewioides* Lanza, Miss. Biol. Borana, Racc. (=) Bot. Angiosp.-Gymnosp.: 195, ♦ 197 (1939).  
Holotypus/Isotypus: Cufodontis 563.  
Ethiopia.
- Solanum benadirens** Chiov., Result. Sc. Miss. Stefanini-Paoli Somal. Ital. I: 126 (1916).  
Typi: Paoli 41, 68 (FT syntypi).  
Ref.: Friis I. in Thulin M. 2006. Fl. of Somalia 3: 211, ♦ 211.
- Solanum pampaninii** Chiov., Result. Sc. Miss. Stefanini-Paoli Somal. Ital. I: 128 (1916).  
Typi: Paoli 72, 91, 166 (FT syntypi).  
Ref.: Friis I. in Thulin M. 2006. Fl. of Somalia 3: 212, ♦ 211.
- Solanum campylacanthum** Hochst. ex A.Rich., Tent. Fl. Abyss. 2: 102 (1851).  
Typus: Schimper II 1082 (P lectotypus).  
Ref.: Friis I. in Hedberg I., Ensermu Kelbessa, Edwards S., Sebsebe Demissew & Persson E. 2006. Fl. of Ethiopia and Eritrea 5: 140, ♦ 143.
- Solanum hastifolium** Hochst. ex Dunal, Prodr. 13 (1): 284 (1852).  
Typus: Kotschy 393 (G holotypus; K isotypus).  
Ref.: Friis I. in Thulin M. 2006. Fl. of Somalia 3: 214, ♦ 214.
- Solanum coagulans** Forssk., Fl. Aegypt.-Arab. 2: 47 (1775).  
Typi: Forsskål 409, 410, 1744 (C syntypi).  
Ref.: Friis I. in Hedberg I., Ensermu Kelbessa, Edwards S., Sebsebe Demissew & Persson E. 2006. Fl. of Ethiopia and Eritrea 5: 144, ♦ 147.
- Solanum coagulans** Forssk., Fl. Aegypt.-Arab. 2: 47 (1775).  
Typi: Forsskål 409, 410, 1744 (C syntypi).  
Ref.: Friis I. in Hedberg I., Ensermu Kelbessa, Edwards S., Sebsebe Demissew & Persson E. 2006. Fl. of Ethiopia and Eritrea 5: 144, ♦ 147.
- Solanum coagulans** Forssk., Fl. Aegypt.-Arab. 2: 47 (1775).  
Typi: Forsskål 409, 410, 1744 (C syntypi).  
Ref.: Friis I. in Hedberg I., Ensermu Kelbessa, Edwards S., Sebsebe Demissew & Persson E. 2006. Fl. of Ethiopia and Eritrea 5: 144, ♦ 147.
- Solanum campylacanthum** Hochst. ex A.Rich., Tent. Fl. Abyss. 2: 102 (1851).  
Typus: Schimper II 1082 (P lectotypus).  
Ref.: Friis I. in Hedberg I., Ensermu Kelbessa, Edwards S., Sebsebe Demissew & Persson E. 2006. Fl. of Ethiopia and Eritrea 5: 140, ♦ 143.
- Solanum tettense** Klotzsch in Peters var. *renschii* (Vatke) A.E.Gonç., Kirkia 16 (1): 86 (1997).  
Typus: Hildebrandt 2735 (B holotypus, destr.; K isotypus).  
Ref.: Friis I. in Hedberg I., Ensermu Kelbessa, Edwards S., Sebsebe Demissew & Persson E. 2006. Fl. of Ethiopia and Eritrea 5: 126, ♦ 127.

- Solanum indicum* L. subsp. *mesodolichum* Bitter var. *uollensis* Chiov., Malpighia 35: 47 (1939).  
 Holotypus: Gortani II 83.  
 Ethiopia.
- Solanum melongenifolium* Lanza, Miss. Biol. Borana, Racc. Bot. Angiosp.-Gymnosp.: 198, ♦ 199 (1939).  
 Holotypus/Isotypus: Cufodontis 416.  
 Ethiopia.
- Solanum munitum* Bitter var. *javellense* Lanza, Miss. Biol. Borana, Racc. Bot. Angiosp.-Gymnosp.: 200, ♦ 201 (1939).  
 Holotypus/Isotypus: Cufodontis 379.  
 Ethiopia.
- Solanum mummulifolium* Chiov., Fl. Somalia: 240, ♦ t. XXIX (1929).  
 Holotypus: Puccioni & Stefanini 551 [605].  
 Somalia.
- Solanum nigrum* L. f. *glabrum* Chiov., Result. Sc. Miss. Stefanini-Paoli Somal. Ital. I: 128 (1916).  
 Holotypus: Paoli 935.  
 Somalia.
- Solanum obbiadense* Chiov., Fl. Somalia: 239 (1929).  
 Holotypus: Puccioni & Stefanini 1061 [605].  
 Somalia.
- Solanum ogadense* Bitter, Repert. Spec. Nov. Regni Veg. Beih. 16: 143 (1923).  
 Syntypus: Riva 342 (239).  
 Ethiopia.
- Solanum orthocarpum* Pic.Serm., Miss. Stud. Lago Tana, VII, Ricerche Bot. I: 129, ♦ t. XXIV (1951).  
 Holotypus/Isotypus: Pichi Sermolli 2575.  
 Ethiopia.
- (=) *Solanum anguivi* Lam. Tabl. Encycl. 2: 23 (1794).  
 Typus: Commerson s.n. (MPU holotypus; P isotypus).  
 Ref.: Friis I. in Hedberg I., Ensermu Kelbessa, Edwards S., Sebsebe Demissew & Persson E. 2006. Fl. of Ethiopia and Eritrea 5: 129, ♦ 133.
- (=) *Solanum campylacanthum* Hochst. ex A.Rich., Tent. Fl. Abyss. 2: 102 (1851).  
 Typus: Schimper II 1082 (P lectotypus).  
 Ref.: Friis I. in Hedberg I., Ensermu Kelbessa, Edwards S., Sebsebe Demissew & Persson E. 2006. Fl. of Ethiopia and Eritrea 5: 140, ♦ 143.
- (=) *Solanum tettense* Klotzsch in Peters var. *renschii* (Vatke) A.E.Gonç., Kirkia 16 (1): 86 (1997).  
 Typus: Hildebrandt 2735 (B holotypus, destr.; K isotypus).  
 Ref.: Friis I. in Hedberg I., Ensermu Kelbessa, Edwards S., Sebsebe Demissew & Persson E. 2006. Fl. of Ethiopia and Eritrea 5: 126, ♦ 127.
- (=) *Solanum cordatum* Forssk., Fl. Aegypt.-Arab.: 47 (1775).  
 Typus: Forsskål not type specimens found.  
 Neotypus: Wood 2327 (Wood, Kew Bull. 39: 134. 1984).  
 Ref.: Friis I. in Thulin M. 2006. Fl. of Somalia 3: 213.
- (=) *Solanum americanum* Mill., Gard. Dict. ed. 8: Solanum n. 5 (1768).  
 Typus: cultivated in Chelsea Physic Garden, introduced from Virginia, Miller s.n. (BM holotypus).  
 Ref.: Edmonds J.M. in Thulin M. 2006. Fl. of Somalia 3: 207, ♦ 206.
- (=) *Solanum cordatum* Forssk., Fl. Aegypt.-Arab.: 47 (1775).  
 Typus: Forsskål not type specimens found.  
 Neotypus: Wood 2327 (Wood, Kew Bull. 39: 134. 1984).  
 Ref.: Friis I. in Thulin M. 2006. Fl. of Somalia 3: 213.
- (=) *Solanum dennekense* Dammer, Bot. Jahrb. Syst. 38: 57 (1905).  
 Typus: Ellenbeck 1965 (B holotypus, destr.).  
 Ref.: Friis I. in Hedberg I., Ensermu Kelbessa, Edwards S., Sebsebe Demissew & Persson E. 2006. Fl. of Ethiopia and Eritrea 5: 135, ♦ 139.
- (=) *Solanum anguivi* Lam., Tabl. Encycl. 2: 23 (1794).  
 Typus: Commerson s.n. (MPU holotypus; P isotypus).  
 Ref.: Friis I. in Hedberg I., Ensermu Kelbessa, Edwards S., Sebsebe Demissew & Persson E. 2006. Fl. of Ethiopia and Eritrea 5: 129, ♦ 133.

**Solanum pampaninii** Chiov., Result. Sc. Miss. (=)

Stefanini-Paoli Somal. Ital. I: 128 (1916).

Syntypi: Paoli 72, 91, 166.

Somalia.

**Solanum sennii** Chiov., Fl. Somalia II: 334, ♫ 334 (=) (1932).

Holotypus: Senni 220.

Somalia.

**Solanum sepicula** Dunal var. *microlepis* Bitter, (=) Repert. Spec. Nov. Regni Veg. Beih. 16: 71 (1923).

Holotypus: Robecchi-Bricchetti 620.

Somalia.

**Withania mucronata** Chiov., Nuovo Giorn. Bot. Ital. (=) 34: 845 (1927).

Holotypus: Paoli 24.

Somalia.

**Solanum campylacanthum** Hochst. ex A.Rich., Tent. Fl. Abyss. 2: 102 (1851).

Typus: Schimper II 1082 (P lectotypus).

Ref.: Friis I. in Thulin M. 2006. Fl. of Somalia 3: 217, ♫ 217.

**Solanum glabratum** Dunal, Hist. nat. Solanum: 240 (1813).

Typi: Forsskål 411, 429 (C syntypi).

Ref.: Friis I. in Thulin M. 2006. Fl. of Somalia 3: 212, ♫ 214.

**Withania somnifera** (L.) Dunal, Prodr. 13 (1): 453 (1852).

Typus: LINN 247.1 (lectotypus, selected by Schoenbeck-Temesey, 1972).

Ref.: Thulin M. 2006. Fl. of Somalia 3: 203.

## STERCULIACEAE

**Cola sciaphila** Louis ex R.Germ., Bull. Jard. Bot. État 32 (4): 497 (1962).

Isotypus: Louis 14662.

(BR holotypus. Germain, Bull. Jard. Bot. État 32 (4): 497. 1962).

The Democratic Republic of the Congo.

**Dombeya gallana** K.Schum. & Engl. var. *floribunda* (=) Fiori, Nuovo Giorn. Bot. Ital. 47: 34 (1940).

Holotypus: Saccardo s.n.

Ethiopia.

**Dombeya aethiopica** Gilli, Ann. Naturhist. Mus. Wien, 74: 447, ♫ t. 7, f. 1 (1971).

Typus: Gillett 14458 (W holotypus; EA, K isotypi).

Ref.: Vollesen K. in Edwards S., Mesfin Tadesse & Hedberg I. 1995. Fl. of Ethiopia and Eritrea 2 (2): 168, ♫ 169.

**Dombeya stipulosa** Chiov., Atti Reale Accad. Italia, (=) Mem. Cl. Sci. Fis., Ser. 7, 11 (2): 21 (1940).

Holotypus/Isotypus: Giordano 2471.

Ethiopia.

**Dombeya torrida** (J.F.Gmel.) Bamps, Bull. Jard. Bot. État 32: 170 (1962).

Typus: plate 20 in Bruce, Voy. Meroe (1790).

Ref.: Vollesen K. in Edwards S., Mesfin Tadesse & Hedberg I. 1995. Fl. of Ethiopia and Eritrea 2 (2): 168, ♫ 169.

**Dombeya gilletti** Gilli, Ann. Naturhist. Mus. Wien, 74: 448, ♫ t. 6, f. 2 (1971).

Isotypus: Gillett 13103.

(W holotypus. Gilli, Ann. Naturhist. Mus. Wien, 74: 448. 1971).

Kenya.

**Harmsia sidoides** K.Schum., Annuario Reale Ist. Bot. Roma 7 (1): 35 (1897).

Syntypi: Riva 447, 451, 1538.

Ethiopia.

- Hermannia erythraeae* Chiov., Ann. Bot. (Rome) 9 (2): 151 (1911).  
 Syntypi: Terracciano 23, 307; Terracciano & Pappi 12.  
 Eritrea.
- (=) *Hermannia boranensis* K.Schum., Bot. Jahrb. Syst. 33: 311 (1903).  
 Typus Ellenbeck 2153 (B holotypus, destr.).  
 Ref.: Vollesen K. in Edwards S., Mesfin Tadesse & Hedberg I. 1995. Fl. of Ethiopia and Eritrea 2 (2): 180.
- Melhania b  guinotii** Cufod., Miss. Biol. Borana, Racc. Bot. Angiosp.-Gymnosp.: 134,    135 (1939).  
 Holotypus: Cufodontis 226.  
 Ethiopia.
- Melhania coriacea** Chiov., Fl. Somalia: 104,    t. VI, f. 1 (1929).  
 Holotypus: Puccioni & Stefanini 445 [497].  
 Somalia.
- Melhania denhamii* R.Br. var. *benadirensis* Chiov., Fl. Somalia: 103 (1929).  
 Holotypus: Puccioni & Stefanini 174 [196].  
 Somalia.
- Melhania denhamii* R.Br. var. *grandibracteata* K.Schum., Annuario Reale Ist. Bot. Roma 7 (1): 34 (1897).  
 Syntypi: Robecchi-Bricchetti 440, 441.  
 Ethiopia.
- Melhania fiorii* Chiov., Ann. Bot. (Rome) 10 (3): 383 (1912).  
 Syntypi: Pappi 7955, 8022, 8119.  
 Eritrea.
- (=) **Melhania denhamii** R.Br., Narr. Travels Africa: 232 (1826).  
 Typus: ?  
 Ref.: Thulin M. 1999. Fl. of Somalia 2: 27,    25.
- Melhania phillipsiae** Baker f., J. Bot. 36: 4 (1898).  
 Typus: Lort Phillips s.n. (BM, K syntypus).  
 Ref.: Thulin M. 1999. Fl. of Somalia 2: 27.
- Melhania fiorii* Chiov., Ann. Bot. (Rome) 10 (3): 383 (1912).  
 Syntypi: Pappi 7955, 8022, 8119.  
 Eritrea.
- (=) **Melhania phillipsiae** Baker f., J. Bot. 36: 4 (1898).  
 Typus: Lort Phillips s.n. (BM, K syntypus)  
 Ref.: Vollesen K. in Edwards S., Mesfin Tadesse & Hedberg I. 1995. Fl. of Ethiopia and Eritrea 2 (2): 176,    173.
- Melhania parviflora** Chiov., Fl. Somalia II: 31 (1932).  
 Syntypi: Gorini 486, 495.  
 Somalia.
- Melhania parvifolia* Chiov., Fl. Somalia: 103 (1929).  
 Lectotypus: Puccioni & Stefanini 531 [583].  
 Somalia.  
 The exsiccatum Puccioni & Stefanini 563 [619] (pro syntype) of 'Melhania parvifolia' Chiov.' must be referred to 'Melhania denhamii' R.Br.' (Fide Thulin, Fl. of Somalia 2: 29. 1999).
- Melhania quercifolia** Thulin, Nordic J. Bot. 19 (2): 196,    197 (2000).  
 Isotypus: Thulin, Hedr  n & Adbi Dahir 7285.  
 (UPS holotypus. Thulin, Nordic J. Bot. 19 (2): 196. 2000).  
 Somalia.
- Melhania zavattarii** Cufod., Miss. Biol. Borana, Racc. Bot. Angiosp.-Gymnosp.: 136,    137 (1939).  
 Holotypus: Cufodontis 248.  
 Ethiopia.
- Sterculia triphaca* R.Br. var. *rivaei* K.Schum., Monogr. Afrik. Pflanzen-Fam. 5: 106 (1900).  
 Holotypus?: Riva 1597.  
 Ethiopia.
- (=) **Sterculia rhynchocarpa** K.Schum., Bot. Jahrb. Syst. 34: 323 (1904).  
 Typi: Engler 1523, 1569.  
 Ref.: Vollesen K. in Edwards S., Mesfin Tadesse & Hedberg I. 1995. Fl. of Ethiopia and Eritrea 2 (2): 184,    185.

- Sterculia triphaca* R.Br. var. *schumannii* Chiov., Fl. (=) Somala II: 31 (1932).  
 Syntypi: Scassellati 10; Senni 157.  
 Somalia.
- Sterculia rhynchocarpa* K.Schum., Bot. Jahrb. Syst. 34: 323 (1904).  
 Typi: Engler 1523, 1569.  
 Ref.: Vollesen K. in Edwards S., Mesfin Tadesse & Hedberg I. 1995. Fl. of Ethiopia and Eritrea 2 (2): 184, ♀ 185.  
 Link: *Sterculia africana* (Lour.) Fiori var. *rivae* (K.Schum.) Cufod., Cufodontis, Bull. Jard. Bot. État 29 (1) Suppl.: 584 (1959).

## TAMARICACEAE

- Tamarix scebelensis* Chiov., Fl. Somala: 93, ♀ t. (=) XLVI, f. 3 (1929).  
 Holotypus: Puccioni & Stefanini 178 [202].  
 Somalia.
- Tamarix nilotica* (Ehrenb.) Bunge, Tent. gen. Tamar.: 54 (1852).  
 Typus: Ehrenberg (K? isotypus).  
 Ref.: Mesfin Tadesse in Thulin M. 1993. Fl. of Somalia 1: 209, ♀ 209.

## THYMELAEACEAE

- Gnidia denudata* Gilg, Annuario Reale Ist. Bot. Roma 6 (2): 97 (1896), non Lindl. (1823).  
 Holotypus: Riva 1305.  
 Ethiopia.
- Gnidia stenophylla* Gilg, Bot. Jahrb. Syst. 19 (2): 259 (1894).  
 Typus: Holst 8963 (B holotypus, destr.; K lectotypus).  
 Ref.: Peterson B. in Edwards S., Mesfin Tadesse, Sebsebe Demissew & Hedberg I. 2000. Fl. of Ethiopia and Eritrea 2 (1): 429, ♀ 430.
- Gnidia heterophylla* Gilg, Annuario Reale Ist. Bot. Roma 6 (2): 98 (1896).  
 Lectotypus: Riva 656 (Gastaldo, Webbia 24: 350. 1969).  
 Syntypus: Riva 99.  
 Ethiopia.
- Gnidia involucrata* Steud. ex A.Rich., Tent. Fl. Abyss. 2: 234 (1850).  
 Typus: Schimper 770 (P lectotypus); Quartin Dillon & Petit (P syntypus).  
 Ref.: Peterson B. in Edwards S., Mesfin Tadesse, Sebsebe Demissew & Hedberg I. 2000. Fl. of Ethiopia and Eritrea 2 (1): 430, ♀ 430.
- Gnidia rivae* Gilg, Annuario Reale Ist. Bot. Roma 6 (2): 98 (1896).  
 Lectotypus: Riva 189 (Gastaldo, Webbia 24: 367. 1969).  
 Syntypus: Riva 1239.  
 Ethiopia.
- Gnidia stenophylloides* Gilg, Annuario Reale Ist. Bot. Roma 6 (2): 97 (1896).  
 Holotypus: Riva 187.  
 Ethiopia.
- Gnidia glauca* (Fresen.) Gilg, Nat. Pflanzenfam. 3 (6a): 227 (1894).  
 Typus: Rueppel s.n. (FR holotypus).  
 Ref.: Peterson B. in Edwards S., Mesfin Tadesse, Sebsebe Demissew & Hedberg I. 2000. Fl. of Ethiopia and Eritrea 2 (1): 433, ♀ 433.
- Gnidia stenophylla* Gilg, Bot. Jahrb. Syst. 19 (2): 259 (1894).  
 Typus: Holst 8963 (B holotypus, destr.; K lectotypus).  
 Ref.: Peterson B. in Edwards S., Mesfin Tadesse, Sebsebe Demissew & Hedberg I. 2000. Fl. of Ethiopia and Eritrea 2 (1): 429, ♀ 430.
- Gnidia violacea* Gilg, Annuario Reale Ist. Bot. Roma 6 (2): 98 (1896).  
 Holotypus: Riva 345.  
 Somalia.
- Gnidia somalensis* (Franch.) Gilg var. *somalensis*, Annuario Reale Ist. Bot. Roma 6 (2): 98 (1896).  
 Typus: Révoil s.n. (P holotypus).  
 Ref.: Cuccini P. in Thulin M. 1993. Fl. of Somalia 1: 202, ♀ 201.

*Lasiosiphon somalensis* (Franch.) H.Pearson var. *glabrus* H.Pearson, in Thiselton-Dyers W.T., Fl. Trop. Afr. 6 (2): 229 (1910).

Holotypus: Robecchi-Bricchetti 85.  
Somalia.

(=) *Gnidia somalensis* (Franch.) Gilg var. *glabra* (H.Pearson) Cufod., Bot. État 29, Suppl.: 605 (1959).

Ref.: Cuccuini P. in Thulin M. 1993. Fl. of Somalia 1: 202.

## TILIACEAE

*Corchorus bricchettii* Weim., Svensk Bot. Tidskr. 30 (3): 478, ♂ 475 (1936).

Holotypus: Robecchi-Bricchetti 403.  
Somalia.

*Corchorus cinerascens* Deflers, Bull. Soc. Bot. France 42: 300 (1895).

Typi: Deflers 376, 483, 843 (MPU, P syntypi?).  
Ref.: Sebsebe Demissew in Thulin M. 1999. Fl. of Somalia 2: 15, ♂ 17.

*Corchorus erinoceus* Weim., Svensk Bot. Tidskr. 30 (3): 481, ♂ 475 (1936).

Holotypus: Puccioni & Stefanini 822 [908].  
Somalia.

*Corchorus cinerascens* Deflers, Bull. Soc. Bot. France 42: 300 (1895).

Typi: Deflers 376, 483, 843 (MPU, P syntypi?).  
Ref.: Sebsebe Demissew in Thulin M. 1999. Fl. of Somalia 2: 15, ♂ 17.

*Corchorus hirsutus* L. var. *stenophyllus* K.Schum., Annuario Reale Ist. Bot. Roma 7 (1): 32 (1897).

Isotypus: Robecchi-Bricchetti 405.  
(B holotypus, destr. Sebsebe Demissew, Fl. of Somalia 2: 15. 1999).  
Somalia.

*Corchorus cinerascens* Deflers, Bull. Soc. Bot. France 42: 300 (1895).

Typi: Deflers 376, 483, 843 (MPU, P syntypi?).  
Ref.: Sebsebe Demissew in Thulin M. 1999. Fl. of Somalia 2: 15, ♂ 17.

*Corchorus somalicus* Gand., Bull. Soc. Bot. France 69: 348 (1922).

Holotypus/Isotypus: Fiori 45.  
Somalia.

*Corchorus trilocularis* L., Syst. nat., ed. 12, 2: 369 (1767).

Typus: LINN 691.2 (LINN lectotypus).  
Ref.: Sebsebe Demissew in Thulin M. 1999. Fl. of Somalia 2: 18, ♂ 17.

*Grewia beguinotii* Lanza, Miss. Biol. Borana, Racc. Bot. Angiosp.-Gymnosp.: 119, ♂ 120 (1939).

Holotypus/Isotypus: Cufodontis 260.  
Ethiopia.

*Grewia ferruginea* Hochst. ex A.Rich., Tent. Fl. Abyss. 1: 87 (1847).

Typi: Quartin-Dillon (P syntypus); Schimper I 183, II 215, II 967 (P syntypi; BM, K isosyntypi).  
Ref.: Sebsebe Demissew in Edwards S., Mesfin Tadesse & Hedberg I. 1995. Fl. of Ethiopia and Eritrea 2 (2): 150, ♂ 151.

*Grewia ehretioides* Chiov., Fl. Somala II: 33, ♂ 34 (1932).

Holotypus: Senni 478.  
Somalia.

*Grewia obovata* K.Schum., in Engl., Pflanzenw. Ost-Afrikas C: 263 (1895).

Typus: Holst 2941 (B holotypus, destr.; K isotypus).  
Ref.: Sebsebe Demissew in Thulin M. 1999. Fl. of Somalia 2: 10.

*Grewia gilletii* Sebsebe & B.Mathew, Kew Bull. 45 (2): 323, ♂ 324 (1990).

Isotypus: Gillett 4320.  
(K holotypus. Sebsebe Demissew & Mathew, Kew Bull. 45 (2): 323. 1990).  
Somalia.

*Grewia forbesii* Harv. ex Mast., in Oliver D., Fl. Trop. Afr. 1: 250 (1868).

Typi: Forbes s.n., Meller s.n., Kirk s.n. (K syntypi).  
Ref.: Sebsebe Demissew in Thulin M. 1999. Fl. of Somalia 2: 9.

*Grewia lagenophora* Chiov., Fl. Somala II: 39 (1932).  
Holotypus: Gorini 369.

Somalia.

*Grewia forbesii* Harv. ex Mast., in Oliver D., Fl. Trop. Afr. 1: 250 (1868).

Typi: Forbes s.n., Meller s.n., Kirk s.n. (K syntypi).  
Ref.: Sebsebe Demissew in Thulin M. 1999. Fl. of Somalia 2: 9.

- Grewia micrantha** Bojer var. *concolor* Chiov., Fl. (Somala II: 33 (1932).  
 Syntypi: Senni 52, 69, 257.  
 Somalia.
- Grewia densa** K.Schum., Bot. Jahrb. Syst. 15: 122 (1892).  
 Typus: Hildebrandt 1997 (B holotypus, destr.; K isotypus).  
 Ref.: Sebsebe Demissew in Thulin M. 1999. Fl. of Somalia 2: 6.
- Grewia ogadenensis** Sebsebe, Kew Bull. 43 (3): 531, ♦ 532 (1988).  
 Isotypus: Hemming 378.  
 (K holotypus. Sebsebe Demissew, Kew Bull. 43 (3): 531. 1988).  
 Ethiopia.
- Grewia pannosipala** Chiov., Fl. Somala II: 36 (1932).  
 Syntypi: Senni 869; Gorini 372.  
 Somalia.
- Grewia penicillata** Chiov., Fl. Somala II: 39 (1932).  
 Holotypus: Senni 782.  
 Somalia.
- Grewia cerasifera** (Chiov.) Thulin, Kew Bull. 54 (4): 1007 (1999).  
 Ref.: Sebsebe Demissew in Thulin M. 1999. Fl. of Somalia 2: 10, ♦ t. 1 B.
- Microcos cerasifera** Chiov., Fl. Somala: 107, ♦ t. V, f. 1 (1929).  
 Holotypus: Puccioni & Stefanini 423 [474].  
 Somalia.  
 The plate in the protologue bears the caption '*Grewia cerasifera* Chiov.'
- Rumicicarpus ramosissimus** Chiov., Fl. Somala: 106, (Somala: 107, ♦ t. IV, f. 1 (1929).  
 Holotypus: Puccioni & Stefanini 250 [278].  
 Somalia.
- Triumfetta trigona** Sprague & Hutch., J. Linn. Soc., Bot. 39: 263 (1909).  
 Typi: Cole s.n.; Lort Phillips s.n., Lort Phillips s.n. 'Wagga Mt' (K syntypi).  
 Ref.: Sebsebe Demissew in Thulin M. 1999. Fl. of Somalia 2: 20.
- Sparrmannia abyssinica** Hochst. ex A.Rich. var. *concolor* Chiov., Ann. Bot. (Rome) 9 (1): 52 (1911).  
 Syntypi: Chiovenda 2886, 3009.  
 Ethiopia.
- Sparrmannia ricinocarpa** (Eckl. & Zeyh.) Kuntze var. *ricinocarpa*, Revis. gen. pl. 3 (2): 26 (1898).  
 Typus: Ecklon & Zeyher s.n. (MEL, Herb. Sonder, holotypus).  
 Ref.: Verdcourt B. in Beentje H.J. & Smith S.A.L. 2001. Fl. Trop. East Afr., Tiliaceae & Muntingiaceae: 94, ♦ 95.
- Triumfetta arussorum** Chiov., Ann. Bot. (Rome) 9 (3): 317 (1911).  
 Holotypus: Negri 1215.  
 Ethiopia.
- Triumfetta heterocarpa** Sprague & Hutch., J. Linn. Soc., Bot. 39: 265 (1909).  
 Typus: Ellenbeck 1099b (K lectotypus).  
 Vollesen K. in Edwards S., Mesfin Tadesse & Hedberg I. 1995. Fl. of Ethiopia and Eritrea 2 (2): 164.
- Triumfetta dembianensis** Chiov., Ann. Bot. (Rome) 9 (1): 53 (1911).  
 Holotypus: Chiovenda 2108.  
 Ethiopia.
- Triumfetta rhomboidea** Jacq., Select. stirp. amer. hist.: 147, ♦ t. 90 (1763).  
 Typus: Martinique, t. 90 in Jacq., Select. stirp. amer. hist. (1763).  
 Ref.: Vollesen K. in Edwards S., Mesfin Tadesse & Hedberg I. 1995. Fl. of Ethiopia and Eritrea 2 (2): 162, ♦ 163.

- Triumfetta flavescens* Hochst. ex A.Rich. var. *benadiriana* Fiori, Bull. Soc. Bot. Ital. 1913: 45 (1913).  
 Holotypus: Fiori 39.  
 Somalia.  
 The specimen 'Fiori 39' has been published by Gandoger (Bull. Soc. Bot. France 69: 348. 1922) as the holotype of '*Triumfetta fioriana*'.
- Triumfetta heterocarpa* Sprague & Hutch. var. *glabrior* Sprague & Hutch., J. Linn. Soc., Bot. 39: 265 (1909).  
 Syntypus: Robecchi Bricchetti 591.  
 Ethiopia.
- Triumfetta negelliensis* Lanza, Miss. Biol. Borana, Racc. Bot. Angiosp.-Gymnosp.: 124, ♫ 125 (1939).  
 Syntypi: Cufodontis 40, 214.  
 Ethiopia.
- Triumfetta negelliensis* Lanza var. *obtusifolia* Lanza, Miss. Biol. Borana, Racc. Bot. Angiosp.-Gymnosp.: 126, ♫ 127 (1939).  
 Holotypus/Isotypus: Cufodontis 325.  
 Ethiopia.
- Triumfetta pentandra** A.Rich. var. **homaiotricha** Chiov., Agric. Colon. 20: 44 (1926).  
 Holotypus: Gorini 29.  
 Somalia.
- Triumfetta pilosa* Roth var. *lejocarpa* Fiori, Nuovo Giorn. Bot. Ital. 47 (1): 33 (1940).  
 Holotypus: Saccardo 30.  
 Ethiopia.
- Triumfetta tomentosa* Bojer var. *macrocerata* Chiov., Malpighia 34: 490 (1937).  
 Holotypus: Taschdjian 232.  
 Ethiopia.
- (=) **Triumfetta flavescens** Hochst. ex A.Rich., Tent. Fl. Abyss. 1: 82 (1847).  
 Typi: Schimper II 1020, III 1442, III 1794 (P syntypi; K isosyntypi).  
 Ref.: Sebsebe Demissew in Thulin M. 1999. Fl. of Somalia 2: 19, ♫ 20.
- (=) **Triumfetta glabrior** (Sprague & Hutch.) Cheek, Fl. Trop. East Afr., Tiliaceae & Muntingiaceae: 82 (2001).  
 Typus: Ellenbeck 406 (K lectotypus).  
 Ref.: Cheek M. in Beentje H.J. & Smith S.A.L. 2001. Fl. Trop. East Afr., Tiliaceae & Muntingiaceae: 82.
- (=) **Triumfetta flavescens** Hochst. ex A.Rich., Tent. Fl. Abyss. 1: 82 (1847).  
 Typi: Schimper II 1020; III 1442, III 1794 (P syntypi; K isosyntypi).  
 Ref.: Vollesen K. in Edwards S., Mesfin Tadesse & Hedberg I. 1995. Fl. of Ethiopia and Eritrea 2 (2): 164.
- (=) **Triumfetta flavescens** Hochst. ex A.Rich., Tent. Fl. Abyss. 1: 82 (1847).  
 Typi: Schimper II 1020; III 1442, III 1794 (P syntypi; K isosyntypi).  
 Ref.: Vollesen K. in Edwards S., Mesfin Tadesse & Hedberg I. 1995. Fl. of Ethiopia and Eritrea 2 (2): 164.
- (=) **Triumfetta brachyceras** K.Schum., Bot. Jahrb. Syst. 28: 432 (1900).  
 Typus: Goetze 589 (B holotypus).  
 Ref.: Vollesen K. in Edwards S., Mesfin Tadesse & Hedberg I. 1995. Fl. of Ethiopia and Eritrea 2 (2): 161, ♫ 163.
- (=) **Triumfetta tomentosa** Bojer, Hort. Maurit.: 43 (1837), nom.nud.; in Bouton, Douzième Rapp. Ann. Maur.: 19 (1842).  
 Typus: Bojer (K holotypus).  
 Ref.: Vollesen K. in Edwards S., Mesfin Tadesse & Hedberg I. 1995. Fl. of Ethiopia and Eritrea 2 (2): 161, ♫ 163.

## TURNERACEAE

**Loewia glutinosa** Urb., Annuario Reale Ist. Bot. Roma 6 (3): 189 (1897).

Lectotypus: Robecchi-Bricchetti 35 (Roti Michelozzi, Webbia 23: 366. 1969).

Syntypus: Robecchi-Bricchetti 36.  
Somalia.

*Loewia glutinosa* Urb. var. *glabra* Roti Mich., Webbia (=) 23: 371, ♦ 373 (1969).

Holotypus: Senni 542.  
Somalia.

*Loewia glutinosa* Urb. var. *microphylla* Chiov., Fl. Somalia: 175 (1929).

Holotypus: Puccioni & Stefanini 715 [792].  
Somalia.

*Streptopetalum serratum* Hochst. var. *angustifolium* (=) Pirotta, Annuario Reale Ist. Bot. Roma 8 (2): 260 (1904).

Syntypi: Tellini 907; Terracciano 30.  
Eritrea.

*Streptopetalum serratum* Hochst. var. *latifolium* (=) Pirotta, Annuario Reale Ist. Bot. Roma 8 (2): 259 (1904).

Syntypi: Tellini 204, 210; Terracciano 18;  
Terracciano & Pappi 138.  
Eritrea.

**Tricliceras xylorhizum** Verdc., Kew Bull. 45 (2): 277, ♦ 278 (1990).

Isotypus: Greenway & Kanuri 12754.  
(K holotypus. Verdcourt, Kew Bull. 45 (2): 277.  
1990).

Kenya.

**Loewia glutinosa** Urb., Annuario Reale Ist. Bot. Roma 6 (3): 189 (1897).

Typus: Robecchi-Bricchetti 35 (FT lectotypus).  
Ref.: Thulin M. 1993. Fl. of Somalia 1: 34.

**Loewia glutinosa** Urb., Annuario Reale Ist. Bot. Roma 6 (3): 189 (1897).

Typus: Robecchi-Bricchetti 35 (FT lectotypus).  
Ref.: Thulin M. 1993. Fl. of Somalia 1: 34.

**Streptopetalum serratum** Hochst., Flora 24: 666 (1841).

Typus: Schimper 1260 (P lectotypus).  
Ref.: Gilbert M.G. in Edwards S., Mesfin Tadesse, Sebsebe Demissew & Hedberg I. 2000. Fl. of Ethiopia 2 (1): 71, ♦ 71.

**Streptopetalum serratum** Hochst., Flora 24: 666 (1841).

Typus: Schimper 1260 (P lectotypus).  
Ref.: Gilbert M.G. in Edwards S., Mesfin Tadesse, Sebsebe Demissew & Hedberg I. 2000. Fl. of Ethiopia 2 (1): 71, ♦ 71.

## UMBELLIFERAE (APIACEAE)

**Angoseseli mazzocchii-alemannii** Chiov., Bull. Soc. Bot. Ital. 1924: 38 (1924).

Holotypus/Isotypus: Mazzocchi-Alemani 219.  
Angola.

**Carum piovani** Chiov., Atti Reale Accad. Italia, Mem. Cl. Sci. Fis., Ser. 7: 11 (2): 32 (1940).

Syntypi: Piovano 174; Senni 1467.  
Ethiopia.

**Gymnosciadium pusillum** Pic.Serm., Miss. Stud. Lago Tana, VII, Ricerche Bot. I: 212, ♦ t. XLV (1951).

Holotypus: Pichi-Sermolli 2738.  
Ethiopia.

**Angoseseli mossamedensis** (Welw. ex Hiern) C.Norman, J. Bot. 72: 206 (1934).

Typus: Welwitsch 2500 (BM holotypus).  
Ref.: Cannon J.F.M. in Exell A.W., Fernandes A. & Mendes E.J. 1970. Conspectus Flora Angolensis 4: 344.

**Pimpinella pimpinelloides** (Hochst.) H.Wolff, Pflanzenr. 90 (IV 228): 310 (1927).

Typus: Schimper 1143 (BM, C, K, P isotypi).  
Ref.: Hedberg I. & Hedberg O. in Hedberg I., Edwards S. & Sileshi Nemomissa 2003. Fl. of Ethiopia and Eritrea 4 (1): 28.

- Malabaila rivaе Engl.*, Annuario Reale Ist. Bot. Roma 7 (1): 24 (1897).  
 Holotypus: Riva 1224.  
 Ethiopia.  
 In the protologue there is 'Riva 1229' instead of 'Riva 1224'.
- Peucedanum aberdaricum* Chiov., Racc. Miss. Consolata Kenya: 49 (1935).  
 Holotypus: Balbo 563\*.  
 Kenya.
- Peucedanum multivittatum* Cufod., Miss. Biol. Borana, Racc. Bot. Angiosp.-Gymnosp.: 151, ♦ 152 (1939), non Maxim. (1887), nom. illeg.  
 Holotypus: Cufodontis 457.  
 Ethiopia.
- Peucedanum ruspolii* Engl., Annuario Reale Ist. Bot. Roma 7 (1): 23 (1897).  
 Holotypus: Riva 407.  
 Ethiopia.  
 In Fl. of Ethiopia and Eritrea 4 (1): 44 instead of 'Riva 407' there is 'Riva 402'.
- Pimpinella erythraeae** Armari, Annuario Reale Ist. Bot. Roma 8 (2): 149 (1904).  
 Holotypus: Pappi 3016.  
 Eritrea.
- Pimpinella peregrina* L. f. *decalvata* Fiori, Nuovo Giorn. Bot. Ital., n.s., 20: 358 (1913).  
 Holotypus: Fiori 1452.  
 Eritrea.
- Pimpinella rivaе Engl.*, Annuario Reale Ist. Bot. Roma 7 (1): 22 (1897).  
 Holotypus: Riva 1237.  
 Ethiopia.
- Pimpinella tenuissima* C.Norman, J. Linn. Soc., Bot. 47: 591 (1927).  
 Typus: Schweinfurth & Riva 569.  
 Eritrea.
- Stephanorossa palustris* Chiov., Ann. Bot. (Rome) 9 (1): 65 (1911).  
 Syntypi: Chiovenda 981, 2375.  
 Ethiopia.
- (=) **Heracleum abyssinicum** (Boiss.) C.Norman, J. Bot. 74: 171 (1936).  
 Typus: Schimper I: 204 (G holotypus; K isotypus).  
 Ref.: Hedberg I. & Hedberg O. in Hedberg I., Edwards S. & Sileshi Nemomissa 2003. Fl. of Ethiopia and Eritrea 4 (1): 45, ♦ 44.
- (=) **Peucedanum linderi** C.Norman, J. Linn. Soc., Bot. 49: 511 (1934).  
 Typus: Linder 2080 (K holotypus).  
 Ref.: Townsend C.C. in Polhill R.M. 1989. Fl. Trop. East Afr., Umbelliferae: 105.
- (=) **Peucedanum harmsianum** H.Wolff, Notizbl. Bot. Gart. Berlin-Dahlem 9: 1121 (1927).  
 Typus: R.E. & T.C.E. Fries 1031 (UPS lectotypus).  
 Ref.: Hedberg I. & Hedberg O. in Hedberg I., Edwards S. & Sileshi Nemomissa 2003. Fl. of Ethiopia and Eritrea 4 (1): 40, ♦ 41.
- (=) **Erythroselinum atropurpureum** (Hochst. ex A.Rich.) Chiov., Ann. Bot. (Rome) 9 (1): 64 (1911).  
 Typus: Schimper II 788 (K holotypus).  
 Ref.: Hedberg I. & Hedberg O. in Hedberg I., Edwards S. & Sileshi Nemomissa 2003. Fl. of Ethiopia and Eritrea 4 (1): 44, ♦ 43.
- (=) **Pimpinella hirtella** (Hochst.) A.Rich., Tent. Fl. Abyss. 1: 323 (1847).  
 Typi: Quartin-Dillon s.n.; Schimper 355.  
 Ref.: Abebe D. 1992. Bot. J. Linn. Soc. 110 (4): 368.
- (=) **Pimpinella hirtella** (Hochst.) A.Rich., Tent. Fl. Abyss. 1: 323 (1847).  
 Typi: Quartin-Dillon s.n.; Schimper 355.  
 Ref.: Hedberg I. & Hedberg O. in Hedberg I., Edwards S. & Sileshi Nemomissa 2003. Fl. of Ethiopia and Eritrea 4 (1): 28.
- (=) **Pimpinella erythraeae** Armari, Annuario Reale Ist. Bot. Roma 8 (2): 149 (1904).  
 Typus: Pappi 3016 (FT holotypus).  
 Ref.: Hedberg I. & Hedberg O. in Hedberg I., Edwards S. & Sileshi Nemomissa 2003. Fl. of Ethiopia and Eritrea 4 (1): 28.
- (=) **Oenanthe palustris** (Chiov.) C.Norman, J. Bot. 71: 135 (1933).  
 Ref.: Hedberg I. & Hedberg O. in Hedberg I., Edwards S. & Sileshi Nemomissa 2003. Fl. of Ethiopia and Eritrea 4 (1): 31, ♦ 33.

**Trachyspermum aethusifolium** Chiov., Fl. Somalia

II: 229, ♫ 229 (1932).

Syntypi: Gorini 407, 408, 409.  
Somalia.

*Trachyspermum copticum* (L.) Link var. *maritimum* (=) Chiov., Fl. Somalia: 188 (1929).

Holotypus: Puccioni & Stefanini 73 [72].  
Somalia.

**Trachyspermum pimpinelloides** (Balf.f.) H.Wolff, Pflanzenr. 90 (IV 228): 91 (1927).

Typus: Balfour 367 (K holotypus).  
Ref.: Thulin M. 1999. Fl. of Somalia 2: 277, ♫ 278.

## VERBENACEAE

**Chascanum gilletii** Moldenke, Rev. Sudam. Bot. 6:

18 (1939).

Isotypus: Gillett 4934.  
(S holotypus. Thulin, Fl. of Somalia 3: 359.  
2006).  
Somalia.

**Chascanum mixtum** Thulin, Nordic J. Bot. 23 (5): 514, ♫ 515 (2005).

Isotypus: Gillett 3992.  
(K holotypus. Thulin, Nordic J. Bot. 23 (5): 514.  
2005).  
Somalia.

*Clerodendrum eburneum* Chiov., Webbia 8 (1): 238 (=) (1951).

Holotypus: Corradi 8414.  
Somalia.  
In the protologue the date is '19 ottobre 1939'  
instead of '19 aprile 1939'.

**Clerodendrum robecchii** Chiov., Bull. Soc. Bot. Ital. 1917: 53 (1917).

Typus: Robecchi-Bricchetti 568, 638; Riva 1046  
(FT syntypi).  
Ref.: Thulin M. 2006. Fl. of Somalia 3: 314, ♫ 314.

*Clerodendrum incisum* Klotzsch var. *vinosum* (=) Chiov., Fl. Somalia II: 364, ♫ 364 (1932).

Holotypus: Senni 541.  
Somalia.

**Rothea incisa** (Klotzsch) Steane & Mabb., Novon 8 (2): 205 (1998).

Typus: Peters s.n. (B syntypi, destr.).  
Ref.: Thulin M. 2006. Fl. of Somalia 3: 316, ♫ 315.

*Clerodendrum morigono* Chiov., Racc. Bot. Miss. (=) Consolata Kenya: 98 (1935).

Syntypus: Balbo 182\*.  
Kenya.  
The syntype 'Balbo 851' is lacking in FT.

**Clerodendrum johnstonii** Oliv., Trans. Linn. Soc., ser. II, 2: 346 (1887).

Typus: Johnston (K holotypus; BM isotypus).  
Ref.: Verdcourt B. in Polhill R.M. 1992. Fl. Trop. East Afr., Verbenaceae: 118, ♫ 114.

*Clerodendrum myricoides* (Hochst.) Vatke var. *grosseserratum* Gürke, Bot. Jahrb. Syst. 28: 299 (1900).

Syntypi: Schimper 451; Ruspoli & Riva 1258.  
Ethiopia.

**Clerodendrum myricoides** (Hochst.) Vatke, Linnaea 43: 535 (1882).

Typus: Schimper 330 (? TUB holotypus; BM, K isotypus).  
Ref.: Persson E. in Hedberg I., Ensermu Kelbessa, Edwards S., Sebsebe Demissew & Persson E. 2006. Fl. of Ethiopia and Eritrea 5: 525, ♫ 525.

*Clerodendrum myricoides* (Hochst.) Vatke var. *microphyllum* Gürke, Bot. Jahrb. Syst. 28: 299 (1900).

Lectotypus: Beccari 296 (Persson, Fl. of Ethiopia and Eritrea 5: 525. 2006).

Syntypus: Beccari 76.  
Ethiopia.

**Clerodendrum myricoides** (Hochst.) Vatke, Linnaea 43: 535 (1882).

Typus: Schimper 330 (? TUB holotypus; BM, K isotypus).

Ref.: Persson E. in Hedberg I., Ensermu Kelbessa, Edwards S., Sebsebe Demissew & Persson E. 2006. Fl. of Ethiopia and Eritrea 5: 525, ♫ 525.

- Clerodendrum myricoides* (Hochst.) Vatke var. *umbrosum* Fiori, Boschi e piante legn. Eritr.: : 324 (1912).  
 Holotypus: Fiori 596.  
 Eritrea.
- (=) ***Clerodendrum myricoides*** (Hochst.) Vatke, Linnaea 43: 535 (1882).  
 Typus: Schimper 330 (? TUB holotypus; BM, K isotypus).  
 Ref.: Persson E. in Hedberg I., Ensermu Kelbessa, Edwards S., Sebsebe Demissew & Persson E. 2006. Fl. of Ethiopia and Eritrea 5: 525, ♦ 525.
- Clerodendrum robecchii*** Chiov., Bull. Soc. Bot. Ital. 1917: 53 (1917).  
 Syntypi: Robecchi-Bricchetti 568, 638; Riva 1046.  
 Ethiopia.
- Clerodendrum robecchii* Chiov. var. *macrophyllum* Chiov., Bull. Soc. Bot. Ital. 1917: 54 (1917).  
 Syntypi: Robecchi-Bricchetti 558, 572, 608, 637.  
 Ethiopia and Somalia.
- Clerodendrum somalense* Chiov., Agric. Colon. 20 (3): 103 (1926).  
 Holotypus/Isotypus: Gorini 70.  
 Somalia.
- (=) ***Clerodendrum robecchii*** Chiov., Bull. Soc. Bot. Ital. 1917: 53 (1917).  
 Typus: Robecchi-Bricchetti 568, 638; Riva 1046 (FT syntypi).  
 Ref.: Thulin M. 2006. Fl. of Somalia 3: 314, ♦ 314.
- Clerodendrum glabrum*** E.Mey., Comm. pl. Afr. austr. 1 (2): 273 (1838).  
 Typus: Drège s.n. (B holotypus, destr.; K, MO isotypus).  
 Ref.: Thulin M. 2006. Fl. of Somalia 3: 314, ♦ 313.
- Cyclonema myricoides* (Hochst.) Hochst. var. *tomentosa* Almagà, Annuario Reale Ist. Bot. Roma 8 (2): 135 (1904).  
 Syntypi: Ragazzi 175; Terracciano & Pappi 782; Pappi 3399 bis.  
 Eritrea.
- (=) ***Clerodendrum myricoides*** (Hochst.) Vatke, Linnaea 43: 535 (1882).  
 Typus: Schimper 330 (? TUB holotypus; BM, K isotypus).  
 Ref.: Persson E. in Hedberg I., Ensermu Kelbessa, Edwards S., Sebsebe Demissew & Persson E. 2006. Fl. of Ethiopia and Eritrea 5: 525, ♦ 525.  
 Link: *Clerodendrum discolor* (Klotzsch) Vatke. Cufodontis, Bull. Jard. Bot. État 32 (4), Suppl.: 798. 1962.
- Hebenstreitia rariflora* A.Terracc., Bull. Soc. Bot. Ital. 1892: 424 (1892).  
 Holotypus: Baudi di Vesme & Candeo s.n.  
 Ethiopia.
- (=) ***Chascanum rariflorum*** (A.Terracc.) Moldenke, Phytologia 1 (4): 167 (1935).  
 Ref.: Sebsebe Demissew in Hedberg I., Ensermu Kelbessa, Edwards S., Sebsebe Demissew & Persson E. 2006. Fl. of Ethiopia and Eritrea 5: 506.
- Lantana concinna* Baker f. *macrophylla* Chiov., Result. Sc. Miss. Stefanini-Paoli Somal. Ital. I: 143 (1916).  
 Holotypus: Paoli 1316.  
 Somalia.
- Lantana dauensis* Chiov., Ann. Bot. (Rome) 10 (3): 402 (1912).  
 Holotypus: Riva 1613 (1054).  
 Ethiopia.
- (=) ***Lantana viburnoides*** (Forssk.) Vahl, Symb. bot. 4: 45 (1790).  
 Typus: Forsskål 323 (C holotypus).  
 Ref.: Thulin M. 2006. Fl. of Somalia 3: 365.
- (=) ***Lippia dauensis*** (Chiov.) Chiov., Fl. Somalia II: 359 (1932).  
 Ref.: Sebsebe Demissew in Hedberg I., Ensermu Kelbessa, Edwards S., Sebsebe Demissew & Persson E. 2006. Fl. of Ethiopia and Eritrea 5: 511.

- Lantana salvifolia* Jacq. var. *strigosa* Fiori, Boschi e (=) piante legn. Eritr.: 322 (1912).  
 Holotypus: Fiori 589.  
 Eritrea.
- Lantana salvifolia* Jacq. var. *ternata* Chiov., Racc. (=) Bot. Miss. Consolata Kenya: 97 (1935).  
 Holotypus: Balbo 74\*.  
 Kenya.
- Lantana salvifolia* Jacq. f. *trifoliata* Chiov., nom. (=) nud. Malpighia 34: 515 (1937).  
 Holotypus: Taschdjian 220.  
 Ethiopia.
- Premna suaveolens* Chiov., Fl. Somalia II: 360, ♦ 361 (=) (1932).  
 Syntypi: Gorini 323; Senni 364.  
 Somalia.
- Priva tenax** Verdc., Kew Bull. 43 (4): 672 (1988).  
 Isotypus: Schweinfurth & Riva 490.  
 (K holotypus. Verdcourt, Kew Bull. 43 (4): 672. 1988).  
 Eritrea.
- Svensonia moldenkei* J.B.Gillett, Kew Bull. 10: 132 (=) (1955).  
 Isotypus: Gillett 13397.  
 (K holotypus. Gillett, Kew Bull. 10: 132. 1955).  
 Kenya.
- Vitex balbi* Chiov., Racc. Bot. Miss. Consolata (=) Kenya: 99 (1935).  
 Syntypi: Balbo 55\*, 78\*.  
 Kenya.  
 The syntype Balbo 861 is lacking in FT.
- Lantana rugosa** Thunb., Prodr. Pl. Cap.: 92 (1800).  
 Typus: Thunberg s.n. (UPS? holotypus).  
 Ref.: Cufodontis G. 1962. Bull. Jard. Bot. État 32 (4), Suppl.: 789.
- Lantana ukambensis** (Vatke) Verdc., Fl. Trop. East Afr., Verbenaceae: 43, ♦ 44 (1992).  
 Typus: Hildebrandt 2739 (B holotypus, destr.; K isotypus).  
 Ref.: Verdcourt B. in Polhill R.M. 1992. Fl. Trop. East Afr., Verbenaceae: 43, ♦ 44.
- Lantana trifolia** L., Sp. pl. 2: 626 (1753).  
 Typus: in Plumier, Codex Boerhaavianus (University Library, Groningen, icon., lectotypus).  
 Ref.: Cufodontis G. 1962. Bull. Jard. Bot. État 32 (4), Suppl.: 789.
- Clerodendrum glabrum** E.Mey., Comm. pl. Afr. austr. 1 (2): 273 (1838).  
 Typus: Drège s.n. (B holotypus, destr.; K, MO isotypus).  
 Ref.: Thulin M. 2006. Fl. of Somalia 3: 314, ♦ 313.
- Chascanum moldenkei** (J.B.Gillett) Sebsebe & Verdc., Kew Bull. 43 (3): 521 (1988).  
 Ref.: Verdcourt B. in Polhill R.M. 1992. Fl. Trop. East Afr., Verbenaceae: 17.
- Vitex keniensis** Turrill, Kew Bull. 1915: 47 (1915).  
 Typus: D.K.S. Grant in F.D. 846 (K syntypus; EA isosyntypus).  
 Ref.: Verdcourt B. in Polhill R.M. 1992. Fl. Trop. East Afr., Verbenaceae: 58.

## VIOLACEAE

**Hybanthus enneaspermus** (L.) F.Muell. var.  
**diversifolius** Grey-Wilson, Kew Bull. 36 (1): 106, ♦  
105 (1981).

Isotypus: Graham 1983.  
(K holotypus. Grey-Wilson, Kew Bull. 36 (1):  
106. 1981).

Kenya.

**Hybanthus enneaspermus** (L.) F.Muell. var.  
**tsavoensis** Grey-Wilson, Kew Bull. 36 (1): 106, ♦  
108 (1981).

Isotypus: Greenway & Kanuri 12916.  
(K holotypus. Grey-Wilson, Kew Bull. 36 (1):  
106. 1981).

Kenya.

**Rinorea convallarioides** (Baker f.) Eyles subsp.  
**marsabitensis** Grey-Wilson, Kew Bull. 36 (1): 115,  
♦ 117 (1981):

Isotypus: Adamson 9.  
(K holotypus. Grey-Wilson, Kew Bull. 36 (1):  
115. 1981).

Kenya.

**Rinorea somalensis** Chiov., Atti Ist. Bot. Univ. Pavia,  
ser. IV, 7: 120, ♦ t. II (1935) (=)

Holotypus: Puccioni 21.

Somalia.

**Rinorea elliptica** (Oliv.) Kuntze, Revis. gen. pl. 1:  
42 (1891).

Typus: Kirk s.n. (K holotypus).

Ref.: Thulin M. 1993. Fl. of Somalia 1: 74, ♦  
74.

**Viola cinerea** Boiss. var. **erythraea** Fiori, Nuovo  
Giorn. Bot. Ital., n.s., 20: 355 (1913).

Holotypus: Fiori 1443.

Eritrea.

**Viola erythraea** (Fiori) Chiov. var. **soyrae** Chiov.,  
Nuovo Giorn. Bot. Ital., n.s., 26: 149 (1919). (=)

Syntypi: Dainelli & Marinelli 76, 77, 78.  
Eritrea.

**Viola cinerea** Boiss. var. **erythraea** Fiori, Nuovo  
Giorn. Bot. Ital., n.s., 20: 355 (1913).

Typus: Fiori 1443 (FT holotypus).

Ref.: Gilbert M.G. in Edwards S., Mesfin  
Tadesse, Sebsebe Demissew & Hedberg I. 2000.  
Fl. of Ethiopia and Eritrea 2 (1): 166.

## VITACEAE

- Cissus adenocaulis* Steud. ex A.Rich. var. *chiovendae* (=) Lanza, Miss. Biol. Borana, Racc. Bot. Angiosp.-Gymnosp.: 111, ♦ 112 (1939).  
Holotypus/Isotypus: Cufodontis 274.  
Ethiopia.
- Cyphostemma adenocaule*** (Steud. ex A.Rich.) Desc. ex Wild & R.B.Drumm. subsp. ***adenocaule***, Fl. Zambesiaca 2 (2): 473 (1966).  
Typi: Schimper 1646, 1703 (P syntypi; BM, K isosyntypi).  
Ref.: Verdcourt B. in Polhill R.M. 1993. Fl. Trop. East Afr., Vitaceae: 91, ♦ 90.
- Cissus aphylla*** Chiov., Result. Sc. Miss. Stefanini-Paoli Somal. Ital. I: 55 (1916).  
Holotypus: Paoli 769.  
Somalia.  
The exsiccatum (pro syntypus) Riva 930 of *Cissus aphyllantha* Gilg & M.Brandt belongs to *Cissus aphylla* Chiov.
- Cissus crithmifolius* Chiov., Fl. Somalia: 129 (1929). (=)  
Holotypus: Puccioni & Stefanini 624 [687].  
Somalia.
- Cissus dembianensis* Chiov., Ann. Bot. (Rome) 9 (1): 54 (1911).  
Holotypus: Chiovenda 1654.  
Ethiopia.
- Cissus dysocarpa* Gilg & M.Brandt, Bot. Jahrb. Syst. 46: 534 (1912).  
Syntypus: Riva 1013.  
Ethiopia.
- Cissus dysocarpa* Gilg & M.Brandt var. *gymnocarpa* (=) Chiov., Fl. Somalia: 129 (1929).  
Holotypus: Puccioni e Stefanini 266 [301].  
Somalia.
- Cissus erythraea* Gilg & M.Brandt, Bot. Jahrb. Syst. 46: 507 (1912).  
Isosyntypus: Schweinfurth & Riva 2251.  
(syntypus ubi? Vollesen, Fl. of Ethiopia 3: 411. 1989).  
Eritrea.
- Cissus furcifera* Chiov., Result. Sc. Miss. Stefanini-Paoli Somal. Ital. I: 53, ♦ t. 6, f. A (1916).  
Holotypus/Isotypus: Paoli 1102.  
Somalia.
- Cissus hamaderohensis* Radcl.-Sm., Hooker's Icon. Pl. 7 (4): t. 3678, ♦ t. 3678 (1971).  
Isotypus: Smith & Lavranos 291.  
(K holotypus. Radcliffe-Smith, Hooker's Icon. Pl. 7 (4): t. 3678. 1971).  
Yemen, Socotra.
- Cyphostemma crithmifolium*** (Chiov.) Desc., Naturalia Monspel., Sér. Bot. 18: 220 (1967).  
Ref.: Thulin M. 1999. Fl. of Somalia 2: 165.
- Cyphostemma dembianense*** (Chiov.) Vollesen, Nordic J. Bot. 4 (1): 37 (1984).  
Ref.: Vollesen K. in Hedberg I. & Edwards S. 1989. Fl. of Ethiopia 3: 415.
- Cyphostemma digitatum*** (Forssk.) Desc., Naturalia Monspel., Sér. Bot. 18: 220 (1967).  
Typus?: Forsskål (Arabia felix, sine loco). (Cufodontis, Bull. Jard. Bot. État 28 (4), Suppl.: 507. 1958).  
Ref.: Thulin M. 1999. Fl. of Somalia 2: 167, ♦ plate 3 D.
- Cyphostemma digitatum*** (Forssk.) Desc., Naturalia Monspel., Sér. Bot. 18: 220 (1967).  
Typus?: Forsskål (Arabia felix, sine loco). (Cufodontis, Bull. Jard. Bot. État 28 (4), Suppl.: 507. 1958).  
Ref.: Thulin M. 1999. Fl. of Somalia 2: 167, ♦ plate 3 D.
- Cyphostemma molle*** (Steud. ex Baker) Desc., Naturalia Monspel., Sér. Bot. 18: 225 (1967).  
Typus: Schimper II: 538 (P holotypus; BM, FI(Webb), K, UPS isotypus).  
Ref.: Vollesen K. in Hedberg I. & Edwards S. 1989. Fl. of Ethiopia 3: 411.

- Cissus javallensis* Lanza, Miss. Biol. Borana, Racc. Bot. Angiosp.-Gymnosp.: 113, ♫ 114 (1939).  
 Holotypus/Isotypus: Cufodontis 413.  
 Ethiopia.
- Cissus javallensis* Lanza var. *rotundata* Lanza, Miss. Biol. Borana, Racc. Bot. Angiosp.-Gymnosp.: 115, ♫ 115 (1939).  
 Holotypus/Isotypus: Cufodontis 348.  
 Ethiopia.
- Cissus macrothyrsa* Gilg, Notizbl. Bot. Gart. Berlin-Dahlem 4: 186 (1905).  
 Holotypus: Riva 1103.  
 Ethiopia.
- Cissus migiurtinorum* Chiov., Fl. Somalia: 132 (1929).  
 Holotypus: Puccioni & Stefanini 40 [40].  
 Somalia,
- Cissus neghelliensis* Lanza, Miss. Biol. Borana, Racc. Bot. Angiosp.-Gymnosp.: 115, ♫ 117 (1939).  
 Holotypus/Isotypus: Cufodontis 181.  
 Ethiopia.
- Cissus nivea* Hochst. ex Schweinf., Beitr. Fl. Aethiop.: 83 (1867).  
 Isosyntypus: Schimper 517.  
 (Syntypus ubi? Vollesen, Fl. of Ethiopia 3: 415. 1989).  
 Ethiopia.
- Cissus pachyrrhachis* Gilg & M. Brandt, Bot. Jahrb. Syst. 46: 541 (1912).  
 Isotypus: Schimper 516.  
 (B holotypus, destr. Verdcourt, Fl. Trop. East Afr., Vitaceae: 122. 1993).  
 Ethiopia.
- Cissus phyllomicron* Chiov., Fl. Somalia: 130 (1929).  
 Holotypus: Puccioni & Stefanini 525 [578].  
 Somalia.
- Cissus phyllomicron* Chiov. f. *eglandulosa* Chiov., Fl. Somalia: 130 (1929).  
 Holotypus: Puccioni & Stefanini 500 [553].  
 Somalia.
- (=) **Cyphostemma cyhopetalum** (Fresen.) Desc. ex Wild & R.B.Drumm., Fl. Zambesiaca 2 (2): 491 (1966).  
 Typus: Rueppel s.n. (FR holotypus).  
 Ref.: Vollesen K. in Hedberg I. & Edwards S. 1989. Fl. of Ethiopia 3: 417, ♫ 418.
- (=) **Cyphostemma cyhopetalum** (Fresen.) Desc. ex Wild & R.B.Drumm., Fl. Zambesiaca 2 (2): 491 (1966).  
 Typus: Rueppel s.n. (FR holotypus).  
 Ref.: Vollesen K. in Hedberg I. & Edwards S. 1989. Fl. of Ethiopia 3: 417, ♫ 418.
- (=) **Cyphostemma digitatum** (Forssk.) Desc., Naturalia Monspel., Sér. Bot. 18: 220 (1967).  
 Typus?: Forsskål (Arabia felix, sine loco). (Cufodontis, Bull. Jard. Bot. État 28 (4), Suppl.: 507. 1958).  
 Ref.: Thulin M. 1999. Fl. of Somalia 2: 167, ♫ plate 3 D.
- (=) **Cyphostemma betiforme** (Chiov.) Vollesen, Nordic J. Bot. 4 (1): 37 (1984).  
 Typus: Paoli 1067 (holotypus not present in FT).  
 Ref.: Thulin M. 1999. Fl. of Somalia 2: 164.
- (=) **Cyphostemma cyhopetalum** (Fresen.) Desc. ex Wild & R.B.Drumm., Fl. Zambesiaca 2 (2): 491 (1966).  
 Typus: Rueppel s.n. (FR holotypus).  
 Ref.: Vollesen K. in Hedberg I. & Edwards S. 1989. Fl. of Ethiopia 3: 417, ♫ 418.
- (=) **Cyphostemma niveum** (Hochst. ex Schweinf.) Desc., Naturalia Monspel., Sér. Bot. 18: 225 (1967).  
 Ref.: Vollesen K. in Hedberg I. & Edwards S. 1989. Fl. of Ethiopia 3: 415.
- (=) **Cyphostemma cyhopetalum** (Fresen.) Desc. ex Wild & R.B.Drumm., Fl. Zambesiaca 2 (2): 491 (1966).  
 Typus: Rueppel s.n. (FR holotypus).  
 Ref.: Vollesen K. in Hedberg I. & Edwards S. 1989. Fl. of Ethiopia 3: 417, ♫ 418.
- (=) **Cyphostemma digitatum** (Forssk.) Desc., Naturalia Monspel., Sér. Bot. 18: 220 (1967).  
 Typus?: Forsskål (Arabia felix, sine loco). (Cufodontis, Bull. Jard. Bot. État 28 (4), Suppl.: 507. 1958).  
 Ref.: Thulin M. 1999. Fl. of Somalia 2: 167, ♫ plate 3 D.
- (=) **Cyphostemma digitatum** (Forssk.) Desc., Naturalia Monspel., Sér. Bot. 18: 220 (1967).  
 Typus?: Forsskål (Arabia felix, sine loco). (Cufodontis, Bull. Jard. Bot. État 28 (4), Suppl.: 507. 1958).  
 Ref.: Thulin M. 1999. Fl. of Somalia 2: 167, ♫ plate 3 D.

- Cissus quadrangularis* L. var. *pentagona* Chiov., (=) Result. Sc. Miss. Stefanini-Paoli Somal. Ital. I: 55 (1916).  
Holotypus: Paoli 1287.  
Somalia.
- Cissus quinquangularis* Chiov., Fl. Somalia II: 142, ♫ 141 (1932).  
Syntypi: Guidotti s.n.; Tozzi 404.  
Somalia.
- Cissus rivae* Gilg, Notizbl. Bot. Gart. Berlin-Dahlem 4: 185 (1905).  
Syntypi: Riva 484 (519), 633 (693).  
Ethiopia.
- Cissus ruspolii* Gilg, Notizbl. Bot. Gart. Berlin-Dahlem 4: 186 (1905).  
Holotypus: Riva 1592.  
Ethiopia.
- Cissus sarcospathula* Chiov., Fl. Somalia: 130, ♫ t. XXXIV, f. 2 (1929).  
Holotypus: Puccioni & Stefanini 707 [784].  
Somalia.
- Cissus serjanoides* Planch., in DC. Monog. Phan. 5: 589 (1887).  
Isosyntypus: Beccari 83.  
(syntypus ubi? Vollesen, Fl. of Ethiopia 3: 414. 1989).  
Eritrea.
- Cissus somaliensis* Gilg, Notizbl. Bot. Gart. Berlin-Dahlem 4: 186 (1905).  
Syntypi: Robecchi Bricchetti 236; Riva 1117.  
Ethiopia.  
The third exsiccatum (pro syntypus) of *Cissus somaliensis*: Robecchi Bricchetti 509, (fide Thulin, Fl. of Somalia 2: 166. 1993) is *Cyphostemma digitatum*.
- Cissus stefaniniana* Chiov., Result. Sc. Miss. Stefanini-Paoli Somal. Ital. I: 54 (1916).  
Holotypus: Paoli 268.  
Somalia.
- Cissus taschdjianica* Chiov., Malpighia 34: 492 (1937).  
Holotypus: Taschdjian 370.  
Ethiopia.
- Cissus ternato-multifida* Chiov., Fl. Somalia II: 143 (1932).  
Syntypi: Puccioni & Stefanini 461 [513], 708 [785].  
Somalia.  
Chiovenda published *Cissus ternata* non Baker (1882), nom. illeg. in Fl. Somalia: 131 (1929) with the same syntypes.
- Cissus quinquangularis* Chiov., Fl. Somalia II: 142, ♫ 141 (1932).  
Typi: Guidotti s.n.; Tozzi 404 (FT syntypi).  
Ref.: Thulin M. 1999. Fl. of Somalia 2: 163.
- Cyphostemma rivaе** (Gilg) Desc., Naturalia Monspel., Sér. Bot. 18: 227 (1967).  
Ref.: Vollesen K. in Hedberg I. & Edwards S. 1989. Fl. of Ethiopia 3: 415.
- Cyphostemma sarcospathulum** (Chiov.) Desc., Naturalia Monspel., Sér. Bot. 18: 227 (1967).  
Ref.: Thulin M. 1999. Fl. of Somalia 2: 164.
- Cyphostemma adenocaule** (Steud. ex A.Rich.) Desc. ex Wild & R.B.Drumm. subsp. **adenocaule**, Fl. Zambesiaca 2: 473 (1966).  
Typi: Schimper 1646, 1703 (P syntypi; BM, K isosyntypi).  
Ref.: Verdcourt B. in Polhill R.M. 1993. Fl. Trop. East Afr., Vitaceae: 91, ♫ 90.
- Cyphostemma ternatum** (J.F.Gmel.) Desc., Naturalia Monspel., Sér. Bot. 18: 229 (1967).  
Typus: Yemen, Hays (Haes), Forsskål (no specimen at C).  
Ref.: Thulin M. 1999. Fl. of Somalia 2: 166.
- Cyphostemma stefaninianum** (Chiov.) Desc., Naturalia Monspel., Sér. Bot. 18: 228 (1967).  
Thulin M. 1999. Fl. of Somalia 2: 166.
- Cyphostemma adenanthum** (Fresen.) Desc., Naturalia Monspel., Sér. Bot. 18: 218 (1967).  
Typus: Rueppel s.n. (FR holotypus).  
Ref.: Vollesen K. in Hedberg I. & Edwards S. 1989. Fl. of Ethiopia 3: 410.
- Cyphostemma sarcospathulum** (Chiov.) Desc., Naturalia Monspel., Sér. Bot. 18: 227 (1967).  
Typus: Puccioni & Stefanini 707 [784] (FT holotypus).  
Ref.: Thulin M. 1999. Fl. of Somalia 2: 164.

**Cyphostemma burgeri** Vollesen, Nordic J. Bot. 4 (1): 34, ♫ 34 (1984).

Isotypus: Burger 2766.

(K holotypus. Vollesen, Nordic J. Bot. 4 (1): 34. 1984).

Ethiopia.

**Cyphostemma jiguu** Verdc., Kew Bull. 41 (4): 1016 (1986).

Isotypus: Verdcourt 3627.

(K holotypus. Verdcourt, Kew Bull. 41 (4): 1016. 1986).

Kenya.

**Cyphostemma kibweziense** Verdc., Fl. Trop. East Afr., Vitaceae: 83, ♫ 49 (1993).

Isotypus: Greenway 10861.

(K holotypus. Verdcourt, Fl. Trop. East Afr., Vitaceae: 83. 1993).

Kenya.

*Vitis dubia* Becc. ex Martelli, non Lawson (1875), Fl. Bogos.: 19 (1886), nom. illeg.

Syntypi: Beccari 38, 192.

Eritrea.

*Vitis sambucina* Becc. ex Martelli, Fl. Bogos.: 20 (1886).

Holotypus: Beccari 124.

Eritrea.

(=) **Cissus petiolata** Hook.f., Niger Fl.: 262 (1849).

Typus: Vogel (K holotypus).

Ref.: Verdcourt B. in Polhill R.M. 1993. Fl. Trop. East Afr., Vitaceae: 16, ♫ 17.

**Cyphostemma adenanthum** (Fresen.) Desc., Naturalia Monspel., Sér. Bot. 18: 218 (1967).

Typus: Rueppel s.n. (FR holotypus).

Ref.: Vollesen K. in Hedberg I. & Edwards S. 1989. Fl. of Ethiopia 3: 410.



## INDEX

<b>Abbreviations</b>	7	<b>Buxus</b>	37
<b>Legend</b>	11	<b>C</b>	
<b>A</b>		<b>Cactaceae</b>	37
Abutilon	83	Calamintha	74
<b>Acanthaceae</b>	13	Calesiam	24
Acanthus	13	Calotropis	28
Adansonia	34	<b>Campanulaceae</b>	37
Adenia	91	Campylanthus	109
Adenium	26	<b>Canellaceae</b>	39
Adenopus	66	Canthium	95
Aeollanthus	74	Caralluma	28
Aglaia	24	Carania	91
<b>Alangiaceae</b>	24	Cardiospermum	106
Alangium	24	Carduus	46
Allophylus	106	Carum	122
Ammannia	82	Cassine	39
<b>Anacardiaceae</b>	24	Cassipourea	94
Anagallis	93	<b>Celastraceae</b>	39
Angoseseli	122	Celsia	109
Anisotes	13	Centaurea	46
Anthospermum	95	Cephalopentandra	66
Anticharis	109	Cephalostigma	37
<b>Apocynaceae</b>	26	Ceriops	94
<b>Aquifoliaceae</b>	27	Ceropegia	29
Arnebiola	34	Chamaeacanthus	109
Artemisia	44	Chascanum	124
<b>Asclepiadaceae</b>	28	Chiariinia	106
Asclepias	28	Cienfuegoscia	83
Aspilia	44	Cineraria	47
Astripomoea	61	Cissus	128
Astrochlaena	61	Cistanche	91
Asystasia	13	Clerodendrum	124
Athroisma	44	Coccinia	66
<b>B</b>		Coffea	96
Ballota	74	Cola	116
Barleria	13	Coleus	74
Basananthe	91	<b>Combretaceae</b>	40
Becium	74	Combretum	40
Berkheya	44	<b>Compositae (Asteraceae)</b>	44
Bersama	88	Conocarpus	42
Bidens	45	Conopharyngia	27
<b>Bignoniaceae</b>	34	Conostomium	96
Blaeria	71	<b>Convolvulaceae</b>	61
Blainvillea	45	Convolvulus	61
Blepharis	16	Conyzia	47
Blepharispermum	45	Corallocarpus	66
Blumea	46	Corchorus	119
<b>Bombacaceae</b>	34	Cordia	34
<b>Boraginaceae</b>	34	Coreopsis	47
Borreria	95	Crabbea	17
Bothriocline	46	Craterostigma	109
Bottegoa	106	Crossandra	17
Brachystelma	28	Cryptolepis	29
Breweria	61	Cucumella	66
Brillantaisia	16	Cucumis	67
Bubania	93	<b>Cucurbitaceae</b>	66
Buddleja	36	Curroria	30
<b>Buddlejaceae</b>	36	<b>Cyclocheilaceae</b>	69
<b>Buxaceae</b>	37	Cyclocheilon	69

Cyclonema	125	Gutenbergia	51
Cycniopsis	109	<b>Guttiferae</b>	73
Cycnum	109	Gymnosciadium	122
Cynanchum	30	Gymnosporia	39
Cynoglossum	35	<b>H</b>	
Cyphia	37	Haplocoelum	107
Cyphostemma	131	Harmsia	116
<b>D</b>		Harnieria	18
Desmidorchis	31	Hartogia	40
Dicliptera	17	Hebenstreitia	125
Dicoma	48	Helichrysum	51
Diodia	96	Heliotropium	35
Diospyros	70	Hermannia	117
<b>Dipsacaceae</b>	70	Heteropodium	89
Dipsacus	70	Hibiscus	84
Dirichletia	96	Hildebrandtia	62
Discopodium	112	Homochroma	52
Dombeya	116	Huernia	32
Duosperma	17	Hunteria	27
Duvalia	31	Hyalocystis	63
Duvernoia	17	Hybanthus	127
Dyschoriste	18	Hypericum	73
<b>E</b>		Hypodematum	97
<b>Ebenaceae</b>	70	Hypoestes	18
Ecbolium	18	<b>I</b>	
Echidnopsis	31	<b>Icacinaceae</b>	73
Echinops	48	Ilex	27
Eionitis	97	Ilysanthes	110
Elaeodendron	39	Ipomoea	63
Eremosperma	62	Isoglossa	19
<b>Ericaceae</b>	71	<b>J</b>	
Erlangea	49	Jasminum	89
Erythrochlamys	75	Jaubertia	98
Euclea	70	Jobalboa	73
Eugenia	89	Justicia	19
Eureiandra	67	<b>K</b>	
Evolvulus	62	Kedrostis	68
<b>F</b>		Kickxia	110
Felicia	50	Kigelia	34
Filago	50	Kleinia	52
Filicum	107	Kohautia	98
Flacourtia	71	<b>L</b>	
<b>Flacourtiaceae</b>	71	<b>Labiatae (Lamiaceae)</b>	74
<b>G</b>		Lactuca	52
Galium	97	Lagenaria	68
Garcinia	73	Lamellisepalum	94
Gardenia	97	Lannea	24
Gazania	50	Lantana	125
Geniosporum	76	Lasianthus	99
<b>Gentianaceae</b>	72	Lasiosiphon	119
Gerrardanthus	68	Launaea	53
Gerrardina	71	Lavatera	85
<b>Gesneriaceae</b>	72	Leucas	76
Ghikaea	110	Leucobarleria	21
Glossonema	32	Limonium	93
Gnaphalium	50	Limosella	110
Gnidia	118	Lindackeria	71
Golaea	18	Lindenbergia	110
Gomphocarpus	32	Linociera	90
Gongrothamnus	50	Lobelia	37
Gossypium	83	Loewia	122
Grewia	119	<b>Loganiaceae</b>	82
Guizotia	50	Luederitzia	85

Lycium	112	Peponia	69
Lysimachia	93	Pergularia	33
<b>Lythraceae</b>	82	Peucedanum	123
<b>M</b>		Philippia	71
Maba	71	Piaggiae	27
Malabaila	123	Pimpinella	123
<b>Malvaceae</b>	83	Pistacia	25
Manilkara	107	Plagiotheca	22
Marsdenia	32	Plectranthus	79
Megalochlamys	21	Plectronia	104
Melanthera	53	Pleiotaxis	54
Melhania	117	Pluchea	54
<b>Melianthaceae</b>	88	<b>Plumbaginaceae</b>	93
Melothria	68	Polycline	54
Merremia	65	Polysphaeria	105
Micractis	53	Pouteria	108
Microcos	120	Premna	126
Micromeria	78	<b>Primulaceae</b>	93
Microtrichia	54	Priva	126
Mimulopsis	21	Pseudolithos	33
Mimusops	107	Pseudosopubia	111
Mitolepis	32	Psorospermum	73
Mitratheca	99	Psychotria	105
Modecca	91	Pterocephalus	70
Momordica	68	Pterodiscus	92
Monechma	21	Pulicaria	54
Monopsis	38	Pycnostachys	81
Monothecium	21	Pyrenacantha	73
Mostuea	82	<b>R</b>	
Mussaenda	99	Randia	105
<b>Myrtaceae</b>	89	Raphanocarpus	69
<b>N</b>		Raphionacme	33
Nanorrhimum	110	Rawsonia	71
Neuracanthus	21	Rebutia	37
Neurocarpaea	99	<b>Rhamnaceae</b>	94
Neurotheca	72	Rhamnus	94
Nidorella	54	Rhamphicarpa	111
Notonia	54	Rhinacanthus	22
<b>O</b>		<b>Rhizophoraceae</b>	94
Ochna	89	Rhus	25
<b>Ochnaceae</b>	89	Rhytidocaulon	33
Ocimum	78	Rinorea	127
Odina	25	Rotala	82
Oldenlandia	99	<b>Rubiaceae</b>	95
Olea	90	Ruellia	22
<b>Oleaceae</b>	89	Rumicicarpus	120
<b>Orobanchaceae</b>	91	Ruspolia	23
Orthosiphon	78	<b>S</b>	
Otocephalus	101	Sabaudia	81
Otomeria	101	Sageretia	94
Otostegia	79	Salacia	40
<b>P</b>		Salvadora	106
Pachycarpus	32	<b>Salvadoraceae</b>	106
Paolia	101	Salvia	81
Pappea	107	<b>Sapindaceae</b>	106
<b>Passifloraceae</b>	91	<b>Sapotaceae</b>	107
Pavetta	101	Satureja	81
Pavonia	86	Scabiosa	70
<b>Pedaliaceae</b>	92	Scassellatia	26
Pentanisia	103	Sclerocarya	26
Pentas	103	Sclerostephane	55
Pentatropis	33	Scolopia	40, 71
Pentodon	104	<b>Scrophulariaceae</b>	109

Scutellaria	81	Weihea	94
Secamone	33	Werneria	60
Seddera	65	Whitesloanea	34
Senecio	55	Withania	116
Senra	88	Wrightia	27
Sesamothamnus	92	<b>X</b>	
Sesamum	92	Xylocalyx	111
Sida	88	Xysmalobium	34
Sideroxylon	108	<b>Z</b>	
<b>Solanaceae</b>	112	Zehneria	69
Solanum	112	Ziziphus	94
Sopubia	66, 111		
Sparrmannia	120		
Spathulopetalum	33		
Sphaeranthus	56		
Stachys	81		
Statice	93		
Stemodiopsis	111		
Stephanorossa	123		
Sterculia	117		
<b>Sterculiaceae</b>	116		
Streptocarpus	72		
Streptopetalum	122		
Strychnos	82		
Sutera	111		
Svensonia	126		
Swertia	72		
Symphyochlamys	88		
<b>T</b>			
Tabernaemontana	27		
<b>Tamaricaceae</b>	118		
Tamarix	118		
Tarennia	105		
Terminalia	42		
Thespesia	88		
Thunbergia	23		
<b>Thymelaeaceae</b>	118		
Thymus	81		
<b>Tiliaceae</b>	119		
Tinnea	82		
Trachyspermum	124		
Tricalysia	105		
Trichodesma	36		
Tricliceras	122		
Triumphetta	120		
<b>Turneraceae</b>	122		
<b>U</b>			
<b>Umbelliferae (Apiaceae)</b>	122		
<b>V</b>			
Vangueria	106		
<b>Verbenaceae</b>	124		
Vernonia	57		
Veronica	111		
Vignaldia	105		
Viola	127		
<b>Violaceae</b>	127		
<b>Vitaceae</b>	128		
Vitex	126		
Vitis	131		
<b>W</b>			
Wahlenbergia	38		
Warburgia	39		
Wedelia	60		



