

Centro Studi Erbario Tropicale

L. Settesoldi, M. Tardelli, M. Raffaelli

**THE TYPES  
OF THE TROPICAL HERBARIUM OF FLORENCE**

**Volume II: Dicotyledons (Piperaceae to Euphorbiaceae)**



**L. Settesoldi, M. Tardelli, M. Raffaelli**

**THE TYPES  
OF THE TROPICAL HERBARIUM OF FLORENCE**

**Volume 2: Dicotyledons (Piperaceae to Euphorbiaceae)**



**I TIPI  
DELL'ERBARIO TROPICALE DI FIRENZE**

**Volume 2: Dicotiledoni (Piperaceae-Euphorbiaceae)**

**CENTRO STUDI ERBARIO TROPICALE  
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE  
Via La Pira 4 – 50121  
ITALIA  
[erbtrop@unifi.it](mailto:erbtrop@unifi.it)**

FIRENZE  
2004



## **FOREWORD**

The Tropical Herbarium of Florence (FT), founded in 1904, houses at present about 180,000 exsiccata, the bulk of which is made up of plants from Tropical Africa (with special regard to Somalia, Ethiopia, Eritrea and Kenya), but also from Southern-Central America, the Arabian Peninsula (Yemen and Oman) and Oceania.

The Tropical Herbarium has always been and still is visited by a good number of Botanists; the collections preserved therein, are a primary source of taxonomical and chorological information, particularly on critical or little known genera and families of Tropical plants. A substantial contribution to the accomplishment of the African floras, such as "Flora of Ethiopia" and the more recent "Flora of Somalia", came from the study of FT exsiccata.

The thorough reorganisation the Tropical Herbarium has gone through during the last few years, is now almost completed. To the advantage of Italian and foreign botanists, families and genera are now filed according to the Dalla Torre Harms decimal classification system, thus facilitating also the addition of new specimens (Tardelli M., Museol. Sci. XIII (3-4): 319-344, 1996).

A few years have elapsed since the publication (2001) of the first volume on the nomenclatural types housed in FT, which was focused on the Monocotyledons. Now we are glad to present the second volume, listing the types of the Dicotyledons (from Piperaceae to Euphorbiaceae). The years to come will see the conclusion of this task with a list of the remaining families' nomenclatural types.

The President  
Prof. Mauro Raffaelli

## **PREFAZIONE**

L'Erbario Tropicale di Firenze (FT), fondato nel 1904, contiene attualmente circa 180.000 campioni in maggioranza provenienti dall'Africa Tropicale (specialmente Somalia, Etiopia, Eritrea e Kenya), ma anche dall'America Centro-Meridionale e dall'Oceania.

L'Erbario Tropicale è sempre stato ed è tuttora visitato da un grande numero di Botanici; le sue collezioni costituiscono una fonte essenziale di informazioni tassonomiche e corologiche e sono di fondamentale importanza per lo studio di generi e specie tropicali di incerta identità e classificazione. Un contributo sostanziale alla realizzazione delle flore africane, come "Flora of Ethiopia" e, più di recente, "Flora of Somalia" è stato dato dallo studio dei campioni dell'Erbario Tropicale.

Il riordinamento delle collezioni dell'Erbario Tropicale, iniziato da alcuni anni, è ora quasi terminato. Per facilitare la consultazione dei campioni da parte dei Botanici italiani e stranieri e per rendere più agevole l'intercalamento dei campioni di nuova accessione, le famiglie e i generi sono stati ricollocati secondo un sistema decimale di classificazione derivante da Dalla Torre-Harms (Tardelli M., Museol. sci. XIII (3-4): 319-344. 1996).

Alcuni anni sono passati dalla pubblicazione (2001) del primo volume riguardante i tipi delle Monocotiledoni conservati in FT. Il secondo volume, qui presentato, elenca i tipi delle Dicotiledoni (dalle Piperaceae alle Euphorbiaceae). Il censimento dei tipi dell'Erbario Tropicale continuerà anche nei prossimi anni, fino al completamento delle restanti famiglie di Dicotiledoni.

Il Presidente  
Prof. Mauro Raffaelli



## ABBREVIATIONS

The abbreviations concerning the reviews are derived from Botanico-Periodicum-Huntianum (B-P-H) and Botanico-Periodicum-Huntianum / Suplementum (B-P-H / S). Plant families are named according to R.K. Brummitt, "Vascular Plant Families and Genera" Royal Botanic Gardens, Kew 1992.

**Beitr. Fl. Aethiop.** = SCHWEINFURTH G. Beitrag zur Flora Aethiopiens. Berlin. 1867.

**Bombay fl.** = DALZELL N.A. & GIBSON A. The Bombay flora: or, short descriptions of all the indigenous plants hitherto discovered in or near the Bombay presidency; together with a supplement of introduced and naturalised species. Bombay. 1861.

**Boschi e piante legnose dell'Eritrea** = FIORI A. Boschi e piante legnose dell'Eritrea. Firenze. Ed. Ist. Agr. Coloniale Italiano. 1909-1912.

**Bot. Repos.** = ANDREWS H.C. The botanist's repository, for new, and rare plants. Containing coloured figures of such plants, as have not hitherto appeared in any similar publication; with all their essential characters, botanically arranged, after the sexual system of the celebrated Linnaeus; in English, and Latin. To each description is added, a short history of the plant, as to its time of flowering, culture, native place of growth, when introduced, and by whom. The whole executed by Henry Andrews, author of the coloured engravings heaths, in folio. London. 10 vols. 1797-1814 or 1815.

**Bull. Soc. Bot. Ital.** = Bullettino della Società Botanica Italiana.

**Cent. Pl. Méroé** = DELILE A. Centurie de plantes d'Afrique du voyage à Méroé recueillies par M. Caillaud, et décrites par M. Raffeneau-Delile, 4<sup>e</sup> vol. of "Voyage à Méroé, au fleuve blanc, au-delà de Fâzoql, dans le midi du royaume de Sennâr, à Syouah et dans cinq autres oasis; fait dans les années 1819, 1820, 1821 et 1822". Paris. 4 vols. 1826-1827.

**Common Poisonous Pl. E. Afr.** = VERDCOURT B. & TRUMP E.C. Common Poisonous Plants of East Africa. Collins. London 1969.

**Comp. Fl. atlant.** = COSSON E.S.-C. Compendium florae atlanticae seu expositio methodica plantarum omnium in Algeria necnon in regno Tunetano et imperio Maroccano hucusque notarum ou Flore des états barbaresques Algérie, Tunisine et Maroc. Paris. 2 vols. 1881-1887.

**Consp. Afric. Acacia Sp.** = ROSS J.H. A conspectus of the African Acacia Species. Memoirs of the Botanical Survey of South Africa No. 44. Botanical Research Institute. Department of Agricultural Technical Service. Republic of South Africa. 1979.

**Crot. Afr. Madag.** = POLHILL R.M. Crotalaria in Africa and Madagascar. A.A.Balkema. Rotterdam. 1982.

**Encyc.** = DE LAMARCK J.B. Encyclopédie methodique. Botanique. Paris. 13 vols. 1783-1817.

**Enum. Pl.** = VAHL M. Martini Vahlii, Enumeratio plantarum, vel ab aliis, vel ab ipso observatarum, cum earum differentiis specificis, synonymis selectis et descriptionibus succinctis. Hauniae. 2 vols. 1804-1805.

**Énum. Pl. Fleurs Afr. Trop.** = LEBRUN J.-P. & STORK A.L. Énumération des plantes à fleurs d'Afrique Tropicale. Genève.

**Faune & Flore des Comalis** = REVOIL G. Faune et flore des Pays Comalis (Afrique orientale), 10 parts 1882 ; of which part ix botanical : A.R. Franchet, Sert. Somal. 1884.

**Fl. Aden.** = ANDERSON T. *Florula adenensis. A systematic account, with descriptions, of the flowering plants hitherto found at Aden.* Journal of the Proceedings of the Linnean Society. Supplement to vol. V. Botany. London. 1860.

**Fl. Aegypt.-Arab.** = FORSSKÅL P. *Flora aegyptiaco-arabica. Sive descriptiones plantarum, quas per Aegyptum inferiorem et Arabiam felicem detexit, illustravit Petrus Forskål. Prof. Haun. Post mortem auctoris edidit Carsten Niebuhr. Accedit tabula Arabiae filicis geographico-botanica.* Hauniae. 1775.

**Fl. Arab. Pen. and Socotra** = MILLER A.G. & COPE T.A. *Flora of the Arabian Peninsula and Socotra.* Vol. 1. Edinburgh University Press in association with Royal Botanic Garden Edinburgh, Royal Botanic Gardens, Kew. 1996.

**Fl. Bogos.** = MARTELLI U. *Florula Bogosensis. Enumerazione delle piante dei Bogos raccolte dal Dott. O. Beccari nell'anno 1870 con descrizione delle specie nuove o poco note per cura di Ugolino Martelli.* Firenze. Tip. Mariano Ricci. 1886.

**Fl. Brit. India** = HOOKER J.D. *The flora of British India. Assisted by various botanists, published under the authority of the Secretary of State for India in Council.* London. 7 vols. 1872-1897.

**Fl. of Ethiopia and Eritrea** = *Flora of Ethiopia and Eritrea.* Addis Abeba, Ethiopia e Uppsala, Svezia.

**Fl. of Somalia** = *Flora of Somalia.* Kew. Royal Botanic Gardens.

**Fl. Orient.** = BOISSIER P.E. *Flora orientalis sive enumeratio plantarum in Oriente a Graecia et Aegypto ad Indiae fines hucusque observatarum.* Basel, Genève. 6 vols. 1867-1888.

**Fl. Seneg. Tent.** = GUILLEMIN A. & PERROTTET G.S. *Florae Senegambiae tentamen, seu historia plantarum in diversis Senegambiae regionibus a peregrinatoribus Perrottet et Leprieur detectarum accedunt tabulae lapide aut aere incisae.* Tomus primus. Paris, London. 1830-1833.

**Fl. Somalia** = CHIOVENDA E. *Flora Somala.* Roma. Sindacato italiano Arti Grafiche Editore. 1929.

**Fl. Somalia II** = CHIOVENDA E. *Flora Somala II.* Forlì. Tipografia Valbonesi. 1932.

**Fl. Suecica, ed 2** = LINNAEUS C. *Caroli Linnaei Flora svecica [suecica] exhibens plantas per regnum Sveciae crescentes, systematice cum differentiis specierum synonymis autorum nominibus incolarum solo locorum usu pharmacopaeorum.* Editio secunda aucta et emendata. Stockholmiae. 1755.

**Fl. Trop. Afr.** = *Flora of Tropical Africa.*

**Fl. Trop. E. Afr.** = *Flora of Tropical East Africa.*

**Handb. fl. Ceylon** = TRIMEN H. *A hand-book to the flora of Ceylon containing descriptions of all the species of flowering plants indigenous to the island, and notes on their history, distribution, and uses.* London. 6 vols. 1893-1931.

**Hochgebirgsfl. Trop. Afrika** = ENGLER H.G.A. *Über die Hochgebirgsflora des tropischen Afrika.* Berlin. 1892.

**Hort. bot. Vindob.** = JACQUIN N.J. *Hortus botanicus vindobonensis, seu plantarum rarioorum quae in horto botanico vindobonensi, augustissimae Mariae Theresiae munificentia regia in universitatis patriae excellens ornamentum publicamque utilitatem exstructo, coluntur, icones coloratae et succinctae descriptiones.* Cura et sumptibus Nicolai Josephi Jacquin. Vindobonae. 1770-1776.

**Hort. Brit. ed. 3** = SWEET R. *Sweet's Hortus britannicus: or, a catalogue of plants cultivated in the gardens of Great Britain; arranged in natural orders: with the addition of the Linnean classes and order to which they belong, reference to the books where they are described, their native places of growth, when introduced, time of flowering, duration, & reference to figures, with numerous synonyms.* Ed. 3. London. 1839.

**Hortus Maurit.** = BOJER W. *Hortus mauritanus ou énumération des plantes, exotiques et indigènes, qui croissent à l'ile Maurice, disposées d'après la méthode naturelle.* Mauritius. 1937.

**Ic. Anim. Pl.** = MILLER J.F. *Icones animalium et plantarum*. 60 plates. 1776-1785.

**III. fl. Atlant.** = COSSON E.S.-C. *Illustrationes florae atlanticae seu icones plantarum novarum, rariorū vel minus cognitarum in Algeria necnon in regno Tunetano et imperio Maroccano nascentium in compendio florae atlanticae descriptarum*. Paris. 2 vols. 1882-1897.

**III. Pl. Orient.** = JAUBERT H.-F. & SPACH E. *Illustrationes plantarum orientalium auctoribus Comite Jaubert et Eduardo Spach*. Parisiis. 5 vols. 1842-1857.

**Legum. Trop. Africa** = BAKER E.G. *The Leguminosae of Tropical Africa*. Ostende. 3 parts. 1926-1930.

**Mant. pl.** = VON LINNAEUS C. *Car. a Linné Mantissa plantarum. Generum editionis vi. et Specierum editionis ii.* Holmiae. 1767 [-1771].

**Miss. Biol. Borana, Racc. Bot. Angiosp.-Gymnosp.** = CHIOVENDA E., FIORI A., LANZA D., CUFDONTIS G. *Missione biologica nel paese dei Borana*. Vol. 4. *Raccolte Botaniche Angiospermae-Gymnospermae Pteridophyta*. Roma. Reale Accademia D'Italia. 1939.

**Miss. Stud. Lago Tana, VII, Ricerche Bot. I** = PICHI-SERMOLLI R. *Missione di studio al Lago Tana*; Vol. VII, *Ricerche Botaniche Parte I*. Roma. Accademia Nazionale dei Lincei. 1951.

**Mistletoes Afr.** = POLHILL R. & WIENS D. *Mistletoes of Africa*. Royal Botanic Garden, Kew. 1998.

**Monogr. Afrik. Pflanzen-Fam.** = ENGLER H.G.A. *Monographien afrikanischer Pflanzen-Familien und -Gattungen*. Herausgegeben von A. Engler. Leipzig. 8 vols. 1898-1904.

**Monogr. Phan.** = DE CANDOLLE A.L.P.P. *Monographiae Phanerogamarum. Prodromi nunc continuatio nunc revisio auctoribus Alphonso et Casimir de Candolle aliisque botanicis ultra memoratis*. Paris. 9 vols. 1878-1896.

**Nat. Pflanzenfam.** = ENGLER H.G.A. & PRANTL K.A.E. *Die natürlichen Pflanzenfamilien nebst ihren Gattungen und wichtigeren Arten insbesondere den Nutzpflanzen*, bearbeitet unter Mitwirkung zahlreicher hervorragender Fachgelehrten. Leipzig. 1887-1915.

**Nat. Pflanzenfam. ed. 2** = ENGLER H.G.A. *Die natürlichen Pflanzenfamilien nebst ihren Gattungen und wichtigsten Arten, insbesondere der Nutzpflanzen*. Unter Mitwirkung zahlreicher hervorragender Fachgelehrten begründet von A. Engler et K. Prantl. Zweite stark vermehrte und verbesserte Auflage herausgegeben von Adolf Engler, fortgesetzt von Hermann Harms, Johannes Mattfeld, Hans Melchior und Erich Werdermann. 26 vols. Leipzig, Berlin.

**Naturw. Reise Mossambique Bot.** = PETERS W.C.H. *Naturwissenschaftliche Reise nach Mossambique auf Befehl seiner Majestäts des Königs Friedrich Wilhelm IV in den Jahren 1842 bis 1848 ausgeführt von Wilhelm C.H. Peters*. Botanik. Berlin. 2 parts. [1861] 1862-1864.

**Opobalsamum** = LINNAEUS C. *Opobalsamum declaratum in dissertatione medica, cum consensu exper. Facultat. medicae, sub praesidio Caroli von Linné, publico examini modeste submittit Wilhelmus Le Moine, Stockholmensis. H.A.M.S. Upsaliae*. 1764.

**Pflanzenr.** = ENGLER H.G.A. *Das Pflanzenreich. Regni vegetabilis conspectus*. Im Auftrage der Preuss. Akademie der Wissenschaften, herausgegeben von A. Engler. Berlin. Nos. 1-107. 1900-1953.

**Pflanzenw. Afr.** = ENGLER H.G.A. *Die Pflanzenwelt Afrikas insbesondere seiner tropischen Gebiete. Grundzüge der Pflanzenverbreitung in Afrika und die Charakterpflanzen Afrikas*. In vol. 9 of: "Die Vegetation der Erde. Sammlung pflanzengeographischer Monographien herausgegeben von A. Engler und O. Drude. Leipzig."

**Pflanzenw. Ost-Afrikas C** = ENGLER H.G.A. *Die Pflanzenwelt Ost-Afrikas und der Nachbargebiete*. Herausgegeben unter Redaktion von Professor A. Engler. Theil C. *Verzeichniss der bis jetzt aus Ost-Afrika bekannt gewordenen Planzen*. A. Engler and many contributors. Berlin 1895.

**Pl. Bequaert.** = DE WILDEMAN E.A.J. Plantae bequaertianae études sur les récoltes botaniques du Dr. J. Bequaert chargé de missions au Congo Belge (1913-1915). Paris. 6 vols. 1921-1929.

**Pl. Corom.** = ROXBURGH W. Plants of the Coast of Coromandel; selected from drawings and descriptions presented to the hon. court of directors of the East India Company, by William Roxburgh, M.D. Published by their order, under the direction of Sir Joseph Banks, Bart. P.R.S. London. 3 vols. 1795-1820.

**Pl. hist. succ.** = DE CANDOLLE A.P. Plantarum historia succulentarum. Histoire des plantes grasses. Paris. 1798-1837.

**Pl. Quaedam Nilot.** = SCHWEINFURTH G. Plantae quaedam niloticae quas in itinere cum divo Adalberto libero barone de Barnim facto collegit Robertus Hartmann med. dr. recensuit et observationes criticas in plantas prius jam notas et novarum descriptiones addidit Georgius Schweinfurth. Berolini. 1862.

**Pl. Tinn.** = KOTSCHY C.G.T. & PEYRITSCH J.J. Plantae tinneanae sive descriptio plantarum in expeditione tinneana ad flumen Bahl-el-Ghasal eiusque affluentias in septentrionali interioris Africae parte collectarum. Opus xxvii tabulis exornatum Theodori Kotschy et Ioannis Peyritsch consociatis studiis elaboratum suis sumptibus ediderunt Alexandrina P. F. Tinne et Ioannis A. Tinne. Vindobonae. 1867.

**Prodr.** = DE CANDOLLE A.P. Prodromus systematis naturalis regni vegetabilis, sive enumeratio contracta ordinum, generum, specierumque plantarum hucusque cognitarum, juxta methodi naturalis normas digesta. Paris, Strasbourg, London. 17 vols. 1823-1873.

**Racc. Bot. Miss. Consolata Kenya** = CHIOVENDA E. Raccolte Botaniche (Embryophyta Diploidalia) fatte dai Missionari della Consolata nel Kenya. Modena. Tip. Ferraguti & C. 1935.

**Result. Sc. Miss. Stefanini-Paoli Somalia Ital. 1** = CHIOVENDA E. Resultati Scientifici della Missione Stefanini-Paoli nella Somalia Italiana. Volume 1. Le Collezioni Botaniche. Firenze. Galletti e Cacci. 1916.

**Ric. bot. fieni Imp.** = FIORI A. & ROCCHETTI G. Ricerche botaniche e chimico-bromatologiche su alcuni fieni dell'Impero. Relazioni e Monografie Agrario-Coloniali n. 58. Firenze. Regio Istituto Agronomico per L'Africa Italiana. 1940.

**Ros. monogr.** = LINDLEY J. Rosarum monographia; or, a botanical history of roses. To which is added, an appendix, for the use of cultivators, in which the most remarkable garden varieties are systematically arranged. With nineteen plates. London. 1820.

**Rumphia** = BLUME C.L. Rumphia, sive commentationes Botanicae imprimis de plantis Indiae orientalis, tum penitus incognitis tum quae in libris Rheedii, Rumphii, Roxburghii, Wallichii, aliorum, recensentur. Scripsit C. L. Blume Cognomine Rumphius. Leiden, Amsterdam, Brussel, Düsseldorf, Paris. 4 vols. 1835-1848 (-1849).

**Sert. somal.** = Sertulum somalense. Mission G. Révoil aux pays Comalis. Faune et flore. Paris. 1882.

**Sp. pl.** = VON LINNAEUS C. Species plantarum, exhibentes plantas rite cognitas, ad genera relatas, cum differentiis specificis, nominibus trivialibus, synonymis selectis, loci natalibus, secundum systema sexuale digestas. 2 vols. Holmiae. 1753.

**Sp. Pl. IV** = WILLDENOW C.L. Caroli a Linné Species plantarum exhibente plantas rite cognitas ad genera relatas cum differentiis specificis, nominibus trivialibus synonymis selectis, loci natalibus secundum systema sexuale digestas. Editio quarta, post Reichardianum quinta adjectis vegetabilibus hucusque cognitis curante Carolo Ludovico Willdenow. Berolini. 6 vols. 1797-1825.

**Stirp. nov.** = L'HÉRITIER DE BRUTELLE C.-L. Stirpes novae aut minus cognitae, quas descriptionibus et iconibus illustravit Carolus-Ludovicus L'Héritier, Dom. de Brutelle, in Aula Juvaminum Parisiensi, Regis consiliarius. Parisiis. 1784 [1785-1805].

**Symb. Bot.** = VAHL M. *Symbolae botanicae, sive plantarum, tam earum, quas in itinere, imprimis orientali, collegit Petrus Forskål, quam aliarum, recentium detectarum, exactiores descriptiones, nec non observationes circa quasdam plantas dudum cognitas.* Vol. 1-3. Haunie. 1790-1794.

**Syn. Pl.** = PERSOON C.H. *Synopsis plantarum, seu enchiridium botanicum complectens enumerationem systematicam specierum hucusque cognitorum Pars prima [2 (1): partis secundae sectio prima, 2 (2): pars secunda].* Parisiis lutetiorum & Tubingae. 2 vols. 1805-1807.

**Syst. Veg.** = ROEMER J.J. & SCHULTES J.A. *Caroli a Linné Systema Vegetabilium secundum classes ordines genera species cum characteribus, differentiis et synonymiis. Editio nova, speciebus inde ab editione xv detectis aucta et locupletata.* Stuttgardiae.

**Tabl. Encycl.** = DE LAMARCK J.B.A.P. & POIRET J.L.M. *Tableau encyclopédique et méthodique des trois règnes de la nature. Botanique.* Paris. 3 Tomes (6 volumes). 1791-1823.

**Tent. Fl. Abyss.** = RICHARD A. *Tentamen Florae Abyssinicae seu Enumeratio Plantarum hucusque in plerisque abyssiniai provinciis detectarum.* Vol. 1-2. Parigi. 1847 and 1851.

**Veg. Erde** = ENGLER H.G.A. & DRUDE C.G.O. *Die Vegetation der Erde. Sammlung pflanzengeographischer Monographien herausgegeben von A. Engler und O. Drude.* Leipzig. 15 vols. 1896-1923.

**Voy. Abyssinie** = DELILE A. *Voyage en Abyssinie, dans les provinces du Tigré, du Samen et de l'Amhara par MM. Ferret et Galinier.* Paris. Vol. 3 part 2. 1847.

**Wiss. Erg. deut. Zentr.-Afr. Exped., Bot.** = MILDBRAED G.W.J. *Wissenschaftliche Ergebnisse der Deutschen Zentral-Afrika-Expedition 1907-1908 unter Führung Adolf Friedrichs, Herzogs zu Macklenburg.* Band ii. Botanik herausgegeben von Dr. J. Mildbraed, Berlin mit 78 Tafeln. Leipzig. 1914.

**World Check. Bibl. Euphorbiaceae (and Pandaceae)** = GOVAERTS R., FRODIN D.G. & RADCLIFFE-SMITH A. *World Checklist and Bibliography of Euphorbiaceae (and Pandaceae).* Vols. 4. The Royal Botanic Gardens, Kew. 2000.

## LEGEND

Families, genera and species are in alphabetical order. Correct names (or currently used names) adopted by major Floras are printed in **bold-face**. Synonyms (homotypic or heterotypic) are printed in *italics*.

*Commiphora dancaliensis* Chiov.<sup>1</sup>, Ann. (=) **Commiphora kua** (Royle) Vollesen<sup>6</sup>,  
Bot. (Rome) 13 (3): 402 (1915)<sup>2</sup>.  
Holotypus: Pappi 36<sup>3</sup>.  
<sup>4</sup> Eritrea.  
Chiovenda in Fl. Somalia II: 64, ♀ 68  
(1932) published *Commiphora assaortensis*,  
based on the same type of *Commiphora  
dancaliensis*<sup>5</sup>.  
Typi: Johnston s. nr.; Salt s. nr. (BM  
syntypi)<sup>8</sup>.  
Ref.: Thulin M. 1999. Fl. of Somalia 2:  
214, ♀ 216<sup>9</sup>.  
Link: *Commiphora habessinica*  
(O.Berg) Engl. Vollesen, Fl. of Ethiopia  
3: 471 (1989)<sup>10</sup>.

### LEFT COLUMN

- <sup>1</sup> Name of the type specimens kept in the Tropical Herbarium of Florence.  
<sup>2</sup> Reference to the original publication (protologue). In certain cases, a second number preceded by ♀ refers to an illustration in the publication.  
<sup>3</sup> Type(s) kept in FT. When the type is classified as isotype or isosyntype we include (if possible) the Herbaria where the holotype or syntypes are kept. Specimens from the Puccioni & Stefanini collection bear two numbers, one of which is printed between square brackets [ ]. Specimens from the Ruspoli & Riva collection often bear three numbers, one of which is printed between round brackets ( ).  
<sup>4</sup> Country of origin of the type specimen(s).  
<sup>5</sup> Occasional notes.

### CENTRAL COLUMN

- (=): heterotypic synonyms  
(≡): homotypic synonyms

### RIGHT COLUMN

- <sup>6</sup> Correct name (or currently used name) to which the synonym in the left column is to be referred.  
<sup>7</sup> Reference to the original publication of the correct name.  
<sup>8</sup> Type(s) and (if possible) Herbaria where they are kept.  
<sup>9</sup> Bibliographic reference validating the name in use, the type and the corresponding synonym.  
<sup>10</sup> A synonym of the correct name. In the publication following the name, the type in the left column is given as a synonym of this taxon.

### SPECIAL SYMBOLS

- \* Refers to plants from the Consolata Herbarium in Torino now preserved in FT.  
? Refers to any uncertainty due to incorrect or lacking data.

## AIZOACEAE

**Delosperma sp.** = **Pappi 2344**, M.G. Gilbert, H. Hartmann & S. Edwards, Fl. of Ethiopia and Eritrea 2 (1): 242 (2000).

Exsicc. (pro typus): Pappi 2344.  
Eritrea.

*Nitraria retusa* (Forssk.) Asch. subsp. *euretusa* (=) Chiov., Fl. Somalia: 118 (1929).

Holotypus: Puccioni & Stefanini 699 [773].  
Somalia.

Chiovenda quotes this taxon in the family Zygophyllaceae.

*Tetragonia chisimajensis* Chiov., Fl. Somalia II: (=) 226, ♀ 227 (1932).

Holotypus: Gorini 437.  
Somalia.

**Tetragonia retusa** Thulin, Nordic J. Bot. 13 (2): 165, ♀ 166 (1993).

Holotypus/Isotypus: Hemming 3423.  
Somalia.

*Tetragonia somalensis* Engl. ex G.Schellenb., Bot. (=) Jahrb. Syst. 48: 502 (1912).

Syntypi: Robecchi-Bricchetti 31, 507.  
Ethiopia and Somalia.

*Trianthema crystallina* (Forssk.) Vahl forma *obscura* Armari, Annuario Reale Ist. Bot. Roma 8 (1): 146 (1903).

Syntypi: Terracciano 51 bis, Cocastelli 30, Terracciano & Pappi 60, Ragazzi & Pappi 1225, Pappi 42.

Eritrea.  
In Flora of Ethiopia and Eritrea the syntype 'Cocastelli 30' is quoted as 'Cocastelli 31'.

*Trianthema crystallina* (Forssk.) Vahl forma *suberosa* A.Terracc., Annuario Reale Ist. Bot. Roma 5 (3): 108 (1894).

Syntypus: Terracciano 187.  
Eritrea.

*Trianthema sennii* Chiov., Fl. Somalia II: 225, ♀ (=) 225 (1932).

Holotypus: Senni 666.  
Somalia.

**Tribulocarpus dimorphanthus** (Pax) S.Moore, J. Bot. 59: 288 (1921).

Typus: Marloth 1249 (B holotypus; PRE isotypus).

Ref.: El Hadidi N.M. 1978. Webbia 33 (1): 48.

**Trianthema portulacastrum** L., Sp. Pl.: 223 (1753).

Typus: Hermann (BM-SL lectotypus).

Ref.: Gilbert M.G. in Thulin M. 1993. Fl. of Somalia 1: 114.

**Tribulocarpus dimorphanthus** (Pax) S.Moore, J. Bot. 59: 288 (1921).

Typus: Marloth 1249 (B holotypus; PRE isotypus).

Ref.: Gilbert M.G. in Thulin M. 1993. Fl. of Somalia 1: 117.

**Trianthema crystallina** (Forssk.) Vahl, Symb. Bot. 1: 32 (1790).

Typus: Forsskål 536 (C syntypus).

Ref.: Gilbert M.G., Hartmann H. & Edwards S. in Edwards S., Mesfin Tadesse, Sebsebe Demissew & Hedberg I. 2000. Fl. of Ethiopia and Eritrea 2 (1): 244.

**Trianthema crystallina** (Forssk.) Vahl, Symb. Bot. 1: 32 (1790).

Typus: Forsskål 536 (C syntypus).

Ref.: Gilbert M.G., Hartmann H. & Edwards S. in Edwards S., Mesfin Tadesse, Sebsebe Demissew & Hedberg I. 2000. Fl. of Ethiopia and Eritrea 2 (1): 244.

**Zaleya pentandra** (L.) C.Jeffrey, Kew Bull. 14: 238 (1960).

Typus: cultivated at Uppsala from seeds sent by Forsskål from Arabia (LINN lectotypus).

Ref.: Gilbert M.G. in Thulin M. 1993. Fl. of Somalia 1: 115, ♀ 115.

## AMARANTHACEAE

- Achyranthes aspera* L. var. *argentea* (Lam.) Boiss. (=) *Achyranthes aspera* L. var. *sicula* L., Sp. Pl.: 204 (1753).  
 forma *suffruticosa* Fiori, Nuovo Giorn. Bot. Ital. n. s. 19: 438 (1912).  
 Syntypi: Fiori 52, 954.  
 Eritrea.
- Aerva arachnoidea* Gand., Bull. Soc. Bot. France 69: 350 (1922).  
 Isotypus: Fiori 50.  
 (LY holotypus. Townsend, Fl. of Somalia 1: 163. 1993).  
 Somalia.
- Aerva lanata* (L.) Juss. ex Schult. var. *oblongata* (Asch., in Schweinf., Beitr. Fl. Aethiop.: 174 (1867)).  
 Holotypus: Schimper 300.  
 Ethiopia.  
 Cufodontis, in Bull. Jard. Bot. État 23 (3-4), Suppl.: 68 (1953) quotes the type adding the number 300.
- Amaranthus paolii* Chiov., Nuovo Giorn. Bot. Ital. n. s. 34: 845 (1927).  
 Holotypus: Paoli 25.  
 Somalia.
- Centema stefaninii* Chiov., Result. Sc. Miss. Stefanini-Paoli Somal. Ital. I: 149, ♦ t. 17 f. A (1916).  
 Holotypus: Paoli 357.  
 Somalia.  
 The date on the holotype label (23 VI 1913) differs from the date quoted in the protologue (24 VI 1913).
- Centemopsis micrantha* Chiov., Result. Sc. Miss. Stefanini-Paoli Somal. Ital. I: 150 (1916).  
 Lectotypus: Paoli 734 (Townsend, Publ. Cairo Univ. Herb. 7 & 8: 69. 1977).  
 Syntypi: Paoli 622; Stefanini 1227.  
 Somalia.
- Chionotrix hyposericea* Chiov., Result. Sc. Miss. Stefanini-Paoli Somal. Ital. I: 151 (1916).  
 Holotypus: Paoli 114.  
 Somalia.
- Cyathula cordifolia* Hochst. ex Chiov., Ann. Bot. (Rome) 9 (2): 130 (1911).  
 Holotypus/Isotypus: Chiovenda 953.  
 Ethiopia.
- (=) *Aerva lanata* (L.) Juss. ex Schult., Syst. Veg. 5: 564 (1819).  
 Typus: Herb. Linnaeus 290.6 (LINN lectotypus).  
 Ref.: Townsend C.C. in Thulin M. 1993. Fl. of Somalia 1: 163, ♦ 162.
- (=) *Aerva lanata* (L.) Juss. ex Schult., Syst. Veg. 5: 564 (1819).  
 Typus: Herb. Linnaeus 290.6 (LINN lectotypus).  
 Ref.: Townsend C.C. in Polhill R.M. 1985. Fl. Trop. E. Afr., Amaranthaceae: 85.
- Amaranthus graecizans* L. subsp. *graecizans*, Sp. Pl.: 990 (1753).  
 Typus: Herb. Linnaeus 1117.3 (LINN lectotypus).  
 Ref.: Townsend C.C. in Thulin M. 1993. Fl. of Somalia 1: 144.
- Eriostylos stefaninii* (Chiov.) C.C.Towns., Kew Bull. 34 (2): 237, ♦ 238 (1979).  
 Ref.: Townsend C.C. in Thulin M. 1993. Fl. of Somalia 1: 152, ♦ 151.
- (=) *Dasysphaera hyposericea* (Chiov.) C.C.Towns., Kew Bull. 38 (3): 346 (1983).  
 Ref.: Townsend C.C. in Thulin M. 1993. Fl. of Somalia 1: 155, ♦ t. 2 E.
- (=) *Cyathula polyccephala* Baker, Bull. Misc. Inform. Kew 1897: 278 (1897).  
 Typus: Thomson s. nr. (K holotypus).  
 Ref.: Townsend C.C. in Edwards S., Mesfin Tadesse, Sebsebe Demissew & Hedberg I. 2000. Fl. of Ethiopia and Eritrea 2 (1): 317, ♦ 318.

## AMARANTHACEAE

- Cyathula paniculata* Hauman, nom. illeg., Bull. Jard. Bot. État 18: 109 (1946). (=) **Cyathula coriacea** Schinz, Vierteljahrsschr. Naturf. Ges. Zürich 76: 140 (1931).  
Exsicc. (pro syntypi): Gorini 78, 91.  
Somalia.
- Cyathula coriacea** Schinz, Vierteljahrsschr. Naturf. Ges. Zürich 76: 140 (1931).  
Typus: F. Thomas 79 (BM, Z isotypus).  
Ref.: Townsend C.C. in Thulin M. 1993. Fl. of Somalia 1: 153, ♦ 152.
- Dasysphaera alternifolia** Chiov., Fl. Somalia: 287 (1929).  
Holotypus: Puccioni & Stefanini 18 [18].  
Somalia.
- Dasysphaera robecchii** Lopr., Bot. Jahrb. Syst. 27: 52 (1899).  
Holotypus: Robecchi-Bricchetti 402.  
Somalia.
- Pleuropterantha revoilii** Franch. var. *rhodoptera* Chiov., Fl. Somalia: 290 (1929). (=)  
Holotypus: Puccioni & Stefanini 899 [989].  
Somalia.
- Pleuropterantha revoilii** Franch., in Revoil, Sert. somal.: 60, ♦ t. 5 (1882).  
Typus: Révoil 117 (P holotypus).  
Ref.: Townsend C.C. in Thulin M. 1993. Fl. of Somalia 1: 148.
- Pleuropterantha undulatifolia** Chiov., Result. Sc. Miss. Stefanini-Paoli Somal. Ital. I: 148, ♦ t. 16 (1916).  
Holotypus: Paoli 56.  
Somalia.
- Pseudodigera pollacci** Chiov., Fl. Somalia III, Atti Ist. Bot. Univ. Pavia ser. 4, 7: 149, ♦ t. 9 (1936).  
Lectotypus: Ciferri 96 (Townsend, Fl. Trop. E. Afr., Amaranthaceae: 39. 1985).  
Syntypus: Pollacci & Maffei 4.  
Somalia.
- Digera muricata** (L.) Mart. subsp. **trinervis** C.C.Towns. var. **trinervis**, Kew Bull. 28 (1): 141 (1973).  
Typus: Faulkner 1442 (K holotypus).  
Ref.: Townsend C.C. in Thulin M. 1993. Fl. of Somalia 1: 146.
- Psilotrichum ochradenoides** Chiov., Fl. Somalia: 289 (1929). (=)  
Holotypus: Robecchi-Bricchetti 397.  
Somalia.  
In the protologue there is ‘Robecchi-Bricchetti 379’ instead of ‘Robecchi-Bricchetti 397’.
- Psilotrichum robecchii** Lopr., Bot. Jahrb. Syst. 27: 60 (1899). (=)  
Holotypus: Robecchi-Bricchetti 401.  
Somalia.  
In Fl. of Somalia instead of ‘Robecchi-Bricchetti 401’ there is ‘Robecchi-Bricchetti 461’.
- Psilotrichum ruspolii** Lopr., Bot. Jahrb. Syst. 27: 59 (1899). (=)  
Holotypus: Ruspoli & Riva 1467.  
Kenya.
- Neocentema robecchii** (Lopr.) Schinz, Vierteljahrsschr. Naturf. Ges. Zürich 56: 248 (1911).  
Ref.: Townsend C.C. in Thulin M. 1993. Fl. of Somalia 1: 146, ♦ 147.
- Lopriorea ruspolii** (Lopr.) Schinz, Vierteljahrsschr. Naturf. Ges. Zürich 56: 251 (1911).  
Ref.: Townsend C.C. in Thulin M. 1993. Fl. of Somalia 1: 150, ♦ 150.
- Psilotrichum sericeovillosum** Chiov., Agric. Colon. 20 (3): 103 (1926). (=)  
Lectotypus: Gorini 28 (Townsend, Fl. Trop. E. Afr., Amaranthaceae: 94. 1985).  
Syntypi: Gorini 63, 76.  
Somalia.
- Psilotrichum sericeum** (Roxb.) Dalzell, in Dalzell & Gibson, Bombay Fl.: 216 (1861).  
Typus: Herb. Smith 424.4 (LINN lectotypus).  
Ref.: Townsend C.C. in Thulin M. 1993. Fl. of Somalia 1: 157, ♦ 156.

## AMARANTHACEAE

*Psilotrichum sericeovillosum* Chiov. var. (=) *Psilotrichum sericeum* (Roxb.) Dalzell, in

*glabratum* Chiov., Fl. Somalia II: 379 (1932).

Holotypus: Gorini 198.

Somalia.

Dalzell & Gibson, Bombay Fl.: 216 (1861).

Typus: Herb. Smith 424.4 (LINN lectotypus).

Ref.: Townsend C.C. in Thulin M. 1993. Fl. of

Somalia 1: 157, ♦ 156.

***Psilotrichum tomentosum*** Chiov., Fl. Somalia: 288 (1929).

Lectotypus: Puccioni & Stefanini 636 [700] (Verdcourt, Kew Bull. 17 (3): 494. 1964).

Syntypi: Puccioni & Stefanini 385 [436], 564 [620].

Somalia.

*Psilotrichum villosiflorum* Lopr., Bot. Jahrb. Syst. (=) 27: 59 (1899).

Holotypus: Riva 1455.

Ethiopia.

***Psilotrichum gnaphalobryum*** (Hochst.) Schinz, Vierteljahrsschr. Naturf. Ges. Zürich 57: 550 (1912).

Typus: Schimper Iter unio 1837 n. 785 (K isolectotypus).

Ref.: Townsend C.C. in Thulin M. 1993. Fl. of Somalia 1: 158.

*Pupalia atropurpurea* (Lam.) Moq. var. (=) *intermedia* Chiov., Result. Sc. Miss. Stefanini-Paoli Somal. Ital. I: 149 (1916).

Lectotypus: Paoli 1145 (Townsend, Kew Bull. 34 (1): 139. 1979).

Syntypus: Stefanini 1213.

Somalia.

The exsiccatum Paoli 471 bis (pro syntype) of 'Pupalia atropurpurea (Lam.) Moq. var. *intermedia* Chiov.' must be referred to 'Pupalia lappacea (L.) Juss. var. *glabrescens* C.C.Towns.' (Fide Townsend, Kew Bull. 34 (1): 140. 1979).

***Pupalia robecchii*** Lopr., Bot. Jahrb. Syst. 27: 55 (1899).

Holotypus: Robecchi-Bricchetti 491.

Somalia.

*Pupalia sericea* Fiori, Bull. Soc. Bot. Ital. 1912: (=) 136 (1912).

Holotypus: Fiori 16.

Somalia.

***Pupalia lappacea*** (L.) Juss. var. *velutina* (Moq.) Hook.f., Fl. Brit. India 4: 724 (1885).

Typus: Wallich Herb. 6935 A (K isotypus).

Ref.: Townsend C.C. in Thulin M. 1993. Fl. of Somalia 1: 153, ♦ 154.

*Sericostachys scandens* Gilg & Lopr. var. *major* Chiov., Atti Reale Accad. Ital., Mem. Cl. Sci. Fis., Ser. 7, 11 (2): 55 (1940).

Holotypus/Isotypus: Giordano 2468.

Ethiopia.

***Sericostachys scandens*** Gilg & Lopr., Bot. Jahrb. Syst. 27: 51 (1899).

Typus: Zenker 1420 (K isolectotypus).

Ref.: Townsend C.C. in Edwards S., Mesfin Tadesse, Sebsebe Demissew & Hedberg I. 2000. Fl. of Ethiopia and Eritrea 2 (1): 312, ♦ 312.

## ANNONACEAE

- Artobotrys concolor* Pellegr., Bull. Soc. Bot. France 94: 256 (1947).  
Isotypus: Le Testu 6071.  
(P holotypus. Le Thomas, Fl. du Gabon 16: 145. 1969).  
Gabon.
- Mkilua fragrans* Verdc., Kew Bull. 24 (3): 451, ♀ 450 (1970).  
Isotypus: Drummond & Hemsley 3803.  
(K holotypus. Verdcourt, Kew Bull. 24 (3): 451. 1970).  
Kenya.
- Monodora somalensis* Chiov., Fl. Somalia II: 2, ♀ 3 (1932).  
Holotypus: Senni 228.  
Somalia.
- Pachypodanthium gossweileri* Exell & Mendonça, (= J. Bot. 74, Suppl. 1: 14 (1936).  
Isotypus: Gossweiler 10417.  
(BM holotypus. Exell & Mendonça, J. Bot. 74, Suppl. 1: 14. 1936).  
Angola.
- Uvaria microstyla* Chiov., Fl. Somalia II: 1, ♀ 1 (= 1932).  
Syntypi: Gorini 377, 416, 417.  
Somalia.
- Uvariastrum germainii** Boutique, Bull. Jard. Bot. État 21 (1-2): 120 (1951).  
Isotypus: Germain 213 (BR holotypus).  
Zaire.

## ARISTOLOCHIACEAE

- Aristolochia benadiriana* Fiori, Bull. Soc. Bot. Ital. 1912 (6): 135 (1912).  
Holotypus: Alf. Fiori 17.  
Somalia.
- Aristolochia benadiriana* Fiori var. *longilabia* (= Chiov., Result. Sc. Miss. Stefanini-Paoli Som. Ital. 1: 153 (1916).  
Holotypus: Paoli 167.  
Somalia.
- Aristolochia bracteolata* Lam., Encyc. 1: 258 (1783).  
Typus: Sonnerat s. nr. (P holotypus, microfiche).  
Ref.: Thulin M. 1993. Fl. of Somalia 1: 29.
- Aristolochia bracteolata* Lam., Encyc. 1: 258 (1783).  
Typus: Sonnerat s. nr. (P holotypus, microfiche).  
Ref.: Thulin M. 1993. Fl. of Somalia 1: 29.

## ARISTOLOCHIACEAE

- Aristolochia bracteata* Retz. forma *altissima* (=) ***Aristolochia bracteolata*** Lam., Encyc. 1: 258  
A.Terracc., Annuario Reale Ist. Bot. Roma 5 (3):  
99 (1894).  
Holotypus: Terracciano 25.  
Eritrea.
- Typus: Sonnerat s. nr. (P holotypus, microfiche).  
Ref.: Verdcourt B. in Edwards S., Mesfin  
Tadesse, Sebsebe Demissew & Hedberg I. 2000.  
Fl. of Ethiopia and Eritrea 2 (1): 54, ♦ 55.

## BALANITACEAE

- Balanites gilletii* Cufod., Senckenberg. Biol. 39 (=)  
(5/6): 302, ♦ t. 37 f. 3, 4 (1958).  
Isotypus: Gillett 15069.  
(W holotypus. Cufodontis, Senckenberg. Biol.  
39 (5/6): 302. 1958).  
Ethiopia.
- Balanites racemosa* Chiov., Fl. Somalia: 119, ♦ t. VII f. 1 (1929).  
Holotypus: Puccioni & Stefanini 1025 [1129].  
Somalia.
- Balanites scillin* Chiov., Fl. Somalia: 120, ♦ t. IX (=)  
f. 3 (1929).  
Syntypi: Puccioni & Stefanini 475 [527], 491  
[543], 514 [567], 662 [726], 772 [856].  
Somalia.
- Balanites somalensis* Mildbr. & Schltr., Bot. (≡)  
Jahrb. Syst. 51: 159, ♦ 161 (1913).  
Neotypus: Ruspoli & Riva 1026 (Sands, Fl. of  
Ethiopia 3: 436. 1989).  
Somalia.
- Balanites somalensis* Mildbr. & Schltr. var. (=)  
*cineredo-corticata* Fiori ex Chiov., Result. Sc.  
Miss. Stefanini-Paoli Somalia Ital. 1: 39 (1916).  
Holotypus: Stefanini & Paoli 834.  
Somalia.
- Balanites rotundifolia*** (Tiegh.) Blatt. var.  
***rotundifolia***, Rec. Bot. Surv. India 8 (1): 109  
(1919).  
Typi: Courbon; Faurot (P syntypi).  
Ref.: Sands M.J.S. in Hedberg I. & Edwards S.  
1989. Fl. of Ethiopia 3: 436, ♦ 435.
- Balanites aegyptiaca*** (L.) Delile var. ***pallida***  
Sands, Kew Bull. 38 (1): 40 (1983).  
Typus: Glover & Gilliland 447 (K holotypus;  
BM, EA isotypi).  
Ref.: Sands M.J.S. & Thulin M. in Thulin M.  
1999. Fl. of Somalia 2: 169, ♦ 170.
- Balanites rotundifolia*** (Tiegh.) Blatt., Rec. Bot.  
Surv. India 8: 109 (1919).  
Typi: Courbon; Faurot (P syntypi).  
Ref.: Sands M.J.S. & Thulin M. in Thulin M.  
1999. Fl. of Somalia 2: 171, ♦ 170.
- Balanites pedecellaris*** Mildbr. & Schltr. subsp.  
***somalensis*** (Mildbr. & Schltr.) Sands, Kew Bull.  
38 (1): 40 (1983).  
Ref.: Sands M.J.S. in Hedberg I. & Edwards S.  
1989. Fl. of Ethiopia 3: 436, ♦ 435.
- Balanites pedecellaris*** Mildbr. & Schltr. subsp.  
***somalensis*** (Mildbr. & Schltr.) Sands, Kew Bull.  
38 (1): 40 (1983).  
Typus: Ellenbeck 1987 (B holotypus destr.);  
Ruspoli & Riva 1026 (FT neotypus).  
Ref.: Sands M.J.S. & Thulin M. in Thulin M.  
1999. Fl. of Somalia 2: 171, ♦ 170.

## BURSERACEAE

- Boswellia microphylla*** Chiov., Ann. Bot. (Rome) (=) 13 (3): 404 (1915).  
 Holotypus: Paoli 908.  
 Somalia.
- Boswellia neglecta*** S.Moore, J. Bot. 15: 67, ♀ t. 185 (1877).  
 Typus: Hildebrandt 1508 (BM holotypus).  
 Ref.: Thulin M. 1999. Fl. of Somalia 2: 186, ♀ 186.
- Boswellia multifoliolata*** Engl., Annuario Reale Ist. Bot. Roma 7 (1): 16 (1897).  
 Syntypi: Robecchi-Bricchetti 680, 681.  
 Somalia.
- Boswellia neglecta*** S.Moore, J. Bot. 15: 67, ♀ t. 185 (1877).  
 Typus: Hildebrandt 1508 (BM holotypus).  
 Ref.: Thulin M. 1999. Fl. of Somalia 2: 186, ♀ 186.
- Boswellia nana*** Hepper, Hooker's Icon. Pl. 7 (4): t. 3676, ♀ t. 3676 (1971).  
 Isotypus: Smith & Lavranos 323.  
 (K holotypus. Hepper, Hooker's Icon. Pl. 7 (4): t. 3676. 1971).  
 Yemen, Socotra.
- Boswellia pirottae*** Chiov., Ann. Bot. (Rome) 9 (1): 53 (1911).  
 Syntypi: Chiovenda 662, 747, 3193.  
 Ethiopia.
- Boswellia popoviana*** Hepper, Hooker's Icon. Pl. 7 (4): t. 3677, ♀ t. 3677 (1971).  
 Isotypus: Smith & Lavranos 364.  
 (K holotypus. Hepper, Hooker's Icon. Pl. 7 (4): t. 3677. 1971).  
 Yemen, Socotra.
- Boswellia rivae*** Engl., Annuario Reale Ist. Bot. Roma 7 (1): 16 (1897).  
 Holotypus: Riva 842.  
 Ethiopia.
- Commiphora agar*** Chiov., Fl. Somalia II: 119, ♀ 121 (1932).  
 Holotypus: Paoli 930.  
 Somalia.
- Commiphora alata*** Chiov., Result. Sc. Miss. Stefanini-Paoli Somalia Ital. 1: 42 (1916).  
 Typus: Paoli 1126 (FT holotypus).  
 Ref.: Thulin M. 1999. Fl. of Somalia 2: 204.
- Commiphora alata*** Chiov., Result. Sc. Miss. Stefanini-Paoli Somalia Ital. 1: 42 (1916).  
 Holotypus: Paoli 1126.  
 Somalia.
- Commiphora alaticaulis*** J.B.Gillett & Vollesen, Kew Bull. 40 (1): 52, ♀ 53 (1985).  
 Isotypus: Hemming 467.  
 (K holotypus. Vollesen, Kew Bull. 40 (1): 52. 1985).  
 Kenya.
- Commiphora ancistrophora*** Chiov., Fl. Somalia II: 111, ♀ 111 (1932).  
 Syntypus: Confalone 31.  
 Somalia.  
 The syntype 'Confalone 89' is not present in FT (destroyed?).
- Commiphora gileadensis*** (L.) C.Chr., Dansk Bot. Ark. 4 (3): 18 (1922).  
 Typi: Forsskål 935, 936, 937 (C syntypi).  
 Ref.: Thulin M. 1999. Fl. of Somalia 2: 221, ♀ 222.

## BURSERACEAE

- Commiphora anfractuosa* Chiov., Fl. Somalia II: (=) 99, ♀ 100 (1932).  
 Holotypus: Paoli 1335.  
 Somalia.
- Commiphora anglosomiae* Chiov., Bull. Misc. Inform. Kew 1941 (2): 132 (1941).  
 Isotypus: Gillett 4632.  
 (K holotypus. Hutchinson & Bruce, Bull. Misc. Inform. Kew 1941 (2): 132. 1941).  
 Somalia.
- Commiphora berardellii** Chiov., Atti Reale Accad. Italia, Mem. Cl. Sci. Fis., Ser. 7, 11 (2): 22 (1940).  
 Holotypus: Reghini 5.  
 Ethiopia.
- Commiphora bruceae* Chiov., Bull. Misc. Inform. Kew 1941 (2): 133 (1941).  
 Isotypus: Gillett 4102.  
 (K holotypus. Hutchinson & Bruce, Bull. Misc. Inform. Kew 1941 (2): 133. 1941).  
 Somalia/Ethiopia boundary.
- Commiphora cassan* Chiov., Fl. Somalia II: 122, ♀ 123 (1932).  
 Syntypi: Senni 779, 828.  
 Somalia.
- Commiphora corrugata** J.B.Gillett & Vollesen, Kew Bull. 40 (1): 59 (1985).  
 Isotypus: Friis, Mesfin Tadesse & Vollesen 3127.  
 (K holotypus. Vollesen, Kew Bull. 40 (1): 59. 1985).  
 Ethiopia.
- Commiphora crenato-lobata* Chiov., Bull. Misc. Inform. Kew 1941 (2): 133 (1941).  
 Isotypus: Gillett 4155.  
 (K holotypus. Hutchinson & Bruce, Bull. Misc. Inform. Kew 1941 (2): 133. 1941).  
 Somalia /Ethiopia border.
- Commiphora cuspidata* Chiov., Misc. Bot. Inform. Kew 1941 (2): 134 (1941).  
 Isotypus: Gillett 4385.  
 (K lectotypus. Thulin, Fl. of Somalia 2: 197. 1999).  
 Somalia.
- Commiphora dancaliensis* Chiov., Ann. Bot. (Rome) 13 (3): 402 (1915).  
 Holotypus: Pappi 36.  
 Eritrea.  
 Chiovenda in Fl. Somalia II: 64, ♀ 68 (1932)  
 published ‘*Commiphora assaortensis*’, based on  
 the same type of *Commiphora dancaliensis*.
- Commiphora gileadensis** (L.) C.Chr., Dansk Bot. Ark. 4 (3): 18 (1922).  
 Typi: Forsskål 935, 936, 937 (C syntypi).  
 Ref.: Thulin M. 1999. Fl. of Somalia 2: 221, ♀ 222.
- Commiphora serrulata** Engl., Bot. Jahrb. Syst. 15: 96 (1893).  
 Typus: Hildebrandt 1511 (B holotypus destr.; K fragment and photo; FT photo).  
 Ref.: Thulin M. 1999. Fl. of Somalia 2: 214.
- Commiphora kua** (Royle) Vollesen, Nordic J. Bot. 4 (1): 37 (1984).  
 Typi: Johnston s. nr.; Salt s. nr. (BM syntypi).  
 Ref.: Thulin M. 1999. Fl. of Somalia 2: 214, ♀ 216.
- Commiphora gileadensis** (L.) C.Chr., Dansk Bot. Ark. 4 (3): 18 (1922).  
 Typi: Forsskål 935, 936, 937 (C syntypi).  
 Ref.: Thulin M. 1999. Fl. of Somalia 2: 221, ♀ 222.
- Commiphora truncata** Engl., Bot. Jahrb. Syst. 34: 309 (1904).  
 Typus: Hildebrandt 893 c (B holotypus, destr.).  
 Ref.: Thulin M. 1999. Fl. of Somalia 2: 204.
- Commiphora myrrha** (Nees) Engl., in A.DC., Monogr. Phan. 4: 10 (1883).  
 Typus: Erhemberg (B holotypus, destr.; Nees, Pl. Off., t. 357 neotypus).  
 Ref.: Thulin M. 1999. Fl. of Somalia 2: 197, ♀ 198.
- Commiphora kua** (Royle) Vollesen, Nordic J. Bot. 4 (1): 37 (1984).  
 Typi: Johnston s. nr.; Salt s. nr. (BM syntypi).  
 Ref.: Thulin M. 1999. Fl. of Somalia 2: 214, ♀ 216.  
 Link: *Commiphora habessinica* (O.Berg) Engl. Vollesen, Fl. of Ethiopia 3: 471 (1989).

## BURSERACEAE

*Commiphora danduensis* J.B.Gillett, in Polhill R.M., Fl. Trop. E. Afr., Burseraceae: 39, ♦ 52 (1991).

Isotypus: Gillett 12558.

(K holotypus. Gillett, Fl. Trop. E. Afr., Burseraceae: 39. 1991).

Kenya.

*Commiphora flabellulifera* Chiov., Chiov., Result. Sc. Miss. Stefanini-Paoli Somalia Ital. 1: 43, ♦ t. 5 f. B (1916), as “flahellulifera”.

Syntypi: Paoli 781, 915, 949.  
Somalia.

*Commiphora gilletii* Chiov., Bull. Misc. Inform. (= Kew 1941 (2): 135 (1941)).

Isotypus: Gillett 4817.

(K holotypus. Hutchinson & Bruce, Bull. Misc. Inform. Kew 1941 (2): 135. 1941).  
Somalia.

*Commiphora gorinii* Chiov., Fl. Somalia II: 108, ♦ 109 (1932).

Syntypi: Gorini 31, 32, 144.  
Somalia.

Thulin (Fl. of Somalia 2: 197. 1999) omits the syntype Gorini 32.

*Commiphora gurreh* Engl., in Engler & Prantl, Nat. Pflanzenfam. III, 4: 253 (1896) (nomen); Annuario Reale Ist. Bot. Roma 7 (1): 17 (1897).

Isosyntypi: Robecchi-Bricchetti 672, 673.  
(B syntypi destr. Thulin, Fl. of Somalia 2: 214. 1999).

Somalia.

*Commiphora habessinica* (O.Berg) Engl. var. *crenulata* A.Terracc., Annuario Reale Ist. Bot. Roma 5 (3): 111 (1894).

Holotypus: Terracciano 50.  
Eritrea.

*Commiphora habessinica* (O.Berg) Engl. var. *grossedentata* Chiov., Atti Reale Accad. Italia, Mem. Cl. Sci. Fis., Ser. 7, 11 (2): 22 (1940).

Holotypus: Reghini 17.  
Ethiopia.

*Commiphora hirtella* Chiov., Fl. Somalia II: 110, (= ♦ 110 (1932)).

Holotypus: Senni 766.  
Somalia.

*Commiphora samharensis* Schweinf., in Engler & Prantl, Nat. Pflanzenfam. III, 4: 253, ♦ 254 (1896) (nomen); Bull. Herb. Boissier 7, App. 2: 290 (1899).

Typi: Schweinfurth & Riva 66, 116, 211, 271 (FT, K isosyntypi), 306 (FT, K isosyntypi), 357 (FT, K isosyntypi), 577 (K isosyntypus).

Ref.: Thulin M. 1999. Fl. of Somalia 2: 200, ♦ 199.

*Commiphora schimperi* (O.Berg) Engl., in A.DC., Monogr. Phan. 4: 13 (1883).

Typi: Schimper 1139 in part, 1564 (P isosyntypi).

Ref.: Thulin M. 1999. Fl. of Somalia 2: 200, ♦ 201.

*Commiphora gileadensis* (L.) C.Chr., Dansk Bot. Ark. 4 (3): 18 (1922).

Typi: Forsskål 935, 936, 937 (C syntypi).

Ref.: Thulin M. 1999. Fl. of Somalia 2: 221, ♦ 222.

*Commiphora kua* (Royle) Vollesen, Nordic J. Bot. 4 (1): 37 (1984).

Typi: Johnston s. nr.; Salt s. nr. (BM syntypi).

Ref.: Thulin M. 1999. Fl. of Somalia 2: 214, ♦ 216.

*Commiphora myrrha* (Nees) Engl., in A.DC., Monogr. Phan. 4: 10 (1883).

Typus: Erhenberg (B holotypus, destr.; Nees, Pl. Off., t. 357 neotypus).

Ref.: Thulin M. 1999. Fl. of Somalia 2: 197, ♦ 198.

*Commiphora sphaerocarpa* Chiov., Result. Sc. Miss. Stefanini-Paoli Somalia Ital. 1: 48, ♦ 49 (1916).

Typus: Paoli 855 (FT holotypus).

Ref.: Thulin M. 1999. Fl. of Somalia 2: 213, ♦ 212.

## BURSERACEAE

**Commiphora horrida** Chiov., Fl. Somalia II: 87, ♫ 87 (1932).

Holotypus: Puccioni & Stefanini 169 [191].  
Somalia.

**Commiphora incisa** Chiov., Result. Sc. Miss. (=) Stefanini-Paoli Somalia Ital. 1: 45 (1916).

Holotypus: Paoli 929.  
Somalia.

**Commiphora longipedicellata** Vollesen, Kew Bull. 40 (1): 69, ♫ 70 (1985).

Isotypus: Gillett 13377.  
(K holotypus. Vollesen, Kew Bull. 40 (1): 69.  
1985).  
Kenya.

**Commiphora lughensis** Chiov., Fl. Somalia II: 105, ♫ 106, 107 (1932).

Syntypi: Paoli 927, 928, 950, 1009; Tozzi 269;  
Ruspoli & Riva 966, 1704.

Ethiopia and Somalia.

Commiphora lughensis p.p., quoad syntypi  
Paoli 927, 950 (fide Fl. of Somalia 2: 213. 1999)  
must be referred to '**Commiphora kataf** (Forssk.)  
Engl.'; Commiphora lughensis quoad syntypi  
Ruspoli & Riva 966, 1704 (fide Fl. of Ethiopia 3:  
468. 1989) and Paoli 1009 (fide Fl. of Somalia 2:  
213. 1999) must be referred to '**Commiphora  
cyclophyllea** Chiov.'

The syntypes Tozzi 269 and Paoli 928 are not  
quoted.

**Commiphora microcarpa** Chiov., Fl. Somalia II: (=) 126, ♫ 128 (1932).

Syntypi: Senni 756, 758, 765 bis, 818, 862 ter.  
Somalia.

**Commiphora missionis** Chiov., Racc. Bot. Miss. (=) Consolata Kenya: 17 (1935).

Syntypus: Balbo 691 \*.  
Kenya.  
The syntype Balbo 873 is lacking.

**Commiphora obovata** Chiov., Bull. Misc.  
Inform. Kew 1941 (2): 136 (1941).

Isotypus: Gillett 4185.  
(K holotypus. Hutchinson & Bruce, Bull.  
Misc. Inform. Kew 1941 (2): 136. 1941).  
Ethiopia/Somalia border.

**Commiphora ogadensis** Chiov., Fl. Somalia II: (=) 103, ♫ 103 (1932).

Holotypus: Ruspoli & Riva 824.  
Ethiopia.

**Commiphora kua** (Royle) Vollesen, Nordic J. Bot. 4 (1): 37 (1984).

Typi: Johnston s. nr.; Salt s. nr. (BM syntypi).  
Ref.: Thulin M. 1999. Fl. of Somalia 2: 214, ♫  
216.

**Commiphora paolii** Chiov., Result. Sc. Miss.  
Stefanini-Paoli Somalia Ital. 1: 46 (1916).

Typus: Paoli 313 (FT holotypus).  
Ref.: Thulin M. 1999. Fl. of Somalia 2: 190, ♫  
191.

**Commiphora gileadensis** (L.) C.Chr., Dansk Bot. Ark. 4 (3): 18 (1922).

Typi: Forsskål 935, 936, 937 (C syntypi).  
Ref.: Thulin M. 1999. Fl. of Somalia 2: 221, ♫  
222.

**Commiphora eminii** Engl. subsp. **zimmermannii**  
(Engl.) J.B.Gillett, in Polhill R.M., Fl. Trop. E.  
Afr., Burseraceae: 57 (1991).

Typi: Zimmermann in Herb. Amani 903, 1046,  
1128 (B syntypi destr.).  
Ref.: Gillett J.B. in Polhill R.M. 1991. Fl.  
Trop. E. Afr., Burseraceae: 57, ♫ 55.

**Commiphora hildebrandtii** (Engl.) Engl., in DC.,  
Monog. Phan. 4: 15 (1883).

Typus: Hildebrandt 1509 (W holotypus; K  
isotypus).

Ref.: Thulin M. 1999. Fl. of Somalia 2: 202.

## BURSERACEAE

**Commiphora ovalifolia** J.B.Gillett, in Polhill R.M., Fl. Trop. E. Afr., Burseraceae: 27 (1991).

Isotypus: Gillett 18268.

(K holotypus. Gillett, Fl. Trop. E. Afr., Burseraceae: 27. 1991).

Kenya.

*Commiphora palmatifoliolata* Chiov., Fl. Somalia II: 121, ♫ 122 (1932).

Holotypus: Senni 802.  
Somalia.

**Commiphora africana** (A.Rich.) Engl., in A.DC., Monogr. Phan. 4: 14 (1883).

Typus: HeudeLOT 129 (P holotypus).  
Ref.: Thulin M. 1999. Fl. of Somalia 2: 202.

**Commiphora paolii** Chiov., Result. Sc. Miss. Stefanini-Paoli Somalia Ital. 1: 46 (1916).

Holotypus: Paoli 313.  
Somalia.

*Commiphora playfairii* (Oliv.) Engl. var. (=) *benadirensis* Chiov., Fl. Somalia II: 70, ♫ 70 (1932).

Syntypi: Robecchi-Bricchetti 676, 678.  
Somalia and Ethiopia.  
The syntype Guidotti 1 is kept in MOD.

**Commiphora myrrha** (Nees) Engl., in A.DC., Monogr. Phan. 4: 10 (1883).

Typus: Erhenberg (B holotypus, destr.; Nees, Pl. Off., t. 357 neotypus).  
Ref.: Thulin M. 1999. Fl. of Somalia 2: 197, ♫ 198.

**Commiphora quadricincta** Schweinf., in Engler & Prantl, Nat. Pflanzenfam. III, 4: 253, ♫ 254 (1896) (nomen); Bull. Herb. Boissier 7, App. II: 283 (1899).

Iisosyntypus: Schweinfurth & Riva 243.  
Eritrea.

**Commiphora quercifoliola** J.B.Gillett ex Thulin, Nordic J. Bot. 20 (4): 402, ♫ 402 (2000).

Isotypus: Bally & Melville 15507.  
(K holotypus. Thulin, Nordic J. Bot. 20 (4): 402. 2000).  
Somalia.

*Commiphora reflexa* Chiov., Fl. Somalia II: 88, ♫ 89 (1932).

Holotypus: Robecchi-Bricchetti 667.  
Somalia.

**Commiphora rostrata** Engl., Annuario Reale Ist. Bot. Roma 7 (1): 17 (1897).

Typi: Robecchi-Bricchetti 598, 670 (B syntypi destr.; FT isosyntypi).  
Ref.: Thulin M. 1999. Fl. of Somalia 2: 208, ♫ 210.

*Commiphora resiniflua* Martelli, Fl. Bogos.: 15 (=) (1886).

Holotypus: Beccari 23.  
Eritrea.

**Commiphora schimperi** (O.Berg) Engl., in A.DC., Monogr. Phan. 4: 13 (1883).

Typi: Schimper 624, 1139, 1564 (P, FI-W isosyntypi).  
Ref.: Vollesen K. in Hedberg I. & Edwards S. 1989. Fl. of Ethiopia 3: 454, ♫ 456.

*Commiphora rivaiae* Engl., in Engler & Prantl, Nat. Pflanzenfam. III, 4: 255 (1896) (nomen); Annuario Reale Ist. Bot. Roma 7 (1): 17 (1897).

Isotypus: Ruspoli & Riva 1673.  
(B holotypus destr. Thulin, Fl. of Somalia 2: 197. 1999).  
Somalia.

**Commiphora myrrha** (Nees) Engl., in A.DC., Monogr. Phan. 4: 10 (1883).

Typus: Erhenberg (B holotypus, destr.; Nees, Pl. Off., t. 357 neotypus).  
Ref.: Thulin M. 1999. Fl. of Somalia 2: 197, ♫ 198.

## BURSERACEAE

**Commiphora robecchii** Engl., in Engler & Prantl, Nat. Pflanzenfam. III, 4: 252 (1896) (nomen); Annuario Reale Ist. Bot. Roma 7 (1): 17 (1897).  
Isotypus: Robecchi-Bricchetti 674.  
(B holotypus destr. Thulin, Fl. of Somalia 2: 208. 1999).  
Somalia.

**Commiphora rostrata** Engl., in Engler & Prantl, Nat. Pflanzenfam. III, 4: 252 (1896) (nomen); Annuario Reale Ist. Bot. Roma 7 (1): 17 (1897).  
Isosyntypi: Robecchi-Bricchetti 598, 670.  
(B syntypi destr. Thulin, Fl. of Somalia 2: 208. 1999).  
Somalia.

**Commiphora ruspolii** Chiov., Fl. Somalia II: 116, ♀ 118 (1932).  
Holotypus: Ruspoli & Riva 961.  
Ethiopia.  
Vollesen, in Fl. of Ethiopia 3: 477 (1989)  
prefers to leave it as a doubtful species.

**Commiphora samharensis** Schweinf., in Engler & Prantl, Nat. Pflanzenfam. III, 4: 253, ♀ 254 (1896) (nomen); Bull. Herb. Boissier 7, App. II: 290 (1899).  
Isosyntypi: Schweinfurth & Riva 271, 306, 357.  
Eritrea.

**Commiphora sarandensis** B.D.Burtt subsp. **moyaleensis** J.B.Gillett, in Polhill R.M., Fl. Trop. E. Afr., Burseraceae: 75 (1991).  
Isotypus: Gillett 14044.  
(K holotypus. Gillett, Fl. Trop. E. Afr., Burseraceae: 75. 1991).  
Kenya.

**Commiphora savoiae** Chiov., Nuovo Giorn. Bot. Ital., n. ser. 34: 843 (1927).  
Holotypus: Paoli 26.  
Somalia.  
In Fl. of Somalia and in Fl. Trop. E. Afr.  
instead of 'Paoli 26' there is 'Paoli 20'.

**Commiphora sennii** Chiov., Fl. Somalia II: 74, ♀ 74 (1932).  
Syntypi: Paoli 926, 959; Senni 699.  
Somalia.  
Chiovenda published in Result. Sc. Miss. Stefanini-Paoli Somalia Ital. 1: 47, ♀ t. 5 f. C (1916) 'Commiphora virgata' (non Engl. 1894), nom. illeg., with the syntypes Paoli 926 and 959.

**Commiphora sphaerocarpa** Chiov., Result. Sc. Miss. Stefanini-Paoli Somalia Ital. 1: 48, ♀ 49 (1916).  
Holotypus: Paoli 855.  
Somalia.

(=) **Commiphora rostrata** Engl., Annuario Reale Ist. Bot. Roma 7 (1): 17 (1897).  
Typi: Robecchi-Bricchetti 598, 670 (B syntypi destr.; FT isosyntypi).  
Ref.: Thulin M. 1999. Fl. of Somalia 2: 208, ♀ 210.

**Commiphora edulis** (Klotzsch) Engl. subsp. **boiviniana** (Engl.) J.B.Gillett, in Polhill R.M., Fl. Trop. E. Afr., Burseraceae: 65 (1991).  
Typus: Boivin s. nr. (P holotypus).  
Ref.: Thulin M. 1999. Fl. of Somalia 2: 190.

## BURSERACEAE

**Commiphora sphaerophylla** Chiov., Fl. Somalia

II: 119, ♫ 121 (1932).

Holotypus: Senni 770.

Somalia.

**Commiphora suckertiana** Chiov., Atti Soc. (=) Naturalist. Mat. Modena 66: 7 ? (1935).

Holotypus: Suckert 57.

Somalia.

**Commiphora gileadensis** (L.) C.Chr., Dansk Bot.

Ark. 4 (3): 18 (1922).

Typi: Forsskål 935, 936, 937 (C syntypi).

Ref.: Thulin M. 1999. Fl. of Somalia 2: 221, ♫

222.

**Commiphora sulcata** Chiov., Fl. Somalia: 123 (1929).

Holotypus: Puccioni & Stefanini 861 [950].

Somalia.

**Commiphora tephrodes** Chiov., Atti Reale Accad. Italia, Mem. Cl. Sci. Fis., Ser. 7, 11 (2): 23 (1940). (=)

Holotypus: Reghini 53.

Ethiopia.

**Commiphora hildebrandtii** (Engl.) Engl., in DC., Monog. Phan. 4: 15 (1883).

Typus: Hildebrandt 1509 (W holotypus; K isotypus).

Ref.: Thulin M. 1999. Fl. of Somalia 2: 202.

**Commiphora terebinthina** Vollesen, Kew Bull. 40 (1): 45, ♫ 47 (1985). (=)

Isotypus: Friis, Mesfin & Vollesen 2726.

(K holotypus. Vollesen, Kew Bull. 40 (1): 45. 1985).

Ethiopia.

**Commiphora samharensis** Schweinf., in Engler & Prantl, Nat. Pflanzenfam. III, 4: 253, ♫ 254 (1896) (nomen); Bull. Herb. Boissier 7, App. 2: 290 (1899).

Typi: Schweinfurth & Riva 66, 116, 211, 271 (FT, K isosyntypus), 306 (FT, K isosyntypus), 357 (FT, K isosyntypus), 577 (K isosyntypus).

Ref.: Thulin M. 1999. Fl. of Somalia 2: 200, ♫ 199.

**Commiphora velutina** Chiov., Result. Sc. Miss. Stefani-Paoli Somalia Ital. 1: 47 (1916). (=)

Syntypi: Paoli 857, 997.

Somalia.

**Commiphora gileadensis** (L.) C.Chr., Dansk Bot. Ark. 4 (3): 18 (1922).

Typi: Forsskål 935, 936, 937 (C syntypi).

Ref.: Thulin M. 1999. Fl. of Somalia 2: 221, ♫

222.

## CAPPARACEAE

- Boscia elegans*** Gilg, Annuario Reale Ist. Bot. Roma 6 (2): 90 (1896).  
 Isotypus: Ruspoli & Riva 18.  
 (B holotypus. Elffers, Graham, DeWolf, Fl. Trop. E. Afr., Capparidaceae: 53. 1964).  
 Ethiopia.
- Boscia gymnosporiifolia*** Chiov., Result. Sc. Miss. Stefanini-Paoli Somalia Ital. 1: 18, ♦ t. 2 f. B (1916).  
 Syntypi: Paoli 619, 663.  
 Somalia.
- Boscia hypoglauc*a** Gilg, Annuario Reale Ist. Bot. Roma 6 (2): 91 (1896).  
 Isotypus: Ruspoli & Riva 875.  
 Ethiopia.
- Boscia minimifolia*** Chiov., Result. Sc. Miss. Stefanini-Paoli Somalia Ital. 1: 19, ♦ t. 3 f. A (1916).  
 Syntypi: Stefanini & Paoli 807, 973.  
 Somalia.
- Boscia paolii*** Chiov., Result. Sc. Miss. Stefanini-Paoli Somalia Ital. 1: 20 (1916).  
 Holotypus: Paoli 825.  
 Somalia.
- Boscia pruinosa*** Chiov., Result. Sc. Miss. Stefanini-Paoli Somalia Ital. 1: 20, ♦ t. 1 f. B (1916).  
 Holotypus: Paoli 615.  
 Somalia.
- Boscia somalensis*** Gilg, Annuario Reale Ist. Bot. Roma 6 (2): 91 (1896).  
 Isolectotypus: Ruspoli & Riva 1016.  
 (B lectotypus. Elffers, Graham, DeWolf, Fl. Trop. E. Afr., Capparidaceae: 57. 1964).  
 Isosyntypi : Ruspoli & Riva 830; Robecchi-Bricchetti 165, 168.  
 Ethiopia.
- Boscia subtussulcata*** Chiov., Fl. Somalia: 81 (= 1929).  
 Holotypus: Puccioni & Stefanini 971 [1068].  
 Somalia.
- Boscia tomentella*** Chiov., Fl. Somalia II: 464 (= 1932).  
 Holotypus: Tozzi 263.  
 Somalia.
- Boscia mossambicensis*** Klotzsch, in Peters, Naturw. Reise Mossambique Bot. 1: 164 (1861).  
 Typus: Peters (B holotypus).  
 Ref.: Fici S. in Thulin M. 1993. Fl. of Somalia 1: 45.
- Boscia mossambicensis*** Klotzsch, in Peters, Naturw. Reise Mossambique Bot. 1: 164 (1861).  
 Typus: Peters (B holotypus).  
 Ref.: Fici S. in Thulin M. 1993. Fl. of Somalia 1: 45.
- Boscia senegalensis*** (Pers.) Lam. ex Poir., Tabl. encycl. tome 2, vol. 5 (2): 517, ♦ 395 (1819).  
 Typus: from Senegal, no particular material given.  
 Ref.: Kers L.E. in Edwards S., Mesfin Tadesse, Sebsebe Demissew & Hedberg I. 2000. Fl. of Ethiopia and Eritrea 2 (1): 116.
- Boscia coriacea*** Pax, Bot. Jahrb. Syst. 14: 299 (1891).  
 Typus: Hildebrandt 2478 (B holotypus).  
 Ref.: Fici S. in Thulin M. 1993. Fl. of Somalia 1: 46.
- Boscia coriacea*** Pax, Bot. Jahrb. Syst. 14: 299 (1891).  
 Typus: Hildebrandt 2478 (B holotypus).  
 Ref.: Fici S. in Thulin M. 1993. Fl. of Somalia 1: 46.
- Boscia minimifolia*** Chiov., Result. Sc. Miss. Stefanini-Paoli Somalia Ital. 1: 19, ♦ t. 3 f. A (1916).  
 Typi: Stefanini & Paoli 807, 973 (FT syntypi).  
 Ref.: Fici S. in Thulin M. 1993. Fl. of Somalia 1: 46, ♦ 47.
- Boscia mazzocchii*** (Chiov.) Fici & Kers, Giorn. Bot. Ital. 125 (3): 217 (1991).  
 Typi: Paoli 979, 1099 (FT syntypi).  
 Ref.: Fici S. 1993. Webbia 47 (1): 151, ♦ 155.

## CAPPARACEAE

- Boscia xylophylla*** Gilg, Annuario Reale Ist. Bot. Roma 6 (2): 90 (1896). (=) ***Boscia coriacea*** Pax, Bot. Jahrb. Syst. 14: 299 (1891).  
 Isotypus: Robecchi-Bricchetti 45.  
 (B holotypus. Elffers, Graham, DeWolf, Fl. Trop. E. Afr., Capparidaceae: 56. 1964).  
 Ethiopia.
- Cadaba baccarinii*** Chiov., Ann. Bot. (Rome) 13 (3): 377 (1915).  
 Holotypus/Isotypus: Paoli 806.  
 Somalia.
- Cadaba barbigera*** Gilg, Annuario Reale Ist. Bot. Roma 6 (2): 94 (1896).  
 Isotypus: Ruspoli & Riva 520.  
 (B holotypus. Kers, Fl. of Ethiopia and Eritrea 2 (1): 91. 2000).  
 Ethiopia.
- Cadaba divaricata*** Gilg, Annuario Reale Ist. Bot. Roma 6 (2): 93 (1896).  
 Isotypus: Robecchi-Bricchetti 614.  
 (B holotypus. Fici, Fl. of Somalia 1: 52. 1993).  
 Somalia/Ethiopia border.
- Cadaba farinosa* Forssk. var. *desertica* Oliv. ex Chiov., Result. Sc. Miss. Stefanini-Paoli Somalia Ital. 1: 18 (1916).  
 Holotypus: Paoli 823.  
 Somalia.
- Cadaba gilletii*** R.A.Graham, Kew Bull. 16 (1): 83 (1962).  
 Isotypus: Gillett 13966.  
 (K holotypus. DeWolf, Kew Bull. 16 (1): 83. 1962).  
 Kenya.
- Cadaba heterotricha* Stocks var. *glabrata* Chiov., Result. Sc. Miss. Stefanini-Paoli Somalia Ital. 1: 18 (1916).  
 Holotypus: Paoli 668.  
 Somalia.
- Cadaba longifolia* DC. var. *frutescens* Chiov., Fl. Somala: 82 (1929). (=)  
 Syntypi: Puccioni & Stefanini 441 [493], 446 [498].  
 Somalia.
- Cadaba mirabilis*** Gilg, Annuario Reale Ist. Bot. Roma 6 (2): 93 (1896).  
 Isosyntypi: Ruspoli & Riva 1558, Robecchi-Bricchetti 44.  
 (B syntypi. Kers, Fl. of Ethiopia and Eritrea 2 (1): 91. 2000).  
 Ethiopia and Somalia.  
 Chiovenda in Fl. Somala: 82 (1929) published ‘*Cadaba mirabilis* Gilg var. *glutinosa*’ based on the same types.
- Cadaba farinosa*** Forssk., Fl. Aegypt.-Arab.: 68 (1775).  
 Typus: Forsskål s. nr. (C several sheets).  
 Ref.: Fici S. in Thulin M. 1993. Fl. of Somalia 1: 50.
- Cadaba farinosa*** Forssk. subsp. ***adenotricha*** (Gilg & Gilg-Ben.) R.A.Graham, Kew Bull. 17 (1): 161 (1963).  
 Typus: Kassner 644 (B lectotypus; BM, K isolectotypi).  
 Ref.: Fici S. 1993. Webbia 47 (1): 158.
- Cadaba longifolia*** DC., Prodr. 1: 244 (1824).  
 Typus: Salt (BM holotypus).  
 Ref.: Fici S. in Thulin M. 1993. Fl. of Somalia 1: 49.

## CAPPARACEAE

- Cadaba mirabilis*** Gilg var. *hirtella* Chiov., Fl. (=) Somala: 82 (1929).  
 Holotypus: Puccioni & Stefanini 999 [1103]. Somalia.
- Cadaba mirabilis*** Gilg, Annuario Reale Ist. Bot. Roma 6 (2): 93 (1896).  
 Typi: Ruspoli & Riva 1558; Robecchi-Bricchetti 44 (B syntypus; FT isosyntypus). Ref.: Fici S. in Thulin M. 1993. Fl. of Somalia 1: 48.
- Cadaba ruspolii*** Gilg, Annuario Reale Ist. Bot. Roma 6 (2): 94 (1896).  
 Isotypus: Ruspoli & Riva 866.  
 (B holotypus. Kers, Fl. of Ethiopia and Eritrea 2 (1): 90. 2000).  
 Ethiopia.
- Capparis alexandrae*** Chiov., Fl. Somala II: 463 (=) (1932).  
 Holotypus: Tozzi 273. Somalia.
- Capparis tomentosa*** Lam., Encycl. 1: 606 (1785).  
 Typus: Adanson in Herb. Seneg. 41 (P-JU holotypus). Ref.: Fici S. in Thulin M. 1993. Fl. of Somalia 1: 52.
- Capparis deckenii*** Chiov., Result. Sc. Miss. (=) Stefanini-Paoli Somalia Ital. 1: 21 (1916).  
 Holotypus/Isotypus: Paoli 841. Somalia.
- Maerua denhardtiorum*** Gilg, Bot. Jahrb. Syst. 33: 227 (1903).  
 Typus: F. Thomas 8 (B holotypus; BM, K isotypus). Ref.: Thulin M. & Kers L.E. in Thulin M. 1993. Fl. of Somalia 1: 39.
- Capparis mazzocchii*** Chiov., Result. Sc. Miss. (=) Stefanini-Paoli Somalia Ital. 1: 22 (1916).  
 Lectotypus: Paoli 979 (Fici & Kers, Giorn. Bot. Ital. 125 (3): 217. 1991)  
 Syntypus: Paoli 1099. Somalia.
- Boscia mazzocchii*** (Chiov.) Fici & Kers, Giorn. Bot. Ital. 125 (3): 217 (1991). Ref.: Fici S. 1993. Webbia 47 (1): 151, ♦ 155.
- Capparis rivae*** Gilg, Annuario Reale Ist. Bot. (=) Roma 6 (2): 89 (1896).  
 Isotypus: Ruspoli & Riva 564.  
 (B holotypus. Elffers, Graham, DeWolf, Fl. Trop. E. Afr., Capparidaceae: 65. 1964).  
 Ethiopia.
- Capparis sepiaria*** L. var. *rivae* (Chiov.) DeWolf, Kew Bull. 16 (1): 81 (1962).  
 Ref.: Kers L.E. in Edwards S., Mesfin Tadesse, Sebsebe Demissew & Hedberg I. 2000. Fl. of Ethiopia and Eritrea 2 (1): 97.
- Capparis somalensis*** Gilg, Annuario Reale Ist. (=) Bot. Roma 6 (2): 90 (1896).  
 Isotypus: Ruspoli & Riva 1580.  
 (B holotypus. Kers, Fl. of Ethiopia and Eritrea 2 (1): 96. 2000).  
 Ethiopia.
- Capparis fascicularis*** DC., Prodr. 1: 248 (1824).  
 Typus: Brass (BM holotypus).  
 Ref.: Kers L.E. in Edwards S., Mesfin Tadesse, Sebsebe Demissew & Hedberg I. 2000. Fl. of Ethiopia and Eritrea 2 (1): 96.
- Cleome allamanii*** Chiov., Racc. Bot. Miss. Consolata Kenya: 3 (1935).  
 Holotypus: Balbo 453 \*.  
 Kenya.
- Cleome brachycarpa*** Vahl ex DC. forma *latifolia* (=) A.Terracc., Annuario Reale Ist. Bot. Roma 5 (3): 114 (1894).  
 Syntypus: Terracciano 118, 168. Eritrea.
- Cleome brachycarpa*** Vahl ex DC., Prodr. 1: 240 (1824).  
 Typus: Forsskål s. nr. (BM holotypus).  
 Ref.: Kers L.E. in Edwards S., Mesfin Tadesse, Sebsebe Demissew & Hedberg I. 2000. Fl. of Ethiopia and Eritrea 2 (1): 81.

## CAPPARACEAE

- Cleome brachycarpa* Vahl ex DC. var. *angustifolia* Gilg, Annuario Reale Ist. Bot. Roma 6 (2): 88 (1896).  
 Syntypi: Ruspoli & Riva 840 (932), 1071 (1180).  
 Ethiopia.
- Cleome elegantissima* Chiov., non Briquet (1914) (= Bull. Soc. Bot. Ital. 1924: 38 (1924).  
 Holotypus: Mazzocchi-Alemanni 29.  
 Angola.  
 The number of the holotype, omitted in the protologue, is quoted by Chiovenda in Agric. Colon. 18 (11-12): 378 (1924).
- Cleome massae* Chiov., Atti Reale Accad. Italia, Mem. Cl. Sci. Fis., Ser. 7, 11 (2): 17 (1940).  
 Holotypus/Isotypus: Massa 170.  
 Ethiopia.  
 In the protologue the date of collection is '10 V 1938', instead of '10 V 1937', as written in the holotype label.
- Cleome platysepala* Gilg & Gilg-Ben., Bot. Jahrb. Syst. 53: 161 (1915).  
 Isotypus: Ruspoli & Riva 244.  
 (B holotypus. Kers, Fl. of Ethiopia and Eritrea 2 (1): 84. 2000).  
 Ethiopia.
- Courbonia brevipilosa* Gilg, Annuario Reale Ist. Bot. Roma 6 (2): 92 (1896).  
 Lectotypus: Ruspoli & Riva 26 (Kers, Fl. of Ethiopia and Eritrea 2 (1): 104. 2000).  
 Syntypus: Ruspoli & Riva 1014.  
 Ethiopia.
- Dianthera hochstetteri* Eichler, Flora 48: 550 (1865).  
 Isotypus: Schimper 80.  
 Ethiopia.  
 Schimper 80 is also quoted as type of 'Dianthera abyssinica Schweinf.' (Beitr. Fl. Aethiop.: 70. 1867) and 'Cleome didynama Hochst. ex Oliv.' (Fl. Trop. Afr. 1: 79. 1868).
- Maerua amphilahensis* A.Terracc., Annuario Reale Ist. Bot. Roma 5 (3): 114 (1894).  
 Syntypi: Terracciano 96, 132, 169.  
 Eritrea.
- Maerua boranensis** Chiov., Atti Reale Accad. Italia, Mem. Cl. Sci. Fis., Ser. 7, 11 (2): 18 (1940).  
 Holotypus: Massa 29.  
 Ethiopia.
- Cleome brachycarpa** Vahl ex DC., Prodr. 1: 240 (1824).  
 Typus: Forsskål s. nr. (BM holotypus).  
 Ref.: Kers L.E. in Edwards S., Mesfin Tadesse, Sebsebe Demissew & Hedberg I. 2000. Fl. of Ethiopia and Eritrea 2 (1): 81.
- Cleome angustifolia** Forssk. subsp. **petersiana** (Kl.) Kers, Group II, Svensk Bot. Tidskr. 63 (1): 20 (1969).  
 Typus: Peters s. nr. (B holotypus).  
 Ref.: Kers L. 1969. Svensk Bot. Tidskr. 63 (1): 20.
- Cleome monophylla** L., Sp. Pl.: 672 (1753).  
 Typus: India, LINN 850-22.  
 Ref.: Kers L.E. in Edwards S., Mesfin Tadesse, Sebsebe Demissew & Hedberg I. 2000. Fl. of Ethiopia and Eritrea 2 (1): 78.
- Cleome hanburyana** Penz., Atti Congr. Bot. Genova: 330 (1893).  
 Typi: Penzig s. nr. (GE syntypi destr.).  
 Ref.: Kers L.E. in Edwards S., Mesfin Tadesse, Sebsebe Demissew & Hedberg I. 2000. Fl. of Ethiopia and Eritrea 2 (1): 84.
- Maerua decumbens** (Brongn.) DeWolf, Kew Bull. 19 (1): 62 (1964).  
 Typus: Courbon 370 (P holotypus; B isotypus).  
 Ref.: Kers L.E. in Edwards S., Mesfin Tadesse, Sebsebe Demissew & Hedberg I. 2000. Fl. of Ethiopia and Eritrea 2 (1): 104.
- Cleome angustifolia** Forssk. subsp. **angustifolia**, Fl. Aegypt. Arab.: 120 (1775).  
 Typus: Forsskål s. nr. (BM holotypus).  
 Ref.: Kers L. 1969. Svensk Bot. Tidskr. 63 (1): 15.
- Maerua oblongifolia** (Forssk.) A.Rich., Tent. Fl. Abyss. 1: 32, ♀ t. 6 (1847).  
 Typus: Forsskål 649 (C holotypus).  
 Ref.: Kers L.E. in Edwards S., Mesfin Tadesse, Sebsebe Demissew & Hedberg I. 2000. Fl. of Ethiopia and Eritrea 2 (1): 112.

## CAPPARACEAE

**Maerua candida** Gilg, Annuario Reale Ist. Bot. Roma 6 (2): 96 (1896).

Isotypus: Ruspoli & Riva 707.

(B isotypus. Kers, Fl. of Ethiopia and Eritrea 2 (1): 108. 2000).

Ethiopia.

**Maerua gilletii** Kers, Novon 3 (1): 53, ♀ 52 (1993).

Isotypus: Gillett 14148.

(K holotypus. Kers, Novon 3 (1): 53. 1993).

Kenya.

**Maerua glauca** Chiov., Result. Sc. Miss. Stefanini-Paoli Somalia Ital. 1: 16, ♀ t. 1 f. A (1916).

Holotypus: Paoli 835.

Somalia.

*Maerua gorinii* Chiov., Fl. Somalia II: 8 (1932).

Holotypus: Gorini 245.

Somalia.

(=) **Maerua glauca** Chiov., Result. Sc. Miss. Stefanini-Paoli Somalia Ital. 1: 16, ♀ t. 1 f. A (1916).

Typus: Paoli 835 (FT holotypus).

Ref.: Thulin M. & Kers L.E. in Thulin M. 1993. Fl. of Somalia 1: 44.

*Maerua hirtella* Chiov., Fl. Somalia: 83 (1929).

Holotypus: Puccioni & Stefanini 474 [526].

Somalia.

In the protologue there is ‘Puccioni & Stefanini 476’ instead of ‘Puccioni & Stefanini 474’.

(=) **Maerua crassifolia** Forssk., Fl. Aegypt.-Arab.: 104 (1775), nom. cons.

Typus: J.R.I. Wood 3153 (BM neotypus).

Ref.: Thulin M. & Kers L.E. in Thulin M. 1993. Fl. of Somalia 1:42.

**Maerua macrantha** Gilg, Annuario Reale Ist. Bot. Roma 6 (2): 95 (1896).

Isotypus: Ruspoli & Riva 965.

(B fragments. Kers, Fl. of Ethiopia and Eritrea 2 (1): 110. 2000).

Ethiopia.

*Maerua macrocarpa* Chiov., Fl. Somalia: 84 (= 1929).

Lectotypus: Robecchi-Bricchetti 49 (Thulin, Nordic J. Bot. 13 (1): 49. 1993).

Exsicc.: Stefanini & Puccioni 309 [356].

The specimen ‘Stefanini & Puccioni 309 [356]’, consists of a leafy branch and a loose fruit. Fide Thulin (Nordic J. Bot. 13 (1): 49. 1993), the branch is ‘*Thilachium thomasii* Gilg’ and the fruit is ‘*Capparis tomentosa* Lam.’

*Maerua oblongifolia* (Forssk.) A.Rich. var. (*angustifolia* Becc. ex Martelli, Nuovo Giorn. Bot. Ital. 20: 369 (1888).

Holotypus: Beccari anno 1870.

Eritrea.

**Maerua denhardtiorum** Gilg, Bot. Jahrb. Syst. 33: 227 (1903).

Typus: F. Thomas 8 (B holotypus; BM, K isotypi).

Ref.: Thulin M. & Kers L.E. in Thulin M. 1993. Fl. of Somalia 1: 39.

**Maerua oblongifolia** (Forssk.) A.Rich., Tent. Fl. Abyss. 1: 32, ♀ t. 6 (1847).

Typus: Forsskål 649 (C holotypus).

Ref.: Kers L.E. in Edwards S., Mesfin Tadesse, Sebsebe Demissew & Hedberg I. 2000. Fl. of Ethiopia and Eritrea 2 (1): 112.

## CAPPARACEAE

- Maerua pirottae* Gilg, Annuario Reale Ist. Bot. Roma 6 (2): 96 (1896).  
 Isotypus: Ruspoli & Riva 1458.  
 (B isotypus. Kers, Fl. of Ethiopia and Eritrea 2 (1): 106. 2000).  
 Ethiopia.
- Maerua puccionii** Chiov., Atti Ist. Bot. Univ. Pavia, ser. IV, 7: 119, ♀ t. I (1936).  
 Holotypus: Puccioni 33.  
 Somalia.
- Maerua scebelensis* Chiov., Nuovo Giorn. Bot. Ital. n. s. 34: 841 (1927).  
 Syntypi: Paoli 4, 17.  
 Somalia.
- Maerua sessiliflora* Gilg, Annuario Reale Ist. Bot. Roma 6 (2): 96 (1896).  
 Syntypi: Ruspoli & Riva 268, 269.  
 Ethiopia.
- Maerua vitis-idaeifolia* Chiov., Racc. Bot. Miss. Consolata Kenya: 4 (1935).  
 Syntypi: Balbo 693 \*, 745 \*.  
 Kenya.
- Pucconia macradenia** Chiov., Fl. Somalia: 78, ♀ t. II f. 2 (1929).  
 Syntypi: Puccioni & Stefanini 25 [25], 1003 [1107].  
 Somalia.
- Ritchiea balbi* Chiov., Racc. Bot. Miss. Consolata Kenya: 5 (1935).  
 Holotypus: Balbo 183 \*.  
 Kenya.
- Thylachium papilloscabrum* Chiov., Fl. Somalia II: 10 (1932).  
 Syntypi: Senni 156, 184.  
 Somalia.
- Thylachium papilloscabrum* Chiov. var. *cyclophyllum* Chiov., Fl. Somalia II: 11 (1932).  
 Syntypi: Confalone 46; Senni 261.  
 Somalia.
- (=) **Maerua triphylla** A. Rich. var. *calophylla* (Gilg) DeWolf, Kew Bull. 16 (1): 82 (1962).  
 Typus: Stuhlmann 701 (B holotypus).  
 Ref.: Kers L.E. in Edwards S., Mesfin Tadesse, Sebsebe Demissew & Hedberg I. 2000. Fl. of Ethiopia and Eritrea 2 (1): 106.
- (=) **Maerua oblongifolia** (Forssk.) A.Rich., Tent. Fl. Abyss. 1: 32, ♀ t. 6 (1847).  
 Typus: Forsskål 649 (C holotypus).  
 Ref.: Thulin M. & Kers L.E. in Thulin M. 1993. Fl. of Somalia 1: 43.
- (=) **Maerua triphylla** A.Rich. var. *johannis* (Volkens & Gilg) DeWolf, Kew Bull. 16 (1): 82 (1962).  
 Typus: Volkens 2149 (BM, K, isotypi).  
 Ref.: Elffers J., Graham R.A., DeWolf G.P. in Hubbard C.E. & Milne-Redhead E. 1964. Fl. Trop. E. Afr., Capparidaceae: 47.
- Ritchiea albersii** Gilg, Bot. Jahrb. Syst. 33: 208 (1903).  
 Typus: Albers 95 (B holotypus).  
 Ref.: Elffers J., Graham R.A., DeWolf G.P. in Hubbard C.E. & Milne-Redhead E. 1964. Fl. Trop. E. Afr., Capparidaceae: 21, ♀ 22.
- (=) **Thilachium thomasi** Gilg, Bot. Jahrb. Syst. 33: 229 (1903).  
 Typus: F. Thomas 138 (B holotypus).  
 Ref.: Thulin M. 1993. Fl. of Somalia 1: 53, ♀ 51.
- (=) **Thilachium thomasi** Gilg, Bot. Jahrb. Syst. 33: 229 (1903).  
 Typus: F. Thomas 138 (B holotypus).  
 Ref.: Thulin M. 1993. Fl. of Somalia 1: 53, ♀ 51.

## CARYOPHYLLACEAE

*Alsine schimperi* A.Rich. var. *ellenbeckii* Engl., (≡) *Minuartia ellenbeckii* (Engl.) M.G.Gilbert, Bot. Jahrb. Syst. 48: 381 (1912).  
Isoneotypus: M. & S. Gilbert 1789.  
(K neotypus. Gilbert, Nordic J. Bot. 11 (4): 455. 1991).  
Ethiopia.

**Drymaria sessilifolia** Fiori, Anal. Bot. Fieni Imp., in VIII Congresso Agricoltura Trop. e Subtrop.: 20 (1939).  
Holotypus: Bartolozzi 13.  
Ethiopia.

**Polycarpaea basaltica** Thulin, Nordic J. Bot. 16 (3): 291, ♀292, f. 2 (1996).  
Isotypus: Thulin, Dahir & Hassan 9019.  
(UPS holotypus. Thulin, Nordic J. Bot. 16 (3): 291. 1996).  
Somalia.

**Polycarpaea somalensis** Engl., Bot. Jahrb. Syst. 48: 381 (1912).  
Isotypus: Riva 1716.  
(B holotypus destr. Gilbert, Fl. of Somalia 1: 101. 1993).  
Somalia.

**Sagina brachysepala** Chiov., Ann. Bot. (Rome) 9 (1): 52 (1911).  
Holotypus: Chiovenda 2938.  
Ethiopia.

**Stellaria sennii** Chiov., Atti Reale Accad. Italia, Mem. Cl. Sci. Fis., Ser. 7: 11 (2): 20 (1940).  
Holotypus/Isotypus: Senni 2165.  
Ethiopia.

**Uebelinia kigesiensis** R.D.Good subsp. **ragazziana** Ousted, Bull. Jard. Bot. Belg. 55 (3/4): 446, ♀ 444 (1985).  
Holotypus/Isotypus: Ragazzi s. nr.  
Ethiopia.

## CHENOPODIACEAE

**Fadenia zygophylloides** Aellen & C.C.Towns.,  
Kew Bull. 27 (3): 501, ♀ 502 (1972).  
Isotypus: Faden & Evans 71/291.  
(K holotypus. Aellen & Townsend, Kew Bull.  
27 (3): 501. 1972).  
Kenya.

**Gyroptera gilletii** Botsch., Kew Bull. 30 (2): 369 (≡)  
(1975).  
Isotypus: Gillett & Newbould 19162.  
(EA holotypus. Botschantzev, Kew Bull. 30  
(2): 369. 1975).  
Kenya.

**Gyroptera somalensis** Botsch., Bot. Zhurn. (Moscow & Leningrad) 52: 808, ♀ f. 4 (1967).  
Holotypus: Puccioni & Stefanini 918 [1009].  
Somalia.

**Lagenantha nogalensis** Chiov., Fl. Somalia: 293, (≡)  
♀ t. 37 f. 2 (1929).  
Lectotypus: Puccioni & Stefanini 916 [1007]  
(Botschantzev, Kew Bull. 30 (2): 368. 1975).  
Exsicc. (pro syntypus): Puccioni & Stefanini  
918 [1009].  
Somalia.

The specimen ‘Puccioni & Stefanini 918 [1009]’ is selected by Botschantzev in Bot. Zhourn. 52: 808 (1967) as holotype of *Gyroptera somalensis* Botsch.

**Lagenantha nogalensis** Chiov. var. *papillosa* (≡)  
Chiov., Fl. Somalia: 294 (1929).  
Holotypus: Puccioni & Stefanini 931 [1022].  
Somalia.

**Salsola bottae** (Jaub. & Spach) Boiss. var. *farinulenta* Chiov., Ann. Bot. (Rome) 9 (2): 131 (1911).  
Holotypus: Robecchi-Bricchetti 443 (303).  
Ethiopia/Somalia border.

**Salsola pycnophylla** Brenan, Kew Bull. 1953 (3): 433 (1953).  
Isotypus: Collenette 41.  
(K holotypus. Brenan, Kew Bull. 1953 (3): 433. 1953).  
Somalia.

**Lagenantha gilletii** (Botsch.) M.G.Gilbert & Friis, Nordic J. Bot. 11 (3): 315 (1991).  
Ref.: Boulos L., Friis I. & Gilbert M.G. 1991.  
Nordic J. Bot. 11 (3): 315.

**Lagenantha cycloptera** (Stapf) M.G.Gilbert & Friis, Nordic J. Bot. 11 (3): 315 (1991).  
Typus: Forbes s. nr. (K lectotypus).  
Ref.: Boulos L., Friis I. & Gilbert M.G. 1991.  
Nordic J. Bot. 11 (3): 315.

**Lagenantha cycloptera** (Stapf) M.G.Gilbert & Friis, Nordic J. Bot. 11 (3): 315 (1991).  
Typus: Forbes s. nr. (K lectotypus).  
Ref.: Boulos L., Friis I. & Gilbert M.G. 1991.  
Nordic J. Bot. 11 (3): 315.

**Lagenantha cycloptera** (Stapf) M.G.Gilbert & Friis, Nordic J. Bot. 11 (3): 315 (1991).  
Typus: Forbes s. nr. (K lectotypus).  
Ref.: Boulos L., Friis I. & Gilbert M.G. 1991.  
Nordic J. Bot. 11 (3): 315.

**Halothamnus somalensis** (N.E.Br.) Botsch., Novosti Sist. Vyssh. Rast. 18: 151 (1981).  
Typus: Drake-Brockman 484.  
Ref.: Friis I. & Gilbert M.G. in Thulin M. 1993. Fl. of Somalia 1: 138.

## CRASSULACEAE

**Kalanchoe bipartita** Chiov., Result. Sc. Miss.

Stefanini-Paoli Somalia Ital. 1: 75 (1916).

Holotypus: Paoli 674.

Somalia.

*Kalanchoe grandiflora* A.Rich. var. *angustipetala* (= Engl., Annuario Reale Ist. Bot. Roma 9: 251 (1902).

Isolectotypus: Robecchi-Bricchetti 74.

(B lectotypus. Raadts, Willdenowia 8/1: 106. 1977).

Ethiopia.

**Kalanchoe lateritia** Engl. var. **prostrata** Raadts, Willdenowia 8/1: 134 (1977).

Isotypus: Drummond & Hemsley 3790.

(B holotypus. Raadts, Willdenowia 8/1: 134. 1977).

Kenya.

*Kalanchoe marinellii* Pamp., Bull. Soc. Bot. Ital. (= 1909: 52 (1909).

Holotypus: Dainelli & Marinelli s. nr.  
Eritrea.

**Kalanchoe migiurtinorum** Cufod., Webbia 19 (2): 727 (1965).

Holotypus: Merla, Azzaroli & Fois s. nr.  
Somalia.

*Kalanchoe quartiniana* A.Rich. var. *micrantha* (= Pamp., Bull. Soc. Bot. Ital. 1909: 54 (1909).

Holotypus: Dainelli & Marinelli s. nr.  
Eritrea.

*Kalanchoe rohlfsii* Engl., Annuario Reale Ist. Bot. Roma 9: 252 (1902).

Isosyntypi: Ruspoli & Riva 219, 1586.  
(B syntypi. Raadts, Willdenowia 8/1: 144. 1977).  
Ethiopia and Kenya.

**Kalanchoe sp. = Buscalioni 1278**, M.G. Gilbert, Fl. of Ethiopia 3: 22 (1989).

Exsicc. (pro typus): Buscalioni 1278.  
Ethiopia.

*Sedum malladrae* Chiov., Ann. Bot. (Rome) 9 (1): (= 60 (1911).

Syntypi: Chiovenda 3042, 3164.  
Ethiopia.

**Kalanchoe marmorata** Baker, Gard. Chron. ser. 3, 12: 300 (1892).

Typus: Penzig, cultivated at La Mortola 1892 (K holotypus).

Ref.: Gilbert M.G. in Hedberg I. & Edwards S. 1989. Fl. of Ethiopia 3: 20, ♦ 21.

**Kalanchoe glaucescens** Britten subsp. **glaucens**, Fl. Trop. Afr. 2: 393 (1871).

Typus: Schimper 724 a (BM lectotypus ; K isolectotypus).

Ref.: Gilbert M.G. in Hedberg I. & Edwards S. 1989. Fl. of Ethiopia 3: 22, ♦ 21.

**Kalanchoe petitiana** A.Rich. var. **petitiana**, Tent. Fl. Abyss. 1: 311 (1847).

Typus: Petit s. nr. (P holotypus).

Ref.: Gilbert M.G. in Hedberg I. & Edwards S. 1989. Fl. of Ethiopia 3: 20, ♦ 21.

**Kalanchoe laciniata** (L.) DC., Pl. hist. succ. 2: 100 (1802).

Typus: a cultivated specimen in Hort. Cliff. (BM lectotypus).

Ref.: Gilbert M.G. in Hedberg I. & Edwards S. 1989. Fl. of Ethiopia 3: 25, ♦ 21.

**Hypagophytum abyssinicum** (A.Rich.) A.Berger, in Engler, Nat. Pflanzenfam. ed. 2, 18 a: 468 (1930).

Typi: Petit; Quartin-Dillon; Schimper I: 138 (P syntypi).

Ref.: Gilbert M.G. in Hedberg I. & Edwards S. 1989. Fl. of Ethiopia 3: 10, ♦ 11.

## CRASSULACEAE

- Sempervivum chrysanthum* Britten var. (=) **Aeonium leucoblepharum** A.Rich., Tent. Fl. Abyss. 1: 314 (1847).  
glandulosum Chiov., Nuovo Giorn. Bot. Ital. n. s., 26: 154 (1919).  
Holotypus: Dainelli & Marinelli 156.  
Eritrea.
- Typi: Schimper 838; Quartin Dillon & Petit (both P syntypi; K isosyntypi).  
Ref.: Gilbert M.G. in Hedberg I. & Edwards S. 1989. Fl. of Ethiopia 3: 16, ♦ 17.

## CRUCIFERAE

- Cardamine talamontiana* Chiov., Ann. Bot. (=) (Rome) 9 (1): 51 (1911).  
Holotypus: Chiovenda 884.  
Ethiopia.
- Cardamine trichocarpa** Hochst. ex A.Rich., Tent. Fl. Abyss. 1: 18 (1847).  
Typi: Schimper sect. II 1352, sect. III 1628 (both syntypi P; K isosyntypi).  
Ref.: Jonsell B. in Edwards S., Mesfin Tadesse, Sebsebe Demissew & Hedberg I. 2000. Fl. of Ethiopia and Eritrea 2 (1): 142, ♦ 143.

- Diceratella alata** Jonsell & Moggi, Nordic J. Bot. 3 (3): 348, ♦ 348 (1983).  
Isotypus: Ellis 168.  
(K holotypus. Jonsell & Moggi, Nordic J. Bot. 3 (3): 348. 1983).  
Ethiopia.

- Diceratella psilotrichoides** Chiov., Fl. Somalia: 76 (1929).  
Holotypus: Puccioni & Stefanini 487 [539].  
Somalia.

- Diceratella ruspoliana* Engl., Annuario Reale Ist. Bot. Roma 9: 248 (1902).  
Syntypi: Riva 60, 859, 1073, 1084.  
Ethiopia.

- Diceratella smithii** (Baker f.) Jonsell, Bot. Not. 131: 253 (1978).  
Typus: Donaldson-Smith s. nr. (BM holotypus).  
Ref.: Jonsell B. in Edwards S., Mesfin Tadesse, Sebsebe Demissew & Hedberg I. 2000. Fl. of Ethiopia and Eritrea 2 (1): 148.

- Diceratella sinuata** (Franch.) Oliv. var. **elliptica** Chiov., Fl. Somalia: 75 (1929).  
Holotypus: Puccioni & Stefanini 830 [916].  
Somalia.

- Eruca subcipinnata* Chiov., Atti Soc. Naturalisti Mat. Modena 63: 35 (1932).  
Holotypus: De Benedictis 238.  
Eritrea.

- Eruca sativa** Hill var. **sativa** subvar. **lativalvis** (Boiss.) Coss., Comp. Fl. atlant. II: 209 (1887).  
Typi: Aucher-Eloy 4169, Kotschy 896.  
Ref.: Cufodontis G. 1954. Bull. Jard. Bot. État 24 (2), Suppl.: 145.

- Erucastrum erigavicum** Jonsell, Opera Bot. 121: 139, ♦ 139 (1993).  
Isotypus: Thulin 4253.  
(UPS holotypus. Jonsell, Opera Bot. 121: 139. 1993).  
Somalia.

## CRUCIFERAE

**Erucastrum meruense** Jonsell, Bot. Not. 132: 530, ♫ 531 (1979).

Isotypus: Hedberg 4744.

(UPS holotypus. Jonsell, Bot. Not. 132: 530. 1979).

Tanzania.

**Fabrisinapis fruticosus** C.C.Towns., Hooker's Ic. (≡) Pl. 7 (4): t. 3673, ♫ t. 3673 (1971).

Isotypus: Smith & Lavranos 533.

(K holotypus. Townsend, Hooker's Ic. Pl. 7 (4): t. 3673. 1971).

Yemen, Socotra.

**Farsetia arabica** Boulos, Webbia 32 (2): 379, ♫ (=) 381 (1978).

Isotypus: Boulos 11150.

(K holotypus. Boulos, Webbia 32 (2): 379. 1978).

Qatar.

**Farsetia fruticosa** Engl., Annuario Reale Ist. Bot. Roma 9: 249 (1902). (=)

Isotypus: Riva 1085.

(B holotypus. Jonsell. Fl. of Somalia 1: 66. 1993).

Somalia/Ethiopia border.

**Farsetia nummularia** Jonsell, Symb. Bot. Upsal. 25 (3): 44, ♫ 45 (1986).

Holotypus: Corradi 4733.

Ethiopia.

**Farsetia robecchiana** Engl., Annuario Reale Ist. Bot. Roma 9: 248 (1902).

Isolectotypus: Riva 832 (B lectotypus. Jonsell, Symb. Bot. Upsal. 25 (3): 46. 1986).

Syntypi: Riva 729, 1172; Robecchi-Bricchetti 67.

Somalia/Ethiopia.

**Farsetia robecchiana** Engl. var. *viridiflora* Chiov., (≡) Miss. Biol. Borana, Racc. Bot. Angiosp.-Gymnosp.: 49, ♫ 50 (1939).

Holotypus/Isotypus: Cufodontis 88. Ethiopia.

**Matthiola rivae** Engl., Annuario Reale Ist. Bot. Roma 9: 249 (1902). (=)

Isosyntypi: Riva 10, 861.

Somalia/Ethiopia?

**Rorippa laurentii** Jonsell, Bot. Not. 132 (4): 532, ♫ 533 (1979).

Isotypus: Jonsson 1090.

(UPS holotypus. Jonsell, Bot. Not. 132 (4): 532. 1979).

Madagascar.

**Hemicrambe townsendii** Gomez-Campo, Anales Inst. Bot. Cavanilles 34: 154 (1977).

Ref.: Miller A.G. in Miller A.G. & Cope T.A. 1996. Fl. Arab. Pen. and Socotra 1: 397, ♫ 398.

**Farsetia heliophila** Bunge ex Coss., Ill. fl. Atlant. 2: 227 (1884).

Typus: Bunge s. nr. (P lectotypus; K, L isotypi).

Ref.: Miller A.G. & Cope T.A. 1996. Fl. of Arab. Pen. and Socotra 1: 422, ♫ 420.

**Farsetia somalensis** (Pax) Gilg & Gilg-Ben., Bot. Jahrb. Syst. 53: 169 (1915).

Typus: Hildebrandt 1548 (B holotypus).

Ref.: Jonsell B. in Thulin M. 1993. Fl. of Somalia 1: 66.

**Farsetia robecchiana** Engl., Annuario Reale Ist. Bot. Roma 9: 248 (1902).

Typi: Riva 729, 832, 1172; Robecchi-Bricchetti 67 (B isotypi; FT isosyntypi).

Ref.: Jonsell B. in Edwards S., Mesfin Tadesse, Sebsebe Demissew & Hedberg I. 2000. Fl. of Ethiopia and Eritrea 2 (1): 139, ♫ 139.

**Matthiola erlangeriana** Engl., Bot. Jahrb. Syst. 32: 100 (1902).

Typus: Ellenbeck 2169 (B holotypus).

Ref.: Jonsell B. in Thulin M. 1993. Fl. of Somalia 1: 73, ♫ 72.

## CRUCIFERAE

- Sisymbrium pachypodium* Chiov., Ann. Bot. (≡) **Erucastrum pachypodium** (Chiov.) Jonsell, Bot. Not. 129 (2): 127 (1976).  
(Rome) 9 (1): 52 (1911).  
Syntypi: Chiovenda 59, 887.  
Eritrea and Ethiopia.  
The syntype 'Chiovenda 882' is lacking in FT.
- Ref.: Jonsell B. in Edwards S., Mesfin Tadesse, Sebsebe Demissew & Hedberg I. 2000. Fl. of Ethiopia and Eritrea 2 (1): 125, ♦ 127.

## EUPHORBIACEAE

- Acalypha fruticosa** Forssk. var. **eglandulosa**  
Radcl.-Sm., Kew Bull. 28 (2): 288 (1973).

Isotypus: Gillett 13530.  
(K holotypus. Radcliffe-Smith, Kew Bull. 28 (2): 288. 1973).  
Kenya.

- Andrachne schweinfurthii** (Balf.f.) Radcl.-Sm.  
var. **papillosa** Radcl.-Sm., Kew Bull. 44 (3): 447  
(1989).

Isotypus: Smith & Lavranos 776.  
(K holotypus. Radcliffe-Smith, Kew Bull. 44 (3): 447. 1989).  
Yemen, Socotra.

- Bridelia microphylla** Chiov., Result. Sci. Miss.  
Stefanini-Paoli Somal. Ital. I: 160, ♦ t. 17 f. B  
(1916).

Holotypus: Paoli 505.  
Somalia.

- Caperonia subrotunda** Chiov., Result. Sc. Miss.  
Stefanini-Paoli Somal. Ital. I: 220, ♦ t. 18 (1916).

Holotypus: Scassellati & Mazzocchi 99.  
Somalia.

- Cecchia somalensis* Chiov., Fl. Somalia II: 397, ♦ 398 (1932).

Holotypus: Senni 289.  
Somalia.

- Oldfieldia somalensis** (Chiov.) Milne-Redh., Kew Bull. 3: 456 (1949).

Ref.: Thulin M. 1993. Fl. of Somalia 1: 279.

- Clutia abyssinica* Jaub. & Spach var. *firma* Pax & K.Hoffm., in Engler, Pflanzenr. IV, 147, III: 57 (1911).

Isosyntypus: Ruspoli & Riva 1391 (1245)  
1262 (Gilbert, Fl. of Ethiopia and Eritrea 2 (2): 286. 1995).  
Ethiopia.

- Clutia abyssinica** Jaub. & Spach var. **abyssinica**,  
Ill. Pl. Orient. 5: 57 (1855).

Typus: Schimper (1853) 1329 (P holotypus).

Ref.: Gilbert M.G. in Edwards S., Mesfin Tadesse & Hedberg I. 1995. Fl. of Ethiopia and Eritrea 2 (2): 286.

- Collenucia paradoxa* Chiov., Fl. Somalia: 177, ♦ t. XIX f. 2 (1929).

Holotypus: Puccioni & Stefanini 409 [461].  
Somalia.

- Jatropha paradoxa** (Chiov.) Chiov., Ann. Bot. (Rome) 18 (3): 324 (1930).

Ref.: Thulin M. 1993. Fl. of Somalia 1: 296.

## EUPHORBIACEAE

- Commiphora reghinii* Chiov., Atti Reale Accad. Italia, Mem. Cl. Sci. Fis., Ser. 7, 11 (2): 23 (1940). (=) **Euphorbia jatrophoides** Pax, Bot. Jahrb. Syst. 33: 287 (1903).  
 Holotypus/Isotypus: Reghini 11.  
 Ethiopia.  
 Vollesen published in Kew Bull. 40 (1): 76 'Euphorbia reghinii (Chiov.) Vollesen'.
- Croton cliffordii** Hutch. & E.A.Bruce, Bull. Misc. Inform. Kew 1941 (2): 108 (1941).  
 Isotypus: Gillett 4040.  
 (K holotypus. Thulin, Fl. of Somalia 1: 302. 1993).  
 Somalia.
- Croton macrostachyus* Delile var. *mollissimus* (Chiov., Miss. Biol. Borana, Racc. Bot. Angiosp.-Gymnosp.: 98, ♦ 99 (1939). (=) **Croton macrostachyus** Hochst. ex Delile, Voy. Abyssinie 3: 158 (1848).  
 Syntypi: Cufodontis 312, 432.  
 Ethiopia.
- Croton megalocarpoides** Friis & M.G.Gilbert, Nordic J. Bot. 4 (3): 328, ♦ 329 (1984).  
 Holotypus: Senni 233.  
 Somalia.
- Croton pachyclados* Radcl.-Sm., Hooker's Icon. Pl. Ser. 5, 7 (4): t. 3699, ♦ t. 3699 (1971). (=) **Croton socotranus** Balf.f. var. *pachyclados* (Radcl.-Sm.) Radcl.-Sm., Kew Bull. 44 (3): 449 (1989).  
 Isotypus: Smith & Lavranos 314.  
 (K holotypus. Radcliffe-Smith, Hooker's Icon. Pl. Ser. 5, 7 (4): t. 3699. 1971).  
 Yemen, Socotra.
- Croton schimperianus* Hochst. ex Müll.Arg. var. *acutissimus* Chiov., Malpighia 35: 61 (1939). (=) **Croton schimperianus** Hochst. ex Müll.Arg., Linnaea 24: 82 (1865).  
 Holotypus: Gortani & Jaboli II/203.  
 Ethiopia.
- Drypetes gerrardinooides** Radcl.-Sm., Kew Bull. 45 (4): 671, ♦ 672 (1990).  
 Isotypus: Bidgood, Mwasumbi & Vollesen 794.  
 (K holotypus. Radcliffe-Smith, Kew Bull. 45 (4): 671. 1990).  
 Tanzania.
- Erythrococca abyssinica** Pax, Bot. Jahrb. Syst. 19: 87 (1894).  
 Isosyntypus: Schweinfurth & Riva 1037.  
 (B syntypus destr. Gilbert, Fl. of Ethiopia and Eritrea 2 (2): 296. 1995).  
 Eritrea.
- Erythrococca parvifolia** Chiov., Miss. Biol. Borana, Racc. Bot. Angiosp.-Gymnosp.: 100, ♦ 101 (1939).  
 Holotypus/Isotypus: Cufodontis 283.  
 Ethiopia.

## EUPHORBIACEAE

**Erythrococca pubescens** Radcl.-Sm., Kew Bull.  
33 (2): 236 (1978).

Isotypus: Drummond & Hemsley 4168.  
(K holotypus. Radcliffe-Smith, Kew Bull. 33  
(2): 236. 1978).  
Kenya.

**Euphorbia actinoclada** S.Carter, Hooker's Icon.  
Pl. 39 (3): t. 3851, ♫ t. 3851 (1982).  
Isotypus: Gillett 12631.  
(K holotypus. Carter, Hooker's Icon. Pl. 39  
(3): t. 3851. 1982).  
Kenya.

**Euphorbia ampliphylla** Pax, Annuario Reale Ist.  
Bot. Roma 6 (3): 186 (1897); as "amplophylla".  
Isotypus: Riva 1636 [1337] 1481.  
(B holotypus destr. Gilbert, Fl. of Ethiopia and  
Eritrea 2 (2): 334. 1995).  
Ethiopia.

**Euphorbia awashensis** M.G.Gilbert, Collect. Bot.  
(Barcelona) 21: 76 (1992).  
Holotypus: Negri 1318.  
Ethiopia.

**Euphorbia baioensis** S.Carter, Hooker's Icon. Pl.  
39 (3): t. 3870, ♫ t. 3870 (1982).  
Isotypus: Powys & Evans s. nr.  
(K holotypus. Carter, Hooker's Icon. Pl. 39  
(3): t. 3870. 1982).  
Kenya.

**Euphorbia brunellii** Chiov., Webbia 8 (1): 234  
(1951).  
Holotypus: Vatova 1997.  
Ethiopia.

**Euphorbia burgeri** M.G.Gilbert, Collect. Bot.  
(Barcelona) 21: 70 (1992).  
Isotypus: Burger 2481.  
(K holotypus. Gilbert, Collect. Bot. (Barcelona)  
21: 70. 1992).  
Ethiopia.

**Euphorbia calamiformis** P.R.O.Bally & S.Carter,  
Kew Bull. 40 (4): 824 (1985).  
Isotypus: Gillett 14174.  
(K holotypus. Gilbert, Fl. of Ethiopia and  
Eritrea 2 (2): 365. 1995).  
Ethiopia.

*Euphorbia chamaecormos* Chiov., Fl. Somalia: (=)  
303, ♫ t. XXXIV f. 1 (1929).  
Syntypi: Puccioni & Stefanini 700 [774], 747  
[825].  
Somalia.

**Euphorbia schizacantha** Pax, Annuario Reale Ist.  
Bot. Roma 6 (3): 187 (1897).  
Typus: Ruspoli & Riva 764 (544) 697 (FT  
isotypus).  
Ref.: Carter Holmes S. in Thulin M. 1993. Fl.  
of Somalia 1: 330.

## EUPHORBIACEAE

**Euphorbia cryptocaulis** M.G.Gilbert, Kew Bull.

42 (1): 231, ♫ 232 (1987).

Holotypus/Isotypus: Corradi s. nr.

Ethiopia.

**Euphorbia dalettiensis** M.G.Gilbert, Kew Bull.

42 (2): 391 (1987).

Isotypus: Burger 3402.

(K holotypus. Gilbert, Kew Bull. 42 (2): 391. 1987).

Ethiopia.

*Euphorbia depauperata* Hochst. ex A.Rich. var. *pubescens* Pax, Annuario Reale Ist. Bot. Roma 6 (3): 188 (1897).

Holotypus: Riva 1360 [1293] 1234.

Ethiopia.

(=) **Euphorbia depauperata** Hochst. ex A.Rich., Tent. Fl. Abyss. 2: 241 (1951).

Typi: Quartin Dillon; Schimper I: 336, III: 1532 (P syntypi).

Ref.: Gilbert M.G. in Edwards S., Mesfin Tadesse & Hedberg I. 1995. Fl. of Ethiopia and Eritrea 2 (2): 366.

**Euphorbia dumalis** S.Carter, Kew Bull. 40 (4): 816 (1985).

Isotypus: Mooney 7124.

(K holotypus. Carter, Kew Bull. 40 (4): 816. 1985).

Ethiopia.

In Fl. of Ethiopia and Eritrea 2 (2): 366 (1995) instead of 'Mooney 7124' there is 'Mooney 6441'.

**Euphorbia geldorensis** S.Carter, Nordic J. Bot. 12 (4): 405, ♫ 406 (1992).

Isotypus: Bally & Melville 15942.

(K holotypus. Carter, Nordic J. Bot. 12 (4): 405. 1992).

Somalia.

**Euphorbia gemmea** P.R.O.Bally & S.Carter, Hooker's Icon. Pl. 39 (3): t. 3863, ♫ t. 3863 (1982).

Isotypus: Gillett 12633.

(K holotypus. Carter, Hooker's Icon. Pl. 39 (3): t. 3863. 1982).

Kenya.

**Euphorbia gilletti** P.R.O.Bally & S.Carter, Cact. Succ. J. (Los Angeles) 49 (4): 179 (1977).

Isotypus: Gillett 4729.

(K holotypus. Carter Holmes, Fl. of Somalia 1: 328. 1993).

Somalia.

**Euphorbia giomboensis** A.Hässl., Bot. Not. 1931 (5): 328 (1931).

Holotypus: Scassellati V 48.

Somalia.

**Euphorbia glochidiata** Pax, Annuario Reale Ist. Bot. Roma 6 (3): 187 (1897).

Isotypus: Ruspoli & Riva 1122 (335) 1018.

(B holotypus destr. Gilbert, Fl. of Ethiopia and Eritrea 2 (2): 344. 1995).

Ethiopia.

## EUPHORBIACEAE

*Euphorbia gorinii* Chiov., Fl. Somalia II: 401, ♀ (=) **Euphorbia pirottae** A.Terracc., Annuario Reale Ist. Bot. Roma 5 (3): 97 (1894).

Holotypus: Gorini 466.  
Somalia.

Typus: Terracciano 204 (FT holotypus).  
Ref.: Gilbert M.G. in Edwards S., Mesfin Tadesse & Hedberg I. 1995. Fl. of Ethiopia and Eritrea 2 (2): 352.

**Euphorbia grantii** Oliv. var. **rhabdocarpa**  
Chiov., Racc. Bot. Miss. Consolata Kenya: 110  
(1935).

Holotypus: Balbo 746 \*.  
Kenya.

**Euphorbia gypsophila** S.Carter, Nordic J. Bot. 12  
(6): 687, ♀ 685 (1992).

Isotypus: Bally & Melville 15393.  
(K holotypus. Carter, Nordic J. Bot. 12 (6):  
687. 1992).

Somalia.

**Euphorbia hajhirensis** Radcl.-Sm., Hooker's  
Icon. Pl. 7 (4): t. 3696, ♀ t. 3696 (1971).

Isotypus: Smith & Lavranos 419.  
(K holotypus. Radcliffe-Smith, Hooker's Icon.  
Pl. 7 (4): t. 3696. 1971).

Yemen, Socotra.

**Euphorbia imparispina** S.Carter, Nordic J. Bot.  
12 (4): 413, ♀ 412 (1992).

Isotypus: Carter 924.  
(K holotypus. Carter, Nordic J. Bot. 12 (4):  
413. 1992).

Somalia.

**Euphorbia inaequispina** N.E.Br., in Thiselton-  
Dyer W.T., Fl. Trop. Afr. 6 (1): 576 (1911).

Holotypus: Robecchi-Bricchetti 283.  
Ethiopian-Somalia boundary.

**Euphorbia leucochlamys** Chiov., Fl. Somalia: 299  
(1929).

Holotypus: Puccioni & Stefanini 939 [1033].  
Somalia.

**Euphorbia longispina** Chiov., Fl. Somalia: 302  
(1929).

Holotypus: Puccioni & Stefanini 442 [494].  
Somalia.

**Euphorbia margaretae** S.Carter, Nordic J. Bot.  
12 (4): 407, ♀ 404 (1992).

Isotypus: Carter 925.  
(K holotypus. Carter, Nordic J. Bot. 12 (4):  
407. 1992).

Somalia.

**Euphorbia migiurtinorum** Chiov., Fl. Somalia:  
300 (1929).

Holotypus: Puccioni & Stefanini 801 [888].  
Somalia.

## EUPHORBIACEAE

**Euphorbia mosaica** P.R.O.Bally & S.Carter,  
Cact. Succ. J. (Los Angeles) 48 (3): 125 (1976).  
Isotypus: Bally & Melville 16046.  
(K holotypus. Carter, Fl. of Somalia 1: 336.  
1993).  
Somalia.

*Euphorbia napoides* Pax, Annuario Reale Ist. Bot. (=)  
Roma 6 (3): 187 (1897).  
Holotypus: Ruspoli & Riva 1106 (419) 1002.  
Ethiopia.

**Euphorbia hadramautica** Baker, Bull. Misc.  
Inform. Kew 1894: 341 (1894).  
Typus: Lunt (K holotypus).  
Ref.: Gilbert M.G. in Edwards S., Mesfin  
Tadesse & Hedberg I. 1995. Fl. of Ethiopia and  
Eritrea 2 (2): 351.

**Euphorbia nigrispina** N.E.Br. in Thyselton-Dyer  
W.T., Fl. Trop. Afr. 6 (1): 574 (1911).  
Isotypus: Ruspoli & Riva 1030 (392) 929.  
(B holotypus destr. Gilbert, Fl. of Ethiopia and  
Eritrea 2 (2): 342. 1995).  
Ethiopia.

**Euphorbia nubica** N.E.Br., in Thiselton-Dyer  
W.T., Fl. Trop. Afr. 6 (1): 554 (1911).  
Isosyntypus: Schweinfurth & Riva 1083.  
(K syntypus. Gilbert, Fl. of Ethiopia and  
Eritrea 2 (2): 364. 1995).  
Eritrea.

**Euphorbia pirottae** A.Terracc., Annuario Reale  
Ist. Bot. Roma 5 (3): 97 (1894).  
Holotypus: Terracciano 204.  
Eritrea.

*Euphorbia pseudofalcata* Chiov., Webbia 8 (1): (=) **Euphorbia petitiana** A.Rich., Tent. Fl. Abyss. 2:  
234 (1951).  
Holotypus: Vatova 2506.  
Ethiopia.

Typus: Petit (P holotypus).  
Ref.: Gilbert M.G. in Edwards S., Mesfin  
Tadesse & Hedberg I. 1995. Fl. of Ethiopia and  
Eritrea 2 (2): 367.

**Euphorbia rivae** Pax, Annuario Reale Ist. Bot.  
Roma 6 (3): 186 (1897).  
Isotypus: Ruspoli & Riva 95 (1457) 94.  
(B holotypus destr. Gilbert, Fl. of Ethiopia and  
Eritrea 2 (2): 378. 1995).  
Ethiopia.

**Euphorbia robecchii** Pax, Annuario Reale Ist.  
Bot. Roma 6 (3): 186 (1897).  
Syntypi: Robecchi 332, 370.  
Isosyntypus: Riva 1169 (1061).  
(B syntypus destr. Gilbert, Fl. of Ethiopia and  
Eritrea 2 (2): 338. 1995).  
Ethiopia.

*Euphorbia ruspolii* Chiov., Result. Sc. Miss. (=)  
Stefanini-Paoli Somal. Ital. I: 159 (1916).  
Syntypi: Riva 1169 (1061) (syntypus of  
Euphorbia robecchii); Paoli 925.  
Ethiopia and Somalia.

**Euphorbia robecchii** Pax, Annuario Reale Ist.  
Bot. Roma 6 (3): 186 (1897).  
Typi: Robecchi 332, 370; Riva 1169 (1061)  
(FT syntypus).  
Ref.: Gilbert M.G. in Edwards S., Mesfin  
Tadesse & Hedberg I. 1995. Fl. of Ethiopia and  
Eritrea 2 (2): 338.

## EUPHORBIACEAE

*Euphorbia sacchii* Chiov., Result. Sc. Miss. (=) *Euphorbia grosseri* Pax, Bot. Jahrb. Syst. 33: 288  
Stefanini-Paoli Somal. Ital. I: 160 (1916).

Holotypus: Paoli 989.  
Somalia.

Typus: Ellenbeck 2151 (B lectotypus destr.; K

drawing of lectotypus).

Ref.: Carter Holmes S. in Thulin M. 1993. Fl.  
of Somalia 1: 316.

*Euphorbia schimperiana* Hochst. ex Scheele var. (=)  
*trilobata* Chiov., Atti Reale Accad. Italia, Mem.

Cl. Sci. Fis., Ser. 7, 11 (2): 56 (1940).

Holotypus/Isotypus: Senni 1070.  
Ethiopia.

*Euphorbia schimperiana* Hochst. ex Scheele,  
Linnaea 17: 344 (1843).

Typus: Schimper 897 (K isotypus).

Ref.: Gilbert M.G. in Edwards S., Mesfin  
Tadesse & Hedberg I. 1995. Fl. of Ethiopia and  
Eritrea 2 (2): 370, ♦ 371.

**Euphorbia schizacantha** Pax, Annuario Reale Ist.  
Bot. Roma 6 (3): 187 (1897).

Isotypus: Ruspoli & Riva 764 (544) 697.  
(B holotypus destr. Gilbert, Fl. of Ethiopia and  
Eritrea 2 (2): 347. 1995).

Ethiopia.

*Euphorbia seclusa* N.E.Br., in Thiselton-Dyer (=)  
W.T., Fl. Trop. Afr. 6 (1): 512 (1911).

Isotypus: Schweinfurth & Riva 612.  
(K holotypus. Gilbert, Fl. of Ethiopia and  
Eritrea 2 (2): 376. 1995).

Eritrea.

**Euphorbia arabica** Hochst. & Steud. ex  
T.Anderson, Fl. Aden.: 34 (1860).

Typus: Schimper 756 (K syntypus).

Ref.: Gilbert M.G. in Edwards S., Mesfin  
Tadesse & Hedberg I. 1995. Fl. of Ethiopia and  
Eritrea 2 (2): 376, ♦ 377.

**Euphorbia sennii** Chiov., Fl. Somalia II: 404, ♦  
403 (1932).

Holotypus: Senni 650.  
Ethiopia.

**Euphorbia septentrionalis** P.R.O.Bally &  
S.Carter subsp. **gemugofana** M.G.Gilbert, Collect.  
Bot. (Barcelona) 21: 73 (1992).

Holotypus: Corradi 5743.  
Ethiopia.

**Euphorbia somalensis** Pax, Annuario Reale Ist.  
Bot. Roma 6 (3): 187 (1897).

Lectotypus: Ruspoli & Riva 345 (210) 333.  
(Hässler, Bot. Not. 1931: 322. 1931).

Ethiopia.

Pax published Euphorbia somalensis with two  
other syntypes: Ruspoli & Riva 832 (623) 754 and  
Ruspoli & Riva 1075 (325) 972.

The syntype Ruspoli & Riva 832 (623) 754 is a  
bad specimen and its identification is impossible;  
the syntype Ruspoli & Riva 1075 (325) 972 is  
'Euphorbia scheffleri Pax' (fide Hässler, Bot. Not.  
1931: 324. 1931).

*Euphorbia somalensis* Pax var. *nogalensis* (=)  
A.Hässl., Bot. Not. 1931 (5): 325 (1931).

Lectotypus: Puccioni & Stefanini 869 [960]  
(Carter, Euphorbia J. 5: 30. 1988).

Syntypus: Cavalli s. nr.  
Somalia.

**Euphorbia nogalensis** (A.Hässl.) S.Carter,  
Euphorbia J. 5: 37, ♦ 37 (1988).

Ref.: Carter S. in Thulin M. 1993. Fl. of  
Somalia 1: 317.

## EUPHORBIACEAE

**Euphorbia sp. = Burger 2287**, M.G. Gilbert, Fl. of Ethiopia and Eritrea 2 (2): 338 (1995).

Exsicc. (pro typus): Burger 2287.  
Ethiopia.

**Euphorbia sp. = Burger 3154**, M.G. Gilbert, Fl. of Ethiopia and Eritrea 2 (2): 341 (1995).

Exsicc. (pro typus): Burger 3154.  
Ethiopia.

**Euphorbia tozzii** Chiov., Fl. Somalia II: 407 (1932).

Holotypus: Tozzi s. nr.  
Somalia.

**Euphorbia turbiniformis** Chiov., Fl. Somalia: 304, ♦ t. XXXV f. 1 (1929).

Lectotypus: Puccioni & Stefanini 701 [775] (Bally, Candollea 21 (2): 365. 1966).  
Somalia.

The exsicc. (pro syntypus) 'Ruspoli & Riva 225' must be referred to 'Euphorbia gymnocalycoïdes M.G.Gilbert & S.Carter' (Fide Gilbert & Carter, Bradleya 2: 9. 1984).

**Euphorbia umbonata** S.Carter, Nordic J. Bot. 12 (4): 418, ♦ 415 (1992).

Isotypus: Bally & Melville 15663.  
(K holotypus. Carter, Nordic J. Bot. 12 (4): 418. 1992).  
Somalia.

**Euphorbia xylacantha** Pax, Bot. Jahrb. Syst. 34: 79 (1904).

Syntypi: Ruspoli & Riva 31, 354.  
Somalia.

**Jatropha arguta** Chiov., Fl. Somalia: 307, ♦ t. (=) XXXV f. 3 (1929).

Holotypus: Puccioni & Stefanini 235 [263].  
Somalia.

**Jatropha brockmannii** Hutch. var. *lejosepala* (Chiov., Result. Sc. Miss. Stefanini-Paoli Somal. Ital. I: 162 (1916).

Holotypus: Stefanini & Paoli 1275.  
Somalia.

**Jatropha dichtar** J.F.Macbr., Candollea 5: 381 (1934).

Syntypi: Robecchi-Bricchetti 59; Riva 506 [599].  
Somalia and Ethiopia.

**Jatropha rivae** Pax subsp. *parvifolia* (Chiov.) M.G.Gilbert & Thulin, Nordic J. Bot. 11 (4): 414 (1991).

Typus: Suckert 55 (FT holotypus; K isotypus).  
Ref.: Gilbert M.G. in Edwards S., Mesfin Tadesse & Hedberg I. 1995. Fl. of Ethiopia and Eritrea 2 (2): 319.

**Jatropha trifida** Chiov., Fl. Somalia II: 388 (1932).

Ref.: Govaerts R., Frodin D. & Radcliffe-Smith A. 2000. World Check. Bibl. Euphorbiaceae (and Pandaceae) 3: 1037.

## EUPHORBIACEAE

- Jatropha ferox*** Pax, Annuario Reale Ist. Bot. Roma 6 (3): 185 (1897), nom. illeg., non Müll.Arg. (1874).  
 Syntypi: Robecchi-Bricchetti 59; Riva 506 [599].  
 Somalia and Ethiopia.
- Jatropha lobata*** (Forssk.) Müll.Arg. var. ( $\equiv$ ) ***pubescens*** Chiov., Fl. Somala: 306 (1929).  
 Holotypus/Isotypus: Stefanini & Paoli 29.  
 Somalia.
- Jatropha marginata*** Chiov., Ann. Bot. (Rome) 18 (3): 324 (1930) in clavi; Fl. Somalia II: 391, ♀ 392 (1932).  
 Holotypus: Senni 603.  
 Somalia.
- Jatropha mollis*** Pax, Annuario Reale Ist. Bot. Roma 6 (3): 184 (1897).  
 Isotypus: Riva 511 [1111] 486.  
 (B holotypus, destr. Gilbert, Fl. of Ethiopia and Eritrea 2 (2): 322. 1995).  
 Ethiopia.
- Jatropha nogalensis*** Chiov., Fl. Somala: 306, ♀ t. XXXV f. 2 (1929).  
 Holotypus: Puccioni & Stefanini 908 [999].  
 Somalia.
- Jatropha obbiadensis*** Chiov., Fl. Somala: 308, ♀ t. XXXVI f. 1 (1929).  
 Syntypi: Puccioni & Stefanini 358 [409], 388 [440], 574 [629].  
 Somalia.
- Jatropha parvifolia*** Chiov., Atti Soc. Naturalisti Mat. Modena 66: 18 (1935 publ. 1934).  
 Holotypus/Isotypus: Suckert 55.  
 Somalia.
- Jatropha rivae*** Pax subsp. ***parvifolia*** (Chiov.) M.G.Gilbert & Thulin, Nordic J. Bot. 11 (4): 414 (1991).  
 Ref.: Gilbert M.G. in Edwards S., Mesfin Tadesse & Hedberg I. 1995. Fl. of Ethiopia and Eritrea 2 (2): 319.
- Jatropha riveae*** Pax, Annuario Reale Ist. Bot. Roma 6 (3): 185 (1897).  
 Lectotypus: Ruspoli & Riva 1218 [735] 1102 (Gilbert & Thulin, Nordic J. Bot. 11 (4): 414. 1991).  
 Ethiopia.
- Jatropha robecchii*** Pax, Annuario Reale Ist. Bot. Roma 6 (3): 184 (1897).  
 Lectotypus: Robecchi-Bricchetti s. nr.  
 Without precise locality.
- Jatropha tenuicaulis*** Thulin, Nordic J. Bot. 11 (4): 417, ♀ 417 (1991).  
 Isotypus: Thulin, Hedrén & Abdi Dahir 7740.  
 (UPS holotypus. Gilbert & Thulin, Nordic J. Bot. 11 (4): 417. 1991).  
 Somalia.

## EUPHORBIACEAE

**Jatropha tetracantha** Chiov., Fl. Somalia II: 393,

✧ 393 (1932).

Holotypus: Tozzi 266.

Somalia.

**Jatropha trifida** Chiov., Fl. Somalia II: 388

(1932).

Holotypus: Stefanini & Paoli 1275.

Somalia.

**Jatropha tropaeolifolia** Pax, in Engler, Pflanzenr.

42 (IV 147): 56 (1910).

Isotypus: Robecchi-Bricchetti 275 [105].

(B holotypus destr. Thulin, Fl. of Somalia 1: 296. 1993).

Somalia.

In the protologue the description of this taxon seems based on two specimens; on the contrary there is one specimen with two numbers.

**Macaranga lophostigma** Chiov., Atti Reale

Accad. Italia, Mem. Cl. Sci. Fis., Ser. 7, 11 (2): 55 (1940).

Holotypus: Giordano 2461.

Ethiopia.

In the protologue the number of the holotype is '2471' instead of '2461'.

**Mildbraedia balboana** Chiov., Racc. Bot. Miss. (=) Consolata Kenya: 112 (1935).

Syntypus: Balbo 561 \*.

Kenya.

**Croton alienus** Pax, Bot. Jahrb. Syst. 43: 80 (1909).

Typus: Stuhlmann in Herb. Amani 938 (B holotypus destr.; EA isotypus).

Ref.: Radcliffe-Smith A. in Polhill R.M. 1987. Fl. Trop. E. Afr., Euphorbiaceae 1: 157.

**Monadenium lindenii** S.Carter, Nordic J. Bot. 13 (5): 542, ✧ 542 (1993).

Isotypus: Lavranos, Carter & al. 24966.

(K holotypus. Carter, Nordic J. Bot. 13 (5): 542. 1993).

Somalia.

**Monadenium lunulatum** Chiov., Fl. Somalia: 298 (=) (1929).

Holotypus: Puccioni & Stefanini 1063 [214].  
Somalia.

In the protologue there is 'Puccioni & Stefanini 1963' instead of 'Puccioni & Stefanini 1063'.

**Monadenium majus** (Pax) N.E.Br. forma (=) *floribundum* P.R.O.Bally, Candollea 17: 36 (1959).

Isotypus: Bally 9282.  
(EA holotypus. Bally, Candollea 17: 36. 1959).  
Ethiopia.

**Kleinia subulifolia** (Chiov.) P.Halliday, Hooker's Icon. Pl. 39 (4): t. 3885, ✧ t. 3885 (1988).

Typus: Puccioni & Stefanini 591 (FT holotypus).

Ref.: Halliday P. 1988. Hooker's Icon. Pl. 39 (4): t. 3885.

**Monadenium reflexum** Chiov., Webbia 8 (1): 235 (1951).

Holotypus/Isotypus: Vatova 845.  
Ethiopia.

**Monadenium erubescens** (Rendle) N.E.Br., in Thiselton-Dyer W.T., Fl. Trop. Afr. 6 (1): 457 (1911).

Typus: Lort-Phillips s. nr. (BM holotypus).  
Ref.: Gilbert M.G. in Edwards S., Mesfin Tadesse & Hedberg I. 1995. Fl. of Ethiopia and Eritrea 2 (2): 379, ✧ 380.

## EUPHORBIACEAE

- Monadenium subulifolium*** Chiov., Fl. Somalia: 298 (1929).  
 Holotypus: Puccioni & Stefanini 591 [648].  
 Somalia.
- Monadenium zavattarii*** Chiov., Miss. Biol. Borana, Racc. Bot. Angiosp.-Gymnosp.: 103, ♀ 104 (1939).  
 Holotypus/Isotypus: Cufodontis 616.  
 Ethiopia.
- Phyllanthus grahamii*** Hutch. & M.B.Moss, Bull. Misc. Inform. Kew 1937: 413 (1937). (=)  
 Isotypus: Graham 1986.  
 (K holotypus. Radcliffe-Smith, Fl. Trop. E Afr., Euphorbiaceae 1: 21. 1987).  
 Kenya.
- Phyllanthus myrtilloides*** Chiov., Ann. Bot. (Rome) 10 (3): 405 (1912). (=)  
 Holotypus: Negri 869.  
 Ethiopia.
- Phyllanthus rivae*** Pax, Annuario Reale Ist. Bot. Roma 6 (3): 182 (1897).  
 Holotypus: Riva 1758 [1671] 1590.  
 Ethiopia.
- Phyllanthus spinosus*** Chiov., Fl. Somalia: 305 (1929).  
 Holotypus: Puccioni & Stefanini 403 [455].  
 Somalia.
- Tithymalus braunii*** Schweinf., J. Bot. 1: 295 (1863). (=)  
 Isotypus: Schimper 221.  
 (B holotypus destr. Gilbert, Fl. of Ethiopia and Eritrea 2 (2): 352. 1995).  
 Ethiopia.
- Tragia mitis*** Hochst. ex Müll.Arg. var. *cinerea* Pax, Bot. Jahrb. Syst. 19: 103 (1894).  
 Neotypus: Robecchi-Bricchetti 170 (B holotypus: Hildebrandt 872a destr. Gilbert, Nordic J. Bot. 12 (4): 391. 1992).  
 Ethiopia.
- Tragia negeliensis*** M.G.Gilbert, Nordic J. Bot. 12 (4): 398, ♀ 394 (1992).  
 Isotypus: Friis, Mesfin T. & Vollesen 3085.  
 (K holotypus. Gilbert, Nordic J. Bot. 12 (4): 398. 1992).  
 Ethiopia.
- (=) ***Kleinia subulifolia*** (Chiov.) P.Halliday, Hooker's Icon. Pl. 39 (4): t. 3885, ♀ t. 3885 (1988).  
 Ref.: Halliday P. 1988. Hooker's Icon. Pl. 39 (4): t. 3885.
- Monadenium ellenbeckii*** N.E.Br., in Thiselton-Dyer W.T., Fl. Trop. Afr. 6 (1): 454 (1911).  
 Typus: Ellenbeck 2102 (B holotypus destr.; K isotypus).  
 Ref.: Gilbert M.G. in Edwards S., Mesfin Tadesse & Hedberg I. 1995. Fl. of Ethiopia and Eritrea 2 (2): 378.
- Phyllanthus beillei*** Hutch., in Thiselton-Dyer W.T., Fl. Trop. Afr. 6 (1): 733 (1912).  
 Typi: Chevalier 6612, 6846 (P syntypi).  
 Ref.: Govaerts R., Frodin D. & Radcliffe-Smith A. 2000. World Check. Bibl. Euphorbiaceae (and Pandaceae) 4: 1271.
- Phyllanthus suffrutescens*** Pax, Bot. Jahrb. Syst. 15: 523 (1893).  
 Typus: Hildebrandt 2692 (B holotypus, destr.).  
 Ref.: Gilbert M.G. in Edwards S., Mesfin Tadesse & Hedberg I. 1995. Fl. of Ethiopia and Eritrea 2 (2): 281.
- Euphorbia longituberculosa*** Hochst. ex Boiss., in DC., Prodr. 15 (2): 85 (1862).  
 Typus: Schimper (1854) 2307 (G holotypus; K isotypus).  
 Ref.: Gilbert M.G. in Edwards S., Mesfin Tadesse & Hedberg I. 1995. Fl. of Ethiopia and Eritrea 2 (2): 352.
- Tragia cinerea*** (Pax) M.G.Gilbert & Radcl.-Sm., Kew Bull. 40 (2): 394 (1985).  
 Ref.: Gilbert M.G. in Edwards S., Mesfin Tadesse & Hedberg I. 1995. Fl. of Ethiopia and Eritrea 2 (2): 308, 309.

## EUPHORBIACEAE

**Tragia rhoicifolia** Chiov., Fl. Somalia: 310, ♀ t.  
XXXVI f. 2 (1929).

Holotypus: Puccioni & Stefanini 787 [872].  
Somalia.

**Tragia stipularis** Radcl.-Sm., Kew Bull. 37 (4):  
688 (1983).

Isotypus: Tanner 1539.  
(K holotypus. Radcliffe-Smith, Kew Bull. 37  
(4): 688. 1983).  
Tanzania.

**Tragia uncinata** M.G.Gilbert, Nordic J. Bot. 12  
(4): 399 (1992).

Holotypus: Benedetto 574.  
Ethiopia.

In the protologue the number of the holotype is  
'547' instead of '574', moreover the date on the  
specimen (November 1939) differs from the date  
mentioned in the protologue (December 1939).

*Tragiella pavoniifolia* Chiov., Fl. Somalia: 310 (≡)  
(1929).

Holotypus: Puccioni & Stefanini 516 [569].  
Somalia.

**Dalechampia pavoniifolia** (Chiov.) M.G.Gilbert,  
Nordic J. Bot. 12 (4): 400 (1992).

Ref.: Govaerts R., Frodin D. & Radcliffe-  
Smith A. 2000. World Check. Bibl. Euphorbiaceae  
(and Pandaceae) 2: 555.

*Zimmermannia stipularis* Radcl.-Sm., Kew Bull. (≡)  
36 (1): 128 (1981).

Isotypus: Procter 2479.  
(K holotypus. Radcliffe-Smith, Kew Bull. 36:  
128. 1981).  
Tanzania.

**Meineckia stipularis** (Radcl.-Sm.) Brunel ex  
Radcl.-Sm., Kew Bull. 52 (1): 175 (1997).

Ref.: Govaerts R., Frodin D. & Radcliffe-  
Smith A. 2000. World Check. Bibl. Euphorbiaceae  
(and Pandaceae) 3: 1170.

## GERANIACEAE

- Monsonia biflora* DC. var. *pygmaea* Chiov., (=) *Monsonia angustifolia* E.Mey. ex A.Rich., Tent. Nuovo Giorn. Bot. Ital. n. s. 26: 151 (1919).  
 Holotypus: Dainelli & Marinelli 147.  
 Eritrea.
- Monsonia longipes* R.Knuth var. *boranensis* (=) *Monsonia longipes* R.Knuth, Bot. Jahrb. Syst. 40: 66 (1907).  
 Cufod., Miss. Biol. Borana, Racc. Bot. Angiosp.-Gymnosp.: 90, ♀ 91 (1939).  
 Syntypi: Cufodontis 220, 489.  
 Ethiopia.
- Monsonia uniflora* Chiov., Fl. Somalia: 121, ♀ t. X (=) *Monsonia ignea* Schinz, Bull. Herb. Boissier 3: 399 (1895).  
 f. 1 (1929).  
 Holotypus: Puccioni & Stefanini 959 [1054].  
 Somalia.
- Pelargonium christophoranum** Verdc., Kew Bull. 22 (3): 428 (1968).  
 Isotypus: Hemming 2322.  
 (EA holotypus. Verdcourt, Kew Bull. 22 (3): 428. 1968).  
 Somalia.
- Pelargonium gallense* Chiov., Ann. Bot. (Rome) 9 (=) *Pelargonium whytei* Baker, Bull. Misc. Inform. Kew 1897: 246 (1897).  
 (3): 318 (1911).  
 Syntypi: Negri 419, 972.  
 Ethiopia.
- Pelargonium hararensense** Engl. ex R.Knuth in Engler, Pflanzenr. 4, 129: 435 (1912).  
 Isoneotypus: Burger 2361 (K neotypus. Kokwaro, Webbia 25 (2): 667. 1971).  
 Ethiopia.  
 In Webbia instead of 'Burger 2361' there is 'Burger 3261'.
- Pelargonium quinquelobatum* Hochst. ex A.Rich. (=) *Pelargonium somalense* Franch., in Revoil, Faune & Flore des Comalis: 19 (1882).  
 var. *migiurtinorum* Chiov., Fl. Somalia: 122 (1929).  
 Holotypus: Puccioni & Stefanini 780 [863].  
 Somalia.  
 Chiovenda in Errata-Corrigae of Fl. Somalia considers this taxon as a species: Pelargonium *migiurtinorum* (Chiov.) Chiov.

## GISEKIACEAE

*Gisekia pharnaceoides* L. var. *pseudopaniculata* (≡) ***Gisekia diffusa*** M.G.Gilbert, Kew Bull. 48 (2): 348 (1993).  
C.Jeffrey, Kew Bull. 14 (2): 235 (1960).  
Isotypus: Gillett 13041.  
(K holotypus. Gilbert, Kew Bull. 48 (2): 348.  
1993).  
Kenya.

Ref.: Gilbert M.G. in Edwards S., Mesfin Tadesse, Sebsebe Demissew & Hedberg I. 2000.  
Fl. of Ethiopia and Eritrea 2 (1): 239.

## HERNANDIACEAE

***Gyrocarpus americanus*** Jacq. subsp. ***africanus***  
Kubitzki, Engl. Jahrb. Syst. 89: 186 (1969).  
Holotypus: Beccari 171.  
Eritrea.

***Gyrocarpus hababensis*** Chiov., Ann. Bot. (Rome) 9 (2): 132 (1911).  
Lectotypus: Terracciano & Pappi 4 (Kubitzki, Bot. Jahrb. Syst. 89: 188. 1969).  
Syntypi: Pappi 8256; Terracciano & Pappi 1268.  
Eritrea.

## HYDNORACEAE

***Hydnora johannis*** Becc., Nuovo Giorn. Bot. Ital. 3: 5 (1871).  
Holotypus: Beccari 170.  
Ethiopia.

*Hydnora ruspolii* Chiov., Result. Sc. Miss. (=) ***Hydnora johannis*** Becc., Nuovo Giorn. Bot. Ital. 3: 5 (1871).  
Stefanini-Paoli Somal. Ital. I: 157 (1916) (in clavi), Bull. Soc. Bot. Ital. 1917: 57 (1917).  
Holotypus: Ruspoli & Riva 1091 (pro parte).  
Ethiopia.

Typus Beccari 170 (FT holotypus).  
Ref.: Musselmann L.J. in Edwards S., Mesfin Tadesse, Sebsebe Demissew & Hedberg I. 2000.  
Fl. of Ethiopia and Eritrea 2 (1): 56, ♦ 57.

## ILLECEBRACEAE

*Hafunia globifera* Chiov., Fl. Somalia: 90, ♦ t. III (=) ***Sphaerocoma hookeri*** T.Anderson, J. Proc. Linn. Soc., Bot. 5: 16, ♦ t. 3 (1860).  
f. 1 (1929).  
Holotypus: Puccioni & Stefanini 23 [23].  
Somalia.

Typus: Thomson 36 (K holotypus).  
Ref.: Gilbert M.G. 1993. Fl. of Somalia 1: 99.

## ILLECEBRACEAE

*Scleranthus hamatus* Chiov., nom. illeg., non ( = ) *Scleranthus annuus* L., Sp. Pl.: 406 (1753).  
Hausskn. (1891), Atti Reale Accad. Italia, Mem.  
Cl. Sci. Fis., Ser. 7: 11 (2): 19 (1940).  
Syntypi: Senni 899, 1523, 2036.  
Ethiopia.

*Scleranthus annuus* L., Sp. Pl.: 406 (1753).  
Typus: from Europe.  
Ref.: Gilbert M.G. in Edwards S., Mesfin Tadesse, Sebsebe Demissew & Hedberg I. 2000.  
Fl. of Ethiopia and Eritrea 2 (1): 203, ♦ 203.

## LAURACEAE

*Tylostemon kenyensis* Chiov., Racc. Bot. Miss. ( = )  
Consolata Kenya: 107 (1935).  
Holotypus/Isotypus: Balbo 672 \*.  
Kenya.

*Ocotea kenyensis* (Chiov.) Robyns & R.Wilczek,  
Fl. Congo Belg. & Ruanda Urundi 2: 406, ♦ 407  
(1951).  
Ref.: Friis I. in Edwards S., Mesfin Tadesse,  
Sebsebe Demissew & Hedberg I. 2000. Fl. of  
Ethiopia and Eritrea 2 (1): 14, ♦ 15.

## LEGUMINOSAE-CAESALPINIOIDEAE

*Baikiaea suzannae* Ghesq., in Ledoux, Compt. ( = )  
Rend. Soc. Biol. Paris 114: 184 (1933).  
Isotypus: Ghesquière 586.  
(BR holotypus. Ledoux, Compt. Rend. Soc.  
Biol. Paris 114: 184. 1933).  
Zaire.

*Baikiaea insignis* Benth., Trans. Linn. Soc.  
London 25: 314, ♦ t. 41 (1865).  
Typus: Mann 2342 (K holotypus).  
Ref.: Aubréville A. in Aubréville A. & Leroy  
J.-F. 1970. Fl. du Cameroun 9, Légumineuses-  
Césalpinioidées: 172, ♦ 173.

*Bauhinia argentea* Chiov., Ann. Bot. (Rome) 13 ( = )  
(3): 388 (1915).  
Syntypi: Paoli 832, 909.  
Somalia.

*Tylosema argentea* (Chiov.) Brenan, Kew Bull.  
17 (2): 214 (1963).  
Ref.: Thulin M. 1993. Fl. of Somalia 1: 361.

**Bauhinia leucantha** Thulin, Nordic J. Bot. 9 (1):  
51, ♦ 52 (1989).  
Isotypus: Thulin & Warfa 4572.  
(UPS holotypus. Thulin, Nordic J. Bot. 9 (1):  
51. 1989).  
Somalia.

*Bauhinia somalensis* Pic.Serm. & Roti Mich., ( = )  
Webbia 13 (1): 149, ♦ 151 (1957).  
Isotypus: Collenette 278.  
(K holotypus. Roti-Michelozzi, Webbia 13 (1):  
149. 1957).  
Somalia.

*Bauhinia ellenbeckii* Harms, Bot. Jahrb. Syst. 33:  
158 (1904).  
Typi: Ellenbeck 1107, 2048 (B syntypi destr);  
fig. 169 in Engler & Drude, Veg. Erde 9 (1/1): 193  
(1910) (neotypus).  
Ref.: Thulin M. 1993. Fl. of Somalia 1: 360.

**Berlinia grandiflora** (Vahl) Hutch. & Dalziel var.  
**pseudoauriculata** Hauman, Bull. Séances Inst.  
Roy. Colon. Belge 23 (2): 481 (1952).  
Isotypus: Dacremont 268.  
(BR holotypus. Hauman, Bull. Séances Inst.  
Roy. Colon. Belge 23 (2): 481. 1952).  
Zaire.

## LEGUMINOSAE-CAESALPINIOIDEAE

**Caesalpinia bessac** Chiov., Fl. Somalia: 156 (1929).

Holotypus: Robecchi-Bricchetti 622.  
Somalia.

**Caesalpinia dalei** Brenan & J.B.Gillett, Kew Bull. 17 (2): 198 (1963).

Isotypus: Dale in F.H. 3572.  
(K holotypus. Brenan & Gillett, Kew Bull. 17 (2): 199. 1963).  
Kenya.

**Caesalpinia erianthera** Chiov. Fl. Somalia: 155,  
◊ t. XVI f. 2a & 2b (1929).

Syntypi: Robecchi-Bricchetti 534; Puccioni & Stefanini 450 [501].  
Somalia.

**Caesalpinia erianthera** Chiov. var. **pubescens**  
Brenan, Kew Bull. 17 (2): 203 (1963).

Isotypus: Gillett 13274.  
(K holotypus. Brenan, Kew Bull. 17 (2): 203.  
1963).  
Kenya.

*Caesalpinia erlangeri* Harms, Bot. Jahrb. Syst. 33: (≡)  
160 (1902).

Neotypus: Riva 1104 (Roti-Michelozzi,  
Webbia 13 (1): 209. 1957).  
Ethiopia/Somalia border.

*Caesalpinia gilletii* Hutch. & E.A.Bruce, Bull. (=)  
Misc. Inform. Kew 1941 (2): 114 (1941).

Isotypus: Gillett 4157.  
(K holotypus. Hutchinson & Bruce, Bull.  
Misc. Inform. Kew 1941 (2): 114. 1941).  
Somalia/Ethiopia border.

**Caesalpinia oligophylla** Harms, Bot. Jahrb. Syst.  
33: 160 (1902).

Neotypus: Puccioni & Stefanini 134 [153]  
(Roti-Michelozzi, Webbia 13 (1): 207. 1957).  
Somalia.

*Cassia atroreticulata* Chiov., Fl. Somalia II: 173, (≡)  
◊ 174 (1932).

Syntypi: Senni 114, 117, 168.  
Somalia.

*Cassia baccarinii* Chiov., Ann. Bot. (Rome) 13 (≡)  
(3): 390 (1915).

Lectotypus: Paoli 946 (Serrato Valenti,  
Webbia 26 (1): 34. 1971).  
Somalia.

*Cassia fallacina* Chiov., Result. Sc. Miss. (≡)  
Stefanini-Paoli Somalia Ital. 1: 68 (1916).

Holotypus: Paoli 286.  
Somalia.

**Caesalpinia trothae** Harms subsp. **erlangeri**  
(Harms) Brenan, Kew Bull. 17 (2): 201 (1963).

Ref.: Thulin M. 1993. Fl. of Somalia 1: 345.

**Parkinsonia scioana** (Chiov.) Brenan, Kew Bull.  
17 (2): 209 (1963).

Typus: Negri 1358 (FT holotypus).  
Ref.: Thulin M. 1993. Fl. of Somalia 1: 347, ♦  
346.

**Cassia abbreviata** Oliv. subsp. **beareana**  
(Holmes) Brenan, Kew Bull. 13 (2): 232 (1958).

Typus: Dr. O'Sullivan Beare (London,  
Pharmaceutical Society holotypus).  
Ref.: Thulin M. 1993. Fl. of Somalia 1: 349.

**Senna baccarinii** (Chiov.) Lock, Kew Bull. 43  
(2): 339 (1988).

Ref.: Thulin M. 1993. Fl. of Somalia 1: 351, ♦  
350.

**Chamaecrista fallacina** (Chiov.) Lock, Kew Bull.  
43 (2): 336 (1988).

Ref.: Thulin M. 1993. Fl. of Somalia 1: 355.

**LEGUMINOSAE-CAESALPINIOIDEAE**

- Cassia humifusa* Brenan, Kew Bull. 13 (2): 246 (1958).  
 Isotypus: Gillett 13361.  
 (K holotypus. Brenan, Kew Bull. 13 (2): 246.  
 1958).  
 Kenya.
- Cassia italica* (Mill.) Spreng. subsp. *micrantha* (Brenan, Kew Bull. 13 (2): 241 (1958).  
 Isotypus: Padwa 144.  
 (K holotypus. Brenan, Kew Bull. 13 (2): 241.  
 1958).  
 Kenya.
- Cassia longiracemosa* Vatke var. *nummularifolia* (Chiov., Ann. Bot. (Rome) 13 (3): 391 (1915).  
 Holotypus: Paoli 957.  
 Somalia.
- Cassia puccioniana* Chiov., Fl. Somalia: 159, ♀ t. XVI f. 3 (1929).  
 Lectotypus: Puccioni & Stefanini 763 [844] (Thulin, Fl. of Somalia 1: 355. 1993).  
 Syntypi: Puccioni & Stefanini 412 [464], 580 [635].  
 Somalia.
- Cassia ruspolii* Chiov., Atti Reale Accad. Italia, Mem. Cl. Sci. Fis., Ser. 7, 11 (2): 29 (1940).  
 Holotypus: Ruspoli & Riva 1663.  
 Ethiopia.
- Cassia senna* L. var. *obtusata* Brenan, Kew Bull. 13 (2): 244 (1958).  
 Isotypus: Gillett 4100.  
 (K holotypus. Brenan, Kew Bull. 13 (2): 244.  
 1958).  
 Somalia.
- Ceratonia oreothauma* Hillc., G.P.Lewis & Verdc., Kew Bull. 35 (2): 261, ♀ 262, 264 (1980).  
 Isotypus: Radcliffe-Smith 4199.  
 (K holotypus. Hillcoat, Lewis & Verdcourt, Kew Bull. 35 (2): 261. 1980).  
 Oman.
- Cynometra greenwayi* Brenan, Kew Bull. 17 (2): 209, ♀ 208 (1963).  
 Isotypus: Greenway 10440.  
 (K holotypus. Brenan, Kew Bull. 17 (2): 209.  
 1963).  
 Kenya.
- Parkinsonia raimondoi* Brenan, Kew Bull. 35 (3): 563, ♀ 564 (1980).  
 Isotypus: Raimondo 1.  
 (K holotypus. Brenan, Kew Bull. 35 (3): 563.  
 1980).  
 Somalia.
- Senna humifusa* (Brenan) Lock, Kew Bull. 43 (2): 339 (1988).**  
 Ref.: Thulin M. 1993. Fl. of Somalia 1: 351, ♀ 352.
- Senna italicica* Miller subsp. *micrantha* (Brenan) Lock, Kew Bull. 43 (2): 339 (1988).**  
 Ref.: Thulin M. 1993. Fl. of Somalia 1: 353, ♀ 350.
- Senna longiracemosa* (Vatke) Lock, Kew Bull. 43 (2): 339 (1988).**  
 Typus: Hildebrandt 2506 (K holotypus destr.; BM, K, isotypi).  
 Ref.: Thulin M. 1993. Fl. of Somalia 1: 352.
- Chamaecrista puccioniana* (Chiov.) Lock, Kew Bull. 43 (2): 338 (1988).**  
 Ref.: Thulin M. 1993. Fl. of Somalia 1: 355.
- Senna ruspolii* (Chiov.) Lock, Kew Bull. 43 (2): 340 (1988).**  
 Ref.: Polhill R.M. & Thulin M. in Hedberg I. & Edwards S. 1989. Fl. of Ethiopia 3: 61.
- Senna alexandrina* Mill. var. *obtusata* (Brenan) Lock, Kew Bull. 43 (2): 338 (1988).**  
 Ref.: Thulin M. 1993. Fl. of Somalia 1: 354.

## LEGUMINOSAE-CAESALPINIOIDEAE

- Peltophoropsis scioana* Chiov., Ann. Bot. (Rome): (≡) 13 (3): 386 (1915).  
Holotypus: Negri 1358.  
Ethiopia.
- Parkinsonia scioana* (Chiov.) Brenan, Kew Bull. 17 (2): 209 (1963).  
Ref.: Thulin M. in Hedberg I. & Edwards S. 1989. Fl. of Ethiopia 3: 54, ♦ 55.
- Poinciana baccal* Chiov., Ann. Bot. (Rome) 13 (3): 389 (1915).  
Syntypi: Paoli 836, 852.  
Somalia.
- Delonix baccal* (Chiov.) Baker f., Legum. Trop. Africa 3: 624 (1930).  
Ref.: Thulin M. 1993. Fl. of Somalia 1: 344.
- Sennia sciap-sciaple* Chiov., Fl. Somalia II: 146, ♦ (=) 146 (1932).  
Holotypus: Senni 224.  
Somalia.
- Dialium orientale* Baker f., J. Bot. 67: 195 (1929)  
Typus: Webber 613 in C.M. 16436 (K  
holotypus; EA isotypus).  
Ref.: Thulin M. 1993. Fl. of Somalia 1: 357,  
♦356.
- Tamarindus indica* L. var. *emarginata* Chiov., Fl. Somalia II: 178, ♦ 178 (1932).  
Holotypus/Isotypus: Confalone 13.  
Somalia.
- Tamarindus indica* L., Sp. Pl.: 34 (1753).  
Typus: uncertain.  
Ref.: Thulin M. 1993. Fl. of Somalia 1: 358,  
♦359.
- Tessmannia burtii** Harms, Feddes Repert. Spec. Nov. Regni Veg. 43: 110 (1938).  
Isotypus: Burtt 6004.  
(K holotypus. Brenan in Milne-Redhead &  
Polhill, Fl Trop. E. Afr., Leguminosae subfam.  
Caesalpinioideae: 107. 1967)  
Rhodesia.

## LEGUMINOSAE-MIMOSOIDEAE

**Acacia ankokib** Chiov., Fl. Somalia II: 190, ♦ 190 (1932).

Syntypes: Robecchi-Bricchetti 529.  
Somalia.

**Acacia asak** Willd. var. *unispinosa* Fiori, Agric. Colon. 5 (3): 93, ♦ f. 67/3 (1911).

Lectotypus: Fiori 135 b (Ross, Consp. Afric. Acacia Sp.: 64. 1979).  
Eritrea.

**Acacia senegal** (L.) Willd., Sp. Pl. IV: 1077 (1806).

Typus: Herb. Adanson 16899 (P neotypus).  
Ref.: Thulin M., Hassan A.S. & Styles B.T. in Thulin M. 1993. Fl. of Somalia 1: 370, ♦ 371.

Link : *Acacia oliveri* Vatke, Thulin & Asfaw Hunde, Fl. of Ethiopia 3 : 80 (1989).

**Acacia bavazzanoi** Pic.Serm., Miss. Stud. Lago Tana, VII, Ricerche Bot. I: 54, ♦ t. VII & VIII (1951).

Holotypus: Pichi-Sermolli 2253.  
Ethiopia.

**Acacia benadirensis** Chiov., Fl. Somalia II: 183 (1932) pro parte, saltem quoad specim. cit. ex Somalia, Senni 196 et Senni 691.

Lectotypus: Senni 196 (Ross, Consp. Afric. Acacia Sp.: 85. 1979).

Syntypes: Senni 691.  
Somalia.

Ross (loc. cit.) in a note quotes: “Although Chiovenda used the same epithet (benadirensis) as in his earlier variety of *A. bussei*, there is no evidence that the later species was based on his earlier variety. Different and better distinguishing characters were given, and a new selection of syntypes cited, but without reference to the earlier ones cited for var. *benadirensis*.”

**Acacia bricchettiana** Chiov., Ann. Bot. (Rome) 13 (3): 396 (1915).

Holotypus: Robecchi-Bricchetti 533.  
Ethiopia.

**Acacia horrida** (L.) Willd. subsp. **benadirensis** (Chiov.) Hillc. & Brenan, Kew Bull. 13 (1): 40 (1958).

Typi: Paoli 94, 131 bis (FT syntypi).  
Ref.: Ross J.H. 1979. Consp. Afric. Acacia Sp.: 85, ♦ 86.

**Acacia bussei** Harms ex Sjöstedt var. *benadirensis* Chiov., Result. Sc. Miss. Stefanini-Paoli Somalia Ital. 1: 72 (1916).

Lectotypus: Paoli 94 (Brenan, Kew Bull. 11 (2): 191. 1956).

Syntypes: Paoli 131 bis.  
Somalia.

**Acacia edgeworthii** T.Anderson, J. Proc. Linn. Soc., Bot. 5, suppl. 1: 18 (1860).

Typi: Edgeworth, Hooker & Thomson; T. Anderson (K syntypi).

Ref.: Thulin M., Hassan A.S. & Styles B.T. in Thulin M. 1993. Fl. of Somalia 1: 383, ♦ 371.

**Acacia horrida** (L.) Willd. subsp. **benadirensis** (Chiov.) Hillc. & Brenan, Kew Bull. 13 (1): 40 (1958).

Ref. Thulin M., Hassan A.S. & Styles B.T. in Thulin M. 1993. Fl. of Somalia 1: 378, ♦ 371.

**Acacia caraniana** Chiov., Fl. Somalia: 166, ♦ t. XVIII (1929).

Holotypus: Puccioni & Stefanini 704 [781].  
Somalia.

**Acacia cernua** Thulin & Hassan, Nordic J. Bot. 16 (3): 303, ♦ 304 (1996).

Isotypus: Thulin, Dahir & Hassan 9188.  
(UPS holotypus. Thulin & Hassan, Nordic J. Bot. 16 (3): 303. 1996).  
Somalia.

## LEGUMINOSAE-MIMOSOIDEAE

**Acacia cheilanthalifolia** Chiov., Fl. Somalia: 168, ♦ t. XVII f. 1; t. XLIV f. 2; t. XLV f. 1 (1929).  
 Syntypi: Puccioni & Stefanini 479 [531], 509 [562], 663 [727], 762 [843], 1010 [1115].  
 Somalia.

**Acacia cheilanthalifolia** Chiov. var. *hirtella* Chiov., (=) Fl. Somalia: 169 (1929).  
 Holotypus: Puccioni & Stefanini 695 [769].  
 Somalia.

**Acacia cheilanthalifolia** Chiov., Fl. Somalia: 168, ♦ t. XVII f. 1; t. XLIV f. 2; t. XLV f. 1 (1929).  
 Typi: Puccioni & Stefanini 479 [531], 509 [562], 663 [727], 762 [843], 1010 [1115] (all syntypi FT).  
 Ref.: Thulin M., Hassan A.S. & Styles B.T. in Thulin M. 1993. Fl. of Somalia 1: 374.

**Acacia circummarginata** Chiov., Ann. Bot. (Rome) 13 (3): 394 (1915).  
 Syntypi: Paoli 794, 913 bis, 920.  
 Somalia.

According to Thulin, Hassan & Styles, (Fl. of Somalia 1: 372. 1993), the syntype Paoli 1010 seems to be 'Acacia senegal (L.) Willd.'

**Acacia condyloclada** Chiov., Ann. Bot. (Rome) 13 (3): 391 (1915).  
 Holotypus: Ruspoli & Riva 1079.  
 Ethiopia.

**Acacia cufodontii** Chiov., Miss. Biol. Borana, Racc. Bot. Angiosp.-Gymnosp.: 55, ♦ 56 (1939).  
 Holotypus: Cufodontis 114.  
 Ethiopia.

**Acacia senegal** (L.) Willd. var. *senegal*, Sp. Pl. IV: 1077 (1806).  
 Typus: Herb. Adanson 16899 (P neotypus).  
 Ref.: Thulin M. & Asfaw Hunde in Hedberg I. & Edwards S. 1989. Fl. of Ethiopia 3: 78.

**Acacia dolichocephala** Harms, Annuario Reale Ist. Bot. Roma 7 (1): 86 (1897).  
 Holotypus: Riva 599.  
 Ethiopia.

**Acacia elatior** Brenan, Kew Bull. 12 (1): 94 (1957).  
 Isotypus: Greenway 8857.  
 (K holotypus. Brenan, Kew Bull. 12 (1): 94. 1957).  
 Kenya.

**Acacia erythraea** Chiov., Fl. Somalia: 163 (1929).  
 Holotypus: Puccioni & Stefanini 138 [157].  
 Somalia.

**Acacia edgeworthii** T. Anderson, J. Proc. Linn. Soc., Bot. 5, suppl. 1: 18 (1860).  
 Typi: Edgeworth, Hooker & Thomson; T. Anderson (K syntypi).  
 Ref.: Thulin M., Hassan A.S. & Styles B.T. in Thulin M. 1993. Fl. of Somalia 1: 383, ♦ 371.

**Acacia flagellaris** Thulin, Nordic J. Bot. 8 (5): 461, ♦ 461 (1989).  
 Isotypus: Thulin & Warfa 5844.  
 (UPS holotypus. Thulin, Nordic J. Bot. 8 (5): 461. 1989).  
 Somalia.

## LEGUMINOSAE-MIMOSOIDEAE

**Acacia gerrardii** Benth. var. **latisiliqua** Brenan,  
Kew Bull. 12 (3): 369 (1958).

Isotypus: Trapnell 2215.

(K holotypus. Brenan, Kew Bull. 12 (3): 369.  
1958).

Kenya.

**Acacia gorinii** Chiov., Fl. Somalia II: 194, ♀ 194 (=) (1932).

Syntypi: Gorini 221; Senni 435, 449.  
Somalia.

In the protologue Chiovenda quotes Gorini 221 as the type. The specimen is lacking in flowers.

**Acacia humifusa** Chiov., Fl. Somalia: 163 (1929). (=)

Holotypus: Puccioni & Stefanini 416 [468].  
Somalia.

**Acacia oerfota** (Forssk.) Schweinf., Bull. Herb. Boissier 4, app. II: 213 (1896).

Typus: Forsskål (missing from C).

Ref.: Thulin M., Hassan A.S. & Styles B.T. in Thulin M. 1993. Fl. of Somalia 1: 382, ♀ 371.

**Acacia edgeworthii** T.Anderson, J. Proc. Linn. Soc., Bot. 5, suppl. 1: 18 (1860).

Typi: Edgeworth, Hooker & Thomson; T. Anderson (K syntypi).

Ref.: Thulin M., Hassan A.S. & Styles B.T. in Thulin M. 1993. Fl. of Somalia 1: 383, ♀ 371.

**Acacia moggii** Thulin & Tardelli, Willdenowia 17: 125, ♀ 126 (1988).

Holotypus/Isotypus: Moggi, Tardelli & Warfa 54.  
Somalia.

**Acacia negrii** Pic.Serm., Miss. Stud. Lago Tana, VII, Ricerche Bot. I: 55, ♀ t. IX & X (1951).

Syntypi: Negri 335; Senni 383, 1589.  
Ethiopia.

**Acacia nervosula** Chiov., Fl. Somalia II: 192, ♀ 192 (1932).

Holotypus: Senni 194.  
Somalia.

**Albizia obbiadensis** (Chiov.) Brenan, Kew Bull. 17 (1): 166 (1963).

Typus: Puccioni & Stefanini 553 [607] (FT holotypus).

Ref.: Thulin M. 1993. Fl. of Somalia 1: 385.

**Acacia obbiadensis** Chiov., Fl. Somalia: 160 (=) (1929).

Holotypus: Puccioni & Stefanini 553 [607].  
Somalia.

**Albizia obbiadensis** (Chiov.) Brenan, Kew Bull. 17 (1): 166 (1963).

Ref.: Thulin M. 1993. Fl. of Somalia 1: 385.

**Acacia ogadensis** Chiov., Ann. Bot. (Rome) 13 (3): 393 (1915).

Syntypi: Robecchi-Bricchetti 594; Paoli 811, 812.

Ethiopia and Somalia.

**Acacia origena** Asfaw, Nordic J. Bot. 2 (4): 337, ♀ 338 (1982).

Holotypus: Pappi 4946.  
Eritrea.

**Acacia oxyosprion** Chiov., Fl. Somalia II: 188, ♀ 188 (1932).

Holotypus: Senni 651.  
Somalia.

**Acacia senegal** (L.) Willd., Sp. Pl. IV: 1077 (1806).

Typus: Herb. Adanson 16899 (P neotypus).

Ref.: Thulin M., Hassan A.S. & Styles B.T. in Thulin M. 1993. Fl. of Somalia 1: 370, ♀ 371.

## LEGUMINOSAE-MIMOSOIDEAE

**Acacia paolii** Chiov., Ann. Bot. (Rome) 13 (3): 395 (1915).

Syntypi: Paoli 578, 611.  
Somalia.

**Acacia pappii** Gand., Bull. Soc. Bot. France 60: (=) 458 (1913).

Isotypus: Pappi 7388.  
Ethiopia.

**Acacia tortilis** (Forssk.) Hayne subsp. **spiropurpurea** (Hochst. ex A.Rich.) Brenan, Kew Bull. 12 (1): 88 (1957).

Typi: Schimper 502, 612, 658 (P syntypi; K, FI isosyntypi).  
Ref.: Thulin M. & Asfaw Hunde in Hedberg I. & Edwards S. 1989. Fl. of Ethiopia 3: 87, ♦ 83.

**Acacia paradoxa** Chiov., Fl. Somalia: 165, ♦ t. XVII f. 2; t. XLV f. 2 (1929), nom. illeg., non DC. (1813).

Holotypus: Puccioni & Stefanini 533 [585].  
Somalia.

**Acacia hamulosa** Benth., in Hook., London J. Bot. 1: 509 (1842).

Typus: S. Fischer 72 (K holotypus).

Ref.: Thulin M., Hassan A.S. & Styles B.T. in Thulin M. 1993. Fl. of Somalia 1: 373, ♦ 373.

**Acacia pilispina** Pic-Serm., Miss. Stud. Lago Tana, VII, Ricerche Bot. I: 205, ♦ t. XLIII (1951).

Holotypus/Isotypus: Pichi-Sermolli 2696.  
Ethiopia.

**Acacia pseudosocotrana** Chiov., Fl. Somalia: 161 (=) (1929).

Holotypus: Puccioni & Stefanini 38 [38].  
Somalia.

**Acacia edgeworthii** T.Anderson, J. Proc. Linn. Soc., Bot. 5, suppl. 1: 18 (1860).

Typi: Edgeworth, Hooker & Thomson; T. Anderson (K syntypi).

Ref.: Thulin M., Hassan A.S. & Styles B.T. in Thulin M. 1993. Fl. of Somalia 1: 383, ♦ 371.

**Acacia puccioniana** Chiov., Fl. Somalia: 164, ♦ t. XIV f. 3 (1929).

Holotypus: Puccioni & Stefanini 158 [177].  
Somalia.

**Dichrostachys kirkii** Benth., Trans. Linn. Soc. London 30: 383 (1875).

Typus: Kirk s. nr. (K holotypus).

Ref.: Thulin M. 1993. Fl. of Somalia 1: 366, ♦ 365.

**Acacia sarcophylla** Chiov., Fl. Somalia: 161 (1929).

Holotypus: Puccioni & Stefanini 630 [693].  
Somalia.

**Acacia senegal** (L.) Willd. var. **kerensis** Schweinf., Bull. Herb. Boissier 4 app. II: 216 (1896).

Isosyntypus: Schweinfurth 745.  
Eritrea.

**Acacia senegal** (L.) Willd. var. **platyosprion** (=) Chiov., Fl. Somalia II: 187, ♦ 187 (1932).

Syntypi: Senni 87, 116, 191, 201; Gorini 421.  
Somalia.

The figure in the protologue bears the caption 'Acacia platyosprion Chiov.'

**Acacia senegal** (L.) Willd., Sp. Pl. IV: 1077 (1806).

Typus: Herb. Adanson 16899 (P neotypus).

Ref.: Thulin M., Hassan A.S. & Styles B.T. in Thulin M. 1993. Fl. of Somalia 1: 370, ♦ 371.

## LEGUMINOSAE-MIMOSOIDEAE

- Acacia senegal* (L.) Willd. var. (=) *Acacia senegal* (L.) Willd., Sp. Pl. IV: 1077 (1806).  
*pseudoglaucocephylla* Chiov., Result. Sc. Miss. Stefanini-Paoli Somalia Ital. 1: 72 (1916).  
 Lectotypus: Paoli 83 (Thulin, Hassan & Styles, Fl. of Somalia 1: 370. 1993).  
 Syntypi: Paoli 253, 682, 875, 883 ter, 1052.  
 Somalia.  
 In the protologue there is 'Paoli 883 bis' instead of 'Pappi 883 ter'.
- Acacia sennii* Chiov., Fl. Somalia II: 200, ♦ 200 (=) *Acacia zanzibarica* (S.Moore) Taub. var. *zanzibarica*, Pflanzenw. Ost-Afrikas C: 195 (1895).  
 Syntypi: Senni 115, 434.  
 Somalia.
- Acacia stefaninii* Chiov., Ann. Bot. (Rome) 13 (3): 395 (1915).  
 Holotypus: Paoli 844.  
 Somalia.
- Acacia sultani* Chiov., Fl. Somalia: 162 (1929). (=) *Acacia reficiens* Wawra subsp. *misera* (Vatke) Brenan, Kew Bull. 12 (1): 90 (1957).  
 Holotypus: Puccioni & Stefanini 472 [524].  
 Somalia.
- Acacia tortilis* (Forssk.) Hayne var. *crinita* Chiov., Result. Sc. Miss. Stefanini-Paoli Somalia Ital. 1: 71 (1916).  
 Holotypus: Paoli 907.  
 Somalia.
- Acacia tortilis* (Forssk.) Hayne var. *lenticellosa* Chiov., Fl. Somalia II: ♦ 197 (1932), nom. invalid., figura tantum sine descr.  
 Holotypus: Senni 480.  
 Somalia.
- Acacia turnbulliana** Brenan, Kew Bull. 12 (3): 370 (1958).  
 Isotypus: Gillett 13364 (K holotypus. Brenan, Kew Bull. 12 (3): 370. 1958).  
 Kenya.
- Acacia zizyphispina* Chiov., Fl. Somalia: 167 (1929).  
 Syntypi: Puccioni & Stefanini 152 [171], 171 [193].  
 Somalia.

## LEGUMINOSAE-MIMOSOIDEAE

**Calliandra gilbertii** Thulin & Asfaw, Nordic J. Bot. 1 (1): 27, ♫ 28 (1981).

Isotypus: Gilbert & Thulin 1288.

(UPS holotypus. Thulin, Guinet & Asfaw Hunde, Nordic J. Bot. 1 (1): 27. 1981).

Kenya.

**Dichrostachys benadirensis** Chiov., Result. Sc. (=) Miss. Stefanini-Paoli Somalia Ital. 1: 74, ♫ t. 8 f. B; t. 9, t. 10 (1916).

Syntypi: Paoli 69, 131, 133.  
Somalia.

**Dichrostachys kirkii** Benth., Trans. Linn. Soc. London 30: 383 (1875).

Typus: Kirk s. nr. (K holotypus).

Ref.: Thulin M. 1993. Fl. of Somalia 1: 366, ♫ 365.

**Dichrostachys cinerea** (L.) Wight & Arn. subsp. **africana** Brenan & Brummitt var. **pubescens** Brenan & Brummitt, Bol. Soc. Brot. sér. 2, 39: 86 (1965).

Isotypus: Barbosa & Lemos 8149.

(K holotypus. Brenan & Brummitt, Bol. Soc. Brot. sér. 2, 39: 86. 1965).

Mozambique.

**Dichrostachys microcephala** Renvoize, Kew Bull. 26 (3): 437 (1972).

Isotypus: Renvoize 1059.

(K holotypus. Renvoize, Kew Bull. 26 (3): 437. 1972).

Seychelles, Aldabra.

**Entada abyssinica** Steud. ex A.Rich. var. (=) **intermedia** Fiori, Agric. Colon. 5 : 170 (1911).

Syntypi: Pappi 966, 4194, 5387; Terracciano & Pappi 2578; Fiori 131.

Eritrea.

**Entada abyssinica** Steud. ex A.Rich., Tent. Fl. Abyss. 1: 234 (1847).

Typi: Schimper II: 520 (K isosyntypus), Quartin-Dillon s. nr. (P syntypus).

Ref.: Thulin M. & Asfaw Hunde in Hedberg I. & Edwards S. 1989. Fl. of Ethiopia 3: 72, ♫ 73.

## LEGUMINOSAE-PAPILIONIODEAE

**Abrus precatorius** L. subsp. **africanus** Verdc., Mitt. Bot. Staatssamml. München 7: 328 (1970).

Isotypus: Polhill & Paulo 628.

(K holotypus. Verdcourt, Kew Bull. 24 (2): 241. 1970).

Kenya.

**Aeschynomene ruspoliana** Taub. ex Harms, Annuario Reale Ist. Bot. Roma 7 (1): 94 (1897).

Holotypus: Riva 1294.

Ethiopia.

**Alysicarpus glumaceus** (Vahl) DC. var. **ludens** (=) (Wall.) Baker forma **pilosulus** Chiov., as 'pilosula', Fl. Somalia: 148 (1929).

Holotypus: Puccioni & Stefanini 413 [465].  
Somalia.

**Alysicarpus glumaceus** (Vahl) DC. subsp. **glumaceus** var. **intermedius** Verdc., Kew Bull. 24 (1): 68 (1970).

Typus: Bogdan 2601 (K holotypus; EA isotypus).

Ref.: Thulin M. 1993. Fl. of Somalia 1: 428.

## LEGUMINOSAE-PAPILIONOIDEAE

- Alysicarpus rugosus* (Willd.) DC. var. (≡) *Alysicarpus glumaceus* (Vahl) DC. subsp. *hispidocarpus* (Fiori) J.Léonard, Bull. Jard. Bot. État 24 (1): 101 (1954).  
*hispidocarpus* (Fiori) J.Léonard, Bull. Jard. Bot. État 24 (1): 101 (1954).  
 Ref.: Thulin M. 1993. Fl. of Somalia 1: 428.
- Holotypus: Fiori 25.  
 Somalia.  
 Gandoer, in Bull. Soc. Bot. France 69: 349 (1922) published 'Alysicarpus squamosus' based on the same type.
- Aspalathus acanthoclada** R.Dahlgren, Opera bot. 9 (1): 269 (1963).  
 Isotypus: Dahlgren & Peterson 347.  
 (LD holotypus. Dahlgren, Fl. of South. Africa 13 (3) f. 6: 287. 1988).  
 South Africa.
- Aspalathus crassisepala** R.Dahlgren, Opera bot. 9 (1): 275 (1963).  
 Isotypus: Dahlgren & Peterson 1323.  
 (LD holotypus. Dahlgren, Opera bot. 9 (1): 275. 1963).  
 South Africa.
- Aspalathus rigidifolia** R.Dahlgren, Opera bot. 9 (1): 288 (1963).  
 Isotypus: Dahlgren & Peterson 1374.  
 (LD holotypus. Dahlgren, Fl. of South. Africa 13 (3) f. 6: 339. 1988).  
 South Africa.
- Astragalus atropilosulus** (Hochst.) Bunge subsp. *atropilosulus* var. *mooney* J.B.Gillett, Kew Bull. 17 (3): 416 (1964).  
 Isotypus: Mooney 8368.  
 (K holotypus. Thulin, Fl. of Ethiopia 3: 231. 1989).  
 Ethiopia.
- Astragalus coerulescens* Chiov., Annuario Reale Ist. Bot. Roma 8 (3): 425 (1908). (≡) *Astragalus atropilosus* (Hochst.) Bunge subsp. *abyssinicus* (Hochst.) J.B.Gillett var. *coerulescens* (Chiov.) J.B.Gillett, Kew Bull. 17 (3): 418 (1964).  
 Syntypi: Pappi 3238, 3471, 4099, 4241, 4574, 4648, 4908, 5877; Terracciano & Pappi 1418, 2497; Tellini 456.  
 Eritrea.  
 Gillett (loc. cit.) and Thulin in Fl. of Ethiopia 3: 231, quote as syntypes only the specimens: Pappi 2497, 3238, 4241, 4574, 4648.
- Astragalus somalensis* Taub. ex Harms, Annuario Reale Ist. Bot. Roma 7 (1): 93 (1897). (≡) *Galega somalensis* (Taub. ex Harms) J.B.Gillett, Kew Bull. 17 (1): 84 (1963).  
 Holotypus: Riva 1398.  
 Ethiopia.
- Baphia keniensis* Brummitt, Kew Bull. 22 (3): 528, ♀ 529 (1968).  
 Isotypus: Gillett & Faden 18202.  
 (K holotypus. Brummitt, Kew Bull. 22 (3): 528. 1968).  
 Kenya.

## LEGUMINOSAE-PAPILIONOIDEAE

- Calpurnia uarandensis* Chiov., Fl. Somalia: 152, (=) ♦ t. XVI f. 1 (1929).  
Holotypus: Puccioni & Stefanini 501 [554].  
Somalia.
- Clitoria ternatea* L. forma *flaviflora* Chiov., (=)  
Result. Sc. Miss. Stefanini-Paoli Somalia Ital. 1:  
65 (1916).  
Holotypus: Paoli 1103.  
Somalia.
- Colutea istria* Mill. var. *macrophysa* Chiov., Ann. Bot. (Rome) 9 (1): 58 (1911).  
Holotypus: Chiovenda 1805.  
Ethiopia.
- Cordyla somalensis** J.B.Gillett subsp. **littoralis**  
J.B.Gillett, Kew Bull. 15 (3): 423 (1961).  
Holotypus: Puccioni & Stefanini 42 [42].  
Somalia.
- Crotalaria balbi** Chiov., Racc. Bot. Miss. Consolata Kenya: 27 (1935).  
Holotypus: Balbo 208 \*.  
Kenya.
- Crotalaria benadirensis** Chiov., Ann. Bot. (Rome) 13 (3): 377 (1915).  
Syntypi: Paoli 677, 692.  
Somalia.
- Crotalaria camisassae* Chiov., Racc. Bot. Miss. (=) Consolata Kenya: 27 (1935).  
Holotypus: Balbo 201 \*.  
Kenya.
- Crotalaria campstosepala** Thulin, Nordic J. Bot. 11 (1): 98, ♦ 100 (1991).  
Isotypus: Thulin & Abdi Dahir 6708.  
(UPS holotypus. Thulin, Nordic J. Bot. 11 (1): 98. 1991).  
Somalia.
- Crotalaria cleomifolia* Welw. ex Baker var. *iodesia* Chiov., Racc. Bot. Miss. Consolata Kenya: 26 (1935).  
Holotypus: Balbo 205 \*.  
Kenya.
- Crotalaria cylindrica* A.Rich. var. *pusilla* Chiov., (=) Annuario Reale Ist. Bot. Roma 8 (3): 401 (1908).  
Holotypus: Pappi 5043.  
Eritrea.
- Dalbergia uarandensis** (Chiov.) Thulin, Kew Bull. 39 (1): 164, ♦ 165 (1984).  
Ref.: Thulin M. 1993. Fl. of Somalia 1: 393, ♦ 393.
- Clitoria ternatea** L. Sp. Pl.: 753 (1753).  
Typi: Hermann 3: 13; 3: 20; 4: 49 (BM syntypi).  
Ref.: Thulin M. 1993. Fl. of Somalia 1: 428, ♦ 428.
- Colutea abyssinica** Kunth & Bouché, Ann. Sc. Nat. ser. III, 7: 188 (1847).  
Typus: Schimper I: 240 (B holotypus, destr.; BM, G, K, P, W isotypi).  
Ref.: Thulin M. in Hedberg I. & Edwards S. 1989. Fl. of Ethiopia 3: 233, ♦ 232.
- Crotalaria deserticola** Taub. ex Baker f., J. Linn. Soc., Bot. 42: 383 (1914).  
Typus: Stuhlmann 3483 (B holotypus destr.; BM, K, fragments).  
Ref.: Polhill R.M. 1982. Crot. Afr. Madag.: 277.
- Crotalaria cleomifolia** Welw. ex Baker, in Oliver D., Fl. Trop. Afr. 2: 43 (1871).  
Typus: Welwitsch 1966 (LISU holotypus; BM isotypus).  
Ref.: Polhill R.M. 1982. Crot. Afr. Madag.: 203, ♦ 205.
- Crotalaria cylindrica** A.Rich., Tent. Fl. Abyss. 1: 154 (1847).  
Typus: Petit 4 (P holotypus).  
Ref.: Thulin M. in Hedberg I. & Edwards S. 1989. Fl. of Ethiopia 3: 209.

## LEGUMINOSAE-PAPILIONOIDEAE

- Crotalaria drummondii*** Milne-Redh., Kew Bull. 15 (1): 158 (1961).  
Isotypus: Drummond & Hemsley 4148.  
(K holotypus. Milne-Redhead, Kew Bull. 15 (1): 158. 1961).  
Kenya.
- Crotalaria exaltata*** Polhill, Kew Bull. 22 (2): 304, ♫ 306 (1968).  
Isotypus: Gillett 14991.  
(K holotypus. Polhill, Kew Bull. 22 (2): 304. 1968).  
Ethiopia.
- Crotalaria fallax*** Chiov., Miss. Biol. Borana, Racc. Bot. Angiosp.-Gymnosp.: 59, ♫ 60 (1939).  
Holotypus/Isotypus: Cufodontis 255.  
Ethiopia.
- Crotalaria fascicularis*** Polhill, Kew Bull. 22 (2): 307, ♫ 308 (1968).  
Isotypus: Gillett 13953.  
(K holotypus. Polhill, Kew Bull. 22 (2): 307. 1968).  
Kenya.
- Crotalaria gracillima*** Chiov., Fl. Somalia: 137, ♫ t. IV f. 2 (1929), non Klotzsch (1861), nom. illeg.  
Holotypus: Stefanini & Paoli 1138.  
Somalia.  
Cufodontis in Bull. Jard. Bot. État 25 (2) Suppl.: 235 (1955) published 'Crotalaria paolii Cufod.' (nom. non rite publ.) based on the same type.
- Crotalaria grata*** Polhill, Kew Bull. 22 (2): 282, ♫ 281 (1968).  
Isotypus: Drummond & Hemsley 4252.  
(K holotypus. Polhill, Kew Bull. 22 (2): 282. 1968).  
Kenya.
- Crotalaria intonsa*** Polhill, Crot. Afr. Madag.: 206 (1982).  
Isotypus: Mooney 6251.  
(K holotypus. Polhill, Crot. Afr. Madag.: 206. 1982).  
Ethiopia.
- Crotalaria intricata*** Thulin, Nordic J. Bot. 8 (5): 482, ♫ 482 (1989).  
Isotypus: Thulin & Warfa 5347.  
(UPS holotypus. Thulin, Nordic J. Bot. 8 (5): 482. 1989).  
Somalia.
- Crotalaria jubae*** Polhill, Kew Bull. 22 (2): 256, ♫ 258 (1968).  
Holotypus: Senni 280.  
Somalia.
- (=) ***Crotalaria scassellatii*** Chiov., Ann. Bot. (Rome) 13 (3): 378 (1915).  
Typi: Scassellati 74; Paoli 439 (FT syntypi).  
Ref.: Polhill R.M. 1982. Crot. Afr. Madag.: 269, ♫ 269.
- Crotalaria malindiensis*** Polhill, Kew Bull. 22 (2): 286, ♫ 285 (1968).  
Typus: Polhill & Paulo 692 (K holotypus; B, BR, EA, FT, LISC, PRE isotypi).  
Ref.: Thulin M. 1993. Fl. of Somalia 1: 453.

## LEGUMINOSAE-PAPILIONOIDEAE

### **Crotalaria laburnifolia** L. subsp. **tenuicarpa**

Polhill, Kew Bull. 22 (2): 212 (1968).

Isotypus: Polhill & Paulo 918.

(K holotypus. Polhill, Kew Bull. 22 (2): 212. 1968).

Kenya.

### **Crotalaria linearifoliolata** Chiov., Fl. Somalia II:

155, ♫ 156 (1932).

Holotypus: Senni 788.

Somalia.

The date on the type specimen (15/9/1929) differs from the date quoted in the protologue (6/9/1929).

### **Crotalaria malindiensis** Polhill, Kew Bull. 22 (2): 286, ♫ 285 (1968).

Isotypus: Polhill & Paulo 692.

(K holotypus. Polhill, Kew Bull. 22 (2): 286. 1968).

Kenya.

### **Crotalaria mudugensis** Thulin, Nordic J. Bot. 11 (1): 97, ♫ 99 (1991).

Holotypus/Isotypi: Hemming 3376.

Somalia.

### **Crotalaria nigrescens** Chiov., Miss. Biol. Borana, (= Racc. Bot. Angiosp.-Gymnosp.: 61, ♫ 62 (1939).

Holotypus: Cufodontis 641.

Ethiopia.

### **Crotalaria cylindrica** A.Rich., Tent. Fl. Abyss. 1: 154 (1847).

Typus: Petit 4 (P holotypus).

Ref.: Thulin M. in Hedberg I. & Edwards S. 1989. Fl. of Ethiopia 3: 209.

### **Crotalaria nogalensis** Chiov., Fl. Somalia: 138 (= 1929).

Syntypi: Puccioni & Stefanini 953 [1048], 984 [1081].

Somalia.

### **Crotalaria emarginella** Vatke, Oesterr. Bot. Z. 28: 199 (1878).

Typus: Hildebrandt 586 (W holotypus).

Ref.: Thulin M. 1993. Fl. of Somalia 1: 457, ♫ 455.

### **Crotalaria oligosperma** Polhill, Crot. Afr. Madag.: 267, ♫ 267 (1982).

Isotypus: Burger 3277.

(K holotypus. Polhill, Crot. Afr. Madag.: 267. 1982).

Ethiopia.

### **Crotalaria polygaloides** Welw. ex Baker subsp. **orientalis** Polhill, Crot. Afr. Madag.: 253 (1982).

Holotypus: Inst. Miss. Consolata Herb. Afr. 221.

Tanzania.

### **Crotalaria rhopalocarpa** Chiov., Miss. Biol. Borana, Racc. Bot. Angiosp.-Gymnosp.: 63, ♫ 64 (1939).

Holotypus: Cufodontis 565.

Ethiopia.

### **Crotalaria deserticola** Taub. ex Baker f., J. Linn. Soc., Bot. 42: 383 (1914).

Typus: Stuhlmann 3483 (B holotypus destr.; BM, K, fragments).

Ref.: Thulin M. in Hedberg I. & Edwards S. 1989. Fl. of Ethiopia 3: 216.

## LEGUMINOSAE-PAPILIONOIDEAE

**Crotalaria rhyncocharpa** Polhill, Kew Bull. 22 (2): 253, ♀ 254 (1968).

Isotypus: Greenway & Rawlins 9437.  
(K holotypus. Polhill, Kew Bull. 22 (2): 253.  
1968).  
Kenya.

**Crotalaria rufocaulis** Gilli, Ann. Naturhistor. Mus. 74: 430, ♀ t. 2 f. 1 (1970).

Isotypus: Gillett 14015.  
(W holotypus. Gilli, Ann. Naturhistor. Mus. 74: 430. 1970).  
Kenya.

**Crotalaria ruspoliana** Chiov., Ann. Bot. (Rome) 13 (3): 379 (1915).

Holotypus: Ruspoli & Riva 604.  
Ethiopia.

**Crotalaria sacculata** Chiov., Miss. Biol. Borana, Racc. Bot. Angiosp.-Gymnosp.: 65, ♀ 66 (1939).

Holotypus: Cufodontis 654.  
Ethiopia.

**Crotalaria scassellatii** Chiov., Ann. Bot. (Rome) 13 (3): 378 (1915).

Syntypi: Scassellati 74; Paoli 439.  
Somalia.

*Crotalaria schumanniana* Harms, Annuario Reale Ist. Bot. Roma 7 (1): 89 (1897). (=)

Isotypus: Riva 1407.  
(B holotypus destr. Polhill, Crot. Afr. Madag.: 203. 1982).  
Ethiopia.

*Crotalaria senegalensis* (Pers.) Bacle ex DC. var. *sanguinolenta* Chiov., Annuario Reale Ist. Bot. Roma 8 (3): 399 (1908). (=)

Holotypus: Tellini 1179.  
Eritrea.

*Crotalaria sennii* Chiov., Fl. Somalia II: 157 (= 1932).

Holotypus: Senni 587.  
Somalia.

*Crotalaria sidamaënsis* Chiov., Atti Reale Accad. Italia, Mem. Cl. Sci. Fis., Ser. 7, 11 (2): 26 (1940). (=)

Holotypus: Massa 36.  
Ethiopia.

**Crotalaria somalensis** Chiov., Result. Sc. Miss. Stefanini-Paoli Somalia Ital. 1: 62 (1916).

Holotypus: Paoli 621.  
Somalia.

**Crotalaria cleomifolia** Welw. ex Baker, in Oliver D., Fl. Trop. Afr. 2: 43 (1871).

Typus: Welwitsch 1966 (LISU holotypus; BM isotypus).  
Ref.: Thulin M. in Hedberg I. & Edwards S. 1989. Fl. of Ethiopia 3: 209.

**Crotalaria senegalensis** (Pers.) Bacle ex DC., Prodr. 2: 133 (1825).

Typus: Adanson 24 (P-JU ? holotypus).  
Ref.: Thulin M. in Hedberg I. & Edwards S. 1989. Fl. of Ethiopia 3: 217.

**Crotalaria boranica** Harms ex Baker f. subsp. *trichocarpa* Polhill, Crot. Afr. Madag.: 239 (1982).

Typus: Gilbert & Thulin 1638 (K holotypus; UPS isotypus).  
Ref.: Thulin M. 1993. Fl. of Somalia 1: 454.

**Crotalaria ruspoliana** Chiov., Ann. Bot. (Rome) 13 (3): 379 (1915).

Typus: Ruspoli & Riva 604 (FT holotypus).  
Ref.: Thulin M. in Hedberg I. & Edwards S. 1989. Fl. of Ethiopia 3: 208.

## LEGUMINOSAE-PAPILIONOIDEAE

**Crotalaria sp.** = **Benedetto 122**, M. Thulin, Fl. of Ethiopia 3: 207 (1989).

Exsicc. (pro typus): Benedetto 122.  
Ethiopia.

*Crotalaria thomasii* Harms var. *sericea* Chiov., (=) Result. Sc. Miss. Stefanini-Paoli Somalia Ital. 1: 208 (1916).

Holotypus: Scassellati & Mazzocchi 8.  
Somalia.

In Flora of Somalia the holotype is quoted as 'Scassellati & Mazzocchi 74'.

**Crotalaria tsavoana** Polhill, Kew Bull. 25 (2): 284, ♫ 285 (1971).

Isotypus: Greenway & Kanuri 13047.  
(EA holotypus. Polhill, Kew Bull. 25 (2): 284.  
1971).

Kenya.

**Crotalaria vagans** Polhill, Crot. Afr. Madag.: 250, ♫ 251 (1982).

Isotypus: Breteler 383.  
(K holotypus. Polhill, Crot. Afr. Madag.: 250.  
1982).

Cameroun.

**Crotalaria verdcourtii** Polhill, Kew Bull. 22 (2): 249, ♫ 250 (1968).

Isotypus: Verdcourt & Brown 3264.  
(K holotypus. Polhill, Kew Bull. 22 (2): 249.  
1968).

Kenya.

**Crotalaria warfae** Thulin, Nordic J. Bot. 8 (5): 484, ♫ 485 (1989).

Isotypus: Warfa 1019.  
(UPS holotypus. Thulin, Nordic J. Bot. 8 (5):  
484. 1989).

Somalia.

*Cylista microphylla* Chiov., Fl. Somalia: 149, ♫ t. XV f. 2 (1929).

Holotypus: Puccioni & Stefanini 696 [770].  
Somalia.

In the protologue there is 'Puccioni & Stefanini 690' instead of 'Puccioni & Stefanini 696'.

*Cylista nogalensis* Chiov., Fl. Somalia: 148, ♫ t. XV f. 1 (1929).

Holotypus: Puccioni & Stefanini 838 [926].  
Somalia.

*Cylista somalorum* Vierh., Denkschr. Akad. Wien, Math. Nat. 71: 371 (1907), (=)

Isotypus: Riva 852.  
(B holotypus destr. Thulin, Fl. of Ethiopia 3:  
189. 1989).

Ethiopia.

**Crotalaria saltiana** Andrews, Bot. Repos. t. 648,  
♀ t. 648 (1812).

Typus: Plate 648 in Andrews, Botanical Repository, of a plant grown in England by Lambert from seeds collected by Salt in NE Africa.

Ref.: Thulin M. 1993. Fl. of Somalia 1: 451.

**Paracalyx microphyllus** (Chiov.) Ali, Univ. Stud. Karachi 5: 96 (1968).

Ref.: Thulin M. 1993. Fl. of Somalia 1: 447.

**Paracalyx nogalensis** (Chiov.) Ali, Univ. Stud. Karachi 5: 95 (1968).

Ref.: Thulin M. 1993. Fl. of Somalia 1: 446.

**Paracalyx somalorum** (Vierh.) Ali, Univ. Stud. Karachi 5: 95 (1968).

Ref.: Thulin M. in Hedberg I. & Edwards S. 1989. Fl. of Ethiopia 3: 189, ♫ 186.

## LEGUMINOSAE-PAPILIONOIDEAE

- Dalbergia commiphoroides** Baker f. var. *micrantha* (=) **Dalbergia commiphoroides** Baker f., Legum. Trop. Africa 2: 521 (1929).  
 Chiov., Fl. Somalia II: 170 (1932).  
 Holotypus: Senni 761.  
 Somalia.
- Typi: James & Thrupp (K syntypi).  
 Ref.: Gillett J.B., Polhill R.M. & Verdcourt B. in Milne-Redhead E. & Polhill R.M., 1971. Fl. Trop. E. Afr., Leguminosae subfam. Papilionoideae 1: 102.
- Dalbergia eremicola** Polhill, Kew Bull. 23 (3): 483, ♫ 484 (1969).  
 Isotypus: Gillett 12528.  
 (K holotypus. Polhill, Kew Bull. 23 (3): 483. 1969).  
 Kenya.
- Dalbergia louisii** Cronquist, Bull. Jard. Bot. État 22 (3-4): 217 (1952).  
 Isotypus: Louis 12933.  
 (BR holotypus. Bull. Jard. Bot. État 22 (3-4): 215. 1952).  
 Zaire.
- Dalbergia microphylla** Chiov., Ann. Bot. (Rome) 13 (3): 385 (1915).  
 Holotypus: Ruspoli & Riva 404.  
 Ethiopia.
- Dalbergia sciadendron** Chiov., Malpighia 34: 498 (=) (1937).  
 Holotypus: Taschdjian 365.  
 Ethiopia.  
 In Fl. of Ethiopia instead of 'Taschdjian 365' there is 'Taschdjian 356'.
- Desmodium aparine** Chiov., Racc. Bot. Miss. Consolata Kenya: 32 (1935).  
 Holotypus: Balbo 72 \*.  
 Kenya.
- Dalbergia lactea** Vatke, Oesterr. Bot. Z. 29: 251 (1879).  
 Typus: Hildebrandt 2439 (W holotypus).  
 Ref.: Thulin M. in Hedberg I. & Edwards S. 1989. Fl. of Ethiopia 3: 107, ♫ 106.
- Desmodium repandum** (Vahl) DC., Prodr. 2: 334 (1825).  
 Typus: Forsskål (C holotypus).  
 Ref.: Gillett J.B., Polhill R.M. & Verdcourt B. in Milne-Redhead E. & Polhill R.M., 1971. Fl. Trop. E. Afr., Leguminosae subfam. Papilionoideae 1: 465.
- Dicraeopetalum stipulare** Harms, Bot. Jahrb. Syst. 33: 161 (1902).  
 Isoneotypus: Paoli 870.  
 (K neotypus. Van der Maesen, Acta Bot. Neerl. 19 (2): 243. 1970).  
 Somalia.
- Dolichos benadirianus** Chiov., Ann. Bot. (Rome) 13 (3): 383 (1915).  
 Holotypus: Provenzale s. nr.  
 Somalia.
- Macrotyloma uniflorum** (Lam.) Verdc. var. **benadirianum** (Chiov.) Verdc., Kew Bull. 24 (3): 404 (1970).  
 Ref.: Thulin M. 1993. Fl. of Somalia 1: 433.
- Dolichos genistiformis** Chiov., Malpighia 34: 497 (=) (1937).  
 Holotypus: Taschdjian 193.  
 Ethiopia.
- Tephrosia interrupta** Hochst. & Steud. ex Engl., Hochgebirgsfl. Trop. Afrika: 260 (1892).  
 Typus: Schimper I: 344 (B holotypus destr.; BM, K, S isotypi).  
 Ref.: Thulin M. in Hedberg I. & Edwards S. 1989. Fl. of Ethiopia 3: 118, ♫ 117.

## LEGUMINOSAE-PAPILIONOIDEAE

- Dolichos oliveri* Schweinf. var. *uondensis* Fiori, (=) *Dolichos kilimandscharicus* Taub., Bot. Jahrb. Syst. 19, Beibl. 47: 32 (1894).  
 Nuovo Giorn. Bot. Ital. 47: 31 (1940).  
 Holotypus: Saccardo s. nr.  
 Ethiopia.
- Eriosema scioanum* Avetta, Bull. Soc. Bot. Ital. 21:346 (1889).  
 Holotypus: Antinori 1536/1836.  
 Ethiopia.
- Erythrina burana* Chiov., Atti Reale Accad. Italia, Mem. Cl. Sci. Fis., Ser. 7, 11 (2): 27 (1940).  
 Holotypus: Milizia Forestale 1619.  
 Paratypus: Gillett 5094.  
 Ethiopia.
- Erythrina melanacantha* Taub. ex Harms, Annuario Reale Ist. Bot. Roma 7 (1): 96 (1897).  
 Lectotypus: Riva 1547 (Gillett, Kew Bull. 17 (1): 79. 1963).  
 Syntypus: Riva 1632.  
 Exsicc. (pro syntypus): Robecchi-Bricchetti 291.  
 Ethiopia.  
 The exsicc. 'Robecchi-Bricchetti 291' must be referred to 'Erythrina burana Chiov.' (Fide Gillett, Kew Bull. 17 (1): 78. 1963).
- Erythrina melanacantha* Taub. ex Harms var. *somala* Chiov., Fl. Somalia: 153, ♦ t. XLIII f. 3; t. XLIV f. 4 (1929).  
 Syntypi: Puccioni & Stefanini 451 [502], 454 [506], 664 [728].  
 Somalia.  
 The taxon was published as 'Erythrina melanacantha Taub. ex Harms var. somala Chiov.', but the corresponding figures bear the caption 'Erythrina somala Chiov.'
- Glycine mearnsii* De Wild., Rev. Zool. Bot. Africaines 12, Suppl. Bot.: B 15 (1924).  
 Isotypus: Mearns 518.  
 (BR holotypus. Gillett, Polhill & Verdcourt, Fl. Trop. E. Afr., Leguminosae subfam. Papilionoideae 2: 532. 1971).  
 Kenya.
- Glycine petitiana* (A.Rich.) Schweinf. var. *dembianensis* Chiov., Ann. Bot. (Rome) 9 (1): 58 (1911).  
 Syntypi: Chiovenda 2382, 2449.  
 Ethiopia.
- Indigofera arenaria* A.Rich. var. *strigosa* (=) *Indigofera sp. = Pappi 74*, M. Thulin, Fl. of Ethiopia 3: 132 (1989).  
 A.Terracc., Annuario Reale Ist. Bot. Roma 5 (3): 109 (1894).  
 Holotypus: Terracciano 1756.  
 Eritrea.
- Erythrina melanacantha* Taub. ex Harms subsp. *somala* (Chiov.) J.B.Gillett, Kew Bull. 27 (2): 289 (1972).  
 Ref.: Thulin M. 1993. Fl. of Somalia 1: 430.
- Glycine wightii* (Wight & Arn.) Verdc. subsp. *petitiana* (A.Rich.) Verdc. var. *mearnsii* (De Wild.) Verdc., Taxon 15: 36 (1966).  
 Ref.: Gillett J.B., Polhill R.M. & Verdcourt B. in Milne-Redhead E. & Polhill R.M., 1971. Fl. Trop. E. Afr., Leguminosae subfam. Papilionoideae 2: 532, ♦ 531.
- Glycine wightii* (Wight & Arn.) Verdc. subsp. *petitiana* (A.Rich.) Verdc. var. *petitiana*, Taxon 15: 36 (1966).  
 Typus: Petit s. nr. (P holotypus).  
 Ref.: Thulin M. in Hedberg I. & Edwards S. 1989. Fl. of Ethiopia 3: 158, ♦ 159.
- Indigofera sp. = Pappi 74*, M. Thulin, Fl. of Ethiopia 3: 132 (1989).  
 Typus: Pappi 74 (FT exsicc., pro typus).  
 Ref.: Thulin M. in Hedberg I. & Edwards S. 1989. Fl. of Ethiopia 3: 132.

## LEGUMINOSAE-PAPILIONOIDEAE

- Indigofera barcensis* Chiov., Atti Soc. Naturalisti Mat. Modena 63: 36 (1932).  
 Holotypus: De Benedictis 200.  
 Eritrea.
- (=) **Indigastrum parviflorum** (B.Heyne ex Wight & Arn.) Schrire subsp. **parviflorum** var. **parviflorum**, Bothalia 22 (2): 168 (1992).  
 Typus: in Herbarium Wallich n. 5457, Heyne s. nr. (K holotypus).  
 Ref.: Schrire B.D. 1992. Bothalia 22 (2): 168.
- Indigofera bayensis** Thulin, Nordic J. Bot. 12 (3): 315, ♀ 316 (1992).  
 Isotypus: Thulin, Hedrén & Abdi Dahir 7644.  
 (UPS holotypus. Thulin, Nordic J. Bot. 12 (3): 315. 1992).  
 Somalia.
- Indigofera boranensis* Chiov., Miss. Biol. Borana, Racc. Bot. Angiosp.-Gymnosp.: 69, ♀ 68 (1939).  
 Holotypus/Isotypus: Cufodontis 294.  
 Ethiopia.
- (=) **Indigofera volkensii** Taub., in Engler, Pflanzenw. Ost-Afrikas C: 210 (1895).  
 Typi: Volkens 1648, 1738, 2124 (B syntypi destr.).  
 Ref.: Thulin M. in Hedberg I. & Edwards S. 1989. Fl. of Ethiopia 3: 136.
- Indigofera cavallii** Chiov., Ann. Bot. (Rome) 13 (3): 380 (1915).  
 Holotypus: Paoli 922 bis.  
 Somalia.
- Indigofera ciferrii** Chiov., Atti Ist. Bot. Univ. Pavia serie 4, 7: 128, ♀ t. IV (1936).  
 Holotypus: Ciferri 63 bis.  
 Somalia.
- Indigofera cliffordiana** J.B.Gillett, Kew Bull. Add. Ser. 1: 107 (1958).  
 Isotypus: Gillett 13804.  
 (K holotypus. Gillett, Polhill & Verdcourt, Fl. Trop. E. Afr., Leguminosae subfam. Papilionoideae 1: 303. 1971).  
 Kenya.
- Indigofera commiphoroides* Chiov., Miss. Biol. Borana, Racc. Bot. Angiosp.-Gymnosp.: 69, ♀ 70 (1939).  
 Holotypus: Cufodontis 340.  
 Ethiopia.
- (=) **Indigofera lupatana** Baker f., Legum. Trop. Africa 1: 154 (1926).  
 Typus: Kirk s. nr. (K holotypus; LISC isotypus).  
 Ref.: Thulin M. in Hedberg I. & Edwards S. 1989. Fl. of Ethiopia 3: 132.
- Indigofera cufodontii* Chiov., Miss. Biol. Borana, Racc. Bot. Angiosp.-Gymnosp.: 71, ♀ 72 (1939).  
 Syntypi: Cufodontis 473, 613.  
 Ethiopia.
- (=) **Microcharis cufodontii** (Chiov.) Schrire, Bothalia 22 (2): 166 (1992).  
 Ref.: Schrire B.D. 1992. Bothalia 22 (2): 166.
- Indigofera elwakensis** J.B.Gillett, Kew Bull. Add. Ser. 1: 45 (1958).  
 Isotypus: Gillett 13347.  
 (K holotypus. Gillett, Polhill & Verdcourt, Fl. Trop. E. Afr., Leguminosae subfam. Papilionoideae 1: 247. 1971).  
 Kenya.

LEGUMINOSAE-PAPILIONOIDEAE

**Indigofera gypsacea** Thulin, Nordic J. Bot. 12 (3): 317, ♫ 318 (1992).

Isotypus: Thulin & Bashir Mohamed 6943.  
(UPS holotypus. Thulin, Nordic J. Bot. 12 (3):

317. 1992).

Somalia.

*Indigofera hendecaphylla* Jacq. var. *acutifolia* (=) Chiov., Annuario Reale Ist. Bot. Roma 8 (1): 88 (1903), as ‘*endecaphylla*’.

Holotypus: Terracciano & Pappi 283.  
Eritrea.

*Indigofera hendecaphylla* Jacq. var. *parvula* (=) Chiov., Annuario Reale Ist. Bot. Roma 8 (1): 89 (1903), as ‘*endecaphylla*’.

Holotypus: Schweinfurth & Riva 1752.  
Eritrea.

*Indigofera insularis* Chiov., Annuario Reale Ist. Bot. Roma 8 (3): 418 (1908).

Syntypi: Terracciano 662, 725, 762; Tellini 424, 537.  
Eritrea.

*Indigofera karinensis* Thulin, Nordic J. Bot. 8 (5): 469, ♫ 470 (1989).

Isotypus: Thulin & Warfa 6003.  
(UPS holotypus. Thulin, Nordic J. Bot. 8 (5): 469. 1989).  
Somalia.

*Indigofera kerensis* Chiov., Annuario Reale Ist. Bot. Roma 8 (3): 417 (1908).

Holotypus: Terracciano & Pappi 2693.  
Eritrea.  
In Flora of Ethiopia the holotype is quoted as  
'Pappi 6293'.

*Indigofera kucharii* Thulin, Nordic J. Bot. 8 (5): 471 (1989).

Isotypus: Kuchar 17609.  
(UPS holotypus. Thulin, Nordic J. Bot. 8 (5): 471. 1989).  
Somalia.

**Indigofera lamellata** Thulin, Nordic J. Bot. 12 (3): 320, ♫ 318 (1992).

Isotypus: Thulin & Bashir Mohamed 6798.  
(UPS holotypus. Thulin, Nordic J. Bot. 12 (3): 320. 1992).  
Somalia.

*Indigofera linearis* DC. var. *sessilis* Chiov., Fl. Somalia II: 160 (1932).

Syntypi: Senni 387, 470.  
Somalia.

**Indigofera spicata** Forssk., Fl. aegypt.-arab.: 138 (1775).

Typus: Forsskål s. nr. (C holotypus).  
Ref.: Thulin M. in Hedberg I. & Edwards S. 1989. Fl. of Ethiopia 3: 136, ♫ 129.

**Indigofera spicata** Forssk., Fl. aegypt.-arab.: 138 (1775).

Typus: Forsskål s. nr. (C holotypus).  
Ref.: Thulin M. in Hedberg I. & Edwards S. 1989. Fl. of Ethiopia 3: 136, ♫ 129.

**Indigofera volkensii** Taub., in Engler, Pflanzenw. Ost-Afrikas C: 210 (1895).

Typi: Volkens 1648, 1738, 2124 (B syntypi destr.)  
Ref.: Thulin M. in Hedberg I. & Edwards S. 1989. Fl. of Ethiopia 3: 136.

**Microcharis karinensis** (Thulin) Schrire, Bothalia 22 (2): 166 (1992).

Ref.: Thulin M. 1993. Fl. of Somalia 1: 418.

**Indigofera suaveolens** Jaub. & Spach, Ill. Pl. Orient. t. 489 (1856).

Typus: Schimper 1221 (P holotypus).  
Ref.: Thulin M. in Hedberg I. & Edwards S. 1989. Fl. of Ethiopia 3: 127.

**Microcharis kucharii** (Thulin) Schrire, Bothalia 22 (2): 166 (1992).

Ref.: Thulin M. 1993. Fl. of Somalia 1: 419.

**Indigofera charlieriana** Schinz, Verh. Bot. Vereins Prov. Brandenburg 30: 165 (1888).

Typus: Schinz 244 (K isotypus).  
Ref.: Thulin M. 1993. Fl. of Somalia 1: 407.

## LEGUMINOSAE-PAPILIONOIDEAE

**Indigofera lughensis** Thulin, Nordic J. Bot. 12 (3): 322, ♫ 321 (1992).

Isotypus: Thulin & Bashir Mohamed 7009.

(UPS holotypus. Thulin, Nordic J. Bot. 12 (3): 322. 1992).

Somalia.

**Indigofera macrantha** Harms, Annuario Reale Ist. Bot. Roma 7 (1): 91 (1897).

Holotypus: Riva 1313.

Ethiopia.

*Indigofera minimifolia* Chiov., Racc. Bot. Miss. Consolata Kenya: 29 (1935). (=)

Syntypus: Balbo 598 \*.

Kenya.

**Indigofera vohemarensis** Baill., Bull. Mens. Soc. Linn. Paris 1: 400 (1883).

Typi: Richard 92; Pervillé & Boivin; Pervillé (all P syntypi).

Ref.: Gillett J.B., Polhill R.M. & Verdcourt B. In Milne-Redhead E. & Polhill R.M., Fl. Trop. E. Afr., Leguminosae subfam. Papilionoideae 1: 249 (1971).

*Indigofera phillipsiae* Baker f. var. *erecta* Chiov., Fl. Somalia: 140 (1929).

Syntypi: Puccioni & Stefanini 770 [853], 1046 [877].

Somalia.

**Indigofera volkensii** Taub., in Engler, Pflanzenw. Ost-Afrikas C: 210 (1895).

Typi: Volkens 1648, 1738, 2124 (B syntypi destr.)

Ref.: Thulin M. 1993. Fl. of Somalia 1: 417.

*Indigofera phillipsiae* Baker f. var. *prostrata* Chiov., Fl. Somalia: 140 (1929). (=)

Holotypus: Puccioni & Stefanini 86 [85].

Somalia.

**Indigofera volkensii** Taub., in Engler, Pflanzenw. Ost-Afrikas C: 210 (1895).

Typi: Volkens 1648, 1738, 2124 (B syntypi destr.)

Ref.: Thulin M. 1993. Fl. of Somalia 1: 417.

**Indigofera phymatodea** Thulin, Nordic J. Bot. 12 (3): 323, ♫ 316 (1992).

Isotypus: Thulin, Hedrén & Abdi Dahir 7545.

(UPS holotypus. Thulin, Nordic J. Bot. 12 (3): 323. 1992).

Somalia.

**Indigofera scopiformis** Thulin, Nordic J. Bot. 12 (3): 324, ♫ 321 (1992).

Isotypus: Thulin & Abdi Dahir 6455.

(UPS holotypus. Thulin, Nordic J. Bot. 12 (3): 324. 1992).

Somalia

*Indigofera secundiflora* Poir. var. *gondarensis* Pic.Serm., Miss. Stud. Lago Tana, VII, Ricerche Bot. 1: 64, ♫ t. XI (1951).

Holotypus: Pichi-Sermolli 2265.

Ethiopia.

**Indigofera secundiflora** Poir. var. *rubripilosa* De Wild., Bull. Jard. Bot. État 8: 156 (1923).

Typus: Bequaert 3365 (BR holotypus).

Ref.: Thulin M. in Hedberg I. & Edwards S. 1989. Fl. of Ethiopia 3: 128.

*Indigofera sesquijuga* Chiov., Fl. Somalia: 139 (1929). (=)

Syntypi: Puccioni & Stefanini 28 [28], 946 [1041].

Somalia.

**Indigofera volkensii** Taub., in Engler, Pflanzenw. Ost-Afrikas C: 210 (1895).

Typi: Volkens 1648, 1738, 2124 (B syntypi destr.)

Ref.: Thulin M. 1993. Fl. of Somalia 1: 417.

## LEGUMINOSAE-PAPILIONOIDEAE

- Indigofera sesquijuga* Chiov. var. *obbiadensis* (≡) **Microcharis tritoides** (Baker) Schrire subsp. **obbiadensis** (Chiov.) Schrire, Bothalia 22 (2): 167 (1992).  
 Holotypus: Puccioni & Stefanini 387 [439].  
 Somalia.  
 Ref.: Thulin M. 1993. Fl. of Somalia 1: 419.
- Indigofera sessilis* Thulin, Nordic J. Bot. 8 (5): (≡) **Microcharis sessilis** (Thulin) Schrire, Bothalia 22 (2): 167 (1992).  
 Isotypus: Thulin & Warfa 5561.  
 (UPS holotypus. Thulin, Nordic J. Bot. 8 (5): 475, 1989).  
 Somalia.  
 Ref.: Thulin M. 1993. Fl. of Somalia 1: 419.
- Indigofera sp. = Pappi 74**, M. Thulin, Fl. of Ethiopia 3: 132 (1989).  
 Exsicc. (pro typus): Pappi 74.  
 Eritrea.
- Indigofera spachii* Baker var. *trifoliolata* (=) **Indigofera trita** L.f. var. **maffeii** (Chiov.) Ali, Bot. Not. 3 (3): 558 (1958).  
 Schweinf., Bull. Herb. Boissier 4, app. II: 240 (1896).  
 Isosyntypus: Schweinfurth & Riva 648.  
 (B syntypus destr. Thulin, Fl. of Ethiopia 3: 134, 1989).  
 Eritrea.  
 Typus: Pollacci & Maffei 124 (not present in FT).  
 Ref.: Thulin M. in Hedberg I. & Edwards S. 1989. Fl. of Ethiopia 3: 134.
- Indigofera sparteola** Chiov., Fl. Somalia: 140, ♀ t. XIII (1929).  
 Syntypi: Puccioni & Stefanini 397 [449], 436 [488].  
 Somalia.
- Indigofera spinosa* Forssk. var. *spiniflora* (Boiss.) Schweinf. forma *densissima* Chiov., Annuario Reale Ist. Bot. Roma 8 (1): 91 (1903).  
 Lectotypus: Terracciano 1757 (Thulin, Fl. of Ethiopia 3: 132, sub holotypus).  
 Syntypus: Terracciano 36.  
 Eritrea.  
**Indigofera spiniflora** Boiss., Fl. Orient. 2: 190 (1872).  
 Typus: Schimper 945 (K isotypus).  
 Ref.: Thulin M. in Hedberg I. & Edwards S. 1989. Fl. of Ethiopia 3: 132.
- Indigofera stipulosa* Chiov., Miss. Biol. Borana, Racc. Bot. Angiosp.-Gymnosp.: 75, ♀ 74 (1939).  
 Holotypus: Cufodontis 228.  
 Ethiopia.  
**Microcharis stipulosa** (Chiov.) Schrire, Bothalia 22 (2): 167 (1992).  
 Ref.: Thulin M. 1993. Fl. of Somalia 1: 419.
- Indigofera suaveolens* Jaub. & Spach var. *pseudocongolensis* Chiov., Miss. Biol. Borana, Racc. Bot. Angiosp.-Gymnosp.: 77, ♀ 76 (1939).  
 Holotypus/Isotypus: Cufodontis 548.  
 Ethiopia.  
**Indigofera vohemarensis** Baill., Bull. Mens. Soc. Linn. Paris 1: 400 (1883).  
 Typi: Richard 92; Pervillé & Boivin; Pervillé (all P syntypi).  
 Ref.: Thulin M. in Hedberg I. & Edwards S. 1989. Fl. of Ethiopia 3: 124, ♀ 125.
- Indigofera suaveolens* Jaub. & Spach var. *subquadriiflora* Hochst. ex Chiov., Annuario Reale Ist. Bot. Roma 8 (3): 414 (1908).  
 Syntypi: Tellini 659; Terracciano & Pappi 1336; Pappi 6253, 6309, 6338, 6375, 6427, 6471, 7118.  
 Eritrea.  
**Indigofera vohemarensis** Baill., Bull. Mens. Soc. Linn. Paris 1: 400 (1883).  
 Typi: Richard 92; Pervillé & Boivin; Pervillé (all P syntypi).  
 Ref.: Thulin M. in Hedberg I. & Edwards S. 1989. Fl. of Ethiopia 3: 124, ♀ 125.

## LEGUMINOSAE-PAPILIONOIDEAE

- Indigofera subhirtella* Chiov., Miss. Biol. Borana, (=) **Indigofera volkensii** Taub., in Engler, Pflanzenw. Ost-Afrikas C: 210 (1895).  
 Racc. Bot. Angiosp.-Gymnosp.: 77, ♀ 78 (1939).  
 Holotypus/Isotypus: Cufodontis 502.  
 Ethiopia.
- Indigofera subulata* Vahl ex Poir. var. *microphylla* (=) **Indigofera trita** L.f. var. **subulata** (Vahl ex Poir.) Ali, Bot. Not. 3 (3): 558 (1958).  
 Chiov., Fl. Somalia: 138 (1929).  
 Holotypus: Puccioni & Stefanini 319 [366].  
 Somalia.
- Indigofera tanganyikensis** Baker f. var. **paucijuga** J.B.Gillett, Kew Bull. Add. Ser. 1: 44 (1958).  
 Isotypus: Drummond & Hemsley 4056.  
 (K holotypus. Gillett, Polhill & Verdcourt, Fl. Trop. E. Afr., Leguminosae subfam. Papilionoideae 1: 246. 1971).  
 Kenya.
- Indigofera thikaënsis** J.B.Gillett, Kew Bull. 24 (3): 475 (1970).  
 Isotypus: Faden 67/606.  
 (K holotypus. Gillett, Kew Bull. 24 (3): 475. 1970).  
 Kenya.
- Indigofera viridiflora* Chiov., Fl. Somalia: 140 (=) **Indigofera volkensii** Taub., in Engler, Pflanzenw. Ost-Afrikas C: 210 (1895).  
 (1929).  
 Holotypus: Puccioni & Stefanini 891 [981].  
 Somalia.
- Indigofera viscosa* Lam. var. *dembianensis* (Chiov., Ann. Bot. (Rome) 9 (1): 58 (1911).  
 Lectotypus: Chiovenda 2391 (Gillett, Kew Bull. 24 (3): 488. 1970).  
 Syntypi: Chiovenda 1229, 1328, 1670, 2278.  
 Ethiopia.
- Indigofera wajirensis* J.B.Gillett, Kew Bull. Add. Ser. 1: 135 (1958).  
 Isotypus: Gillett 13368.  
 (K holotypus. Schrire, Bothalia 22 (2): 167. 1992).  
 Kenya.
- Indigofera zanzibarica** J.B.Gillett, Kew Bull. 24 (3): 465 (1970).  
 Isotypus: Polhill & Paulo 894.  
 (K holotypus. Gillett, Kew Bull. 24 (3): 465. 1970).  
 Kenya.
- Indigofera zavattarii* Chiov., Miss. Biol. Borana, Racc. Bot. Angiosp.-Gymnosp.: 77, ♀ 79 (1939).  
 Holotypus/Isotypus: Cufodontis 467.  
 Ethiopia.
- Typi: Volkens 1648, 1738, 2124 (B syntypi destr.)  
 Ref.: Thulin M. in Hedberg I. & Edwards S. 1989. Fl. of Ethiopia 3: 136.
- Typus: Thonning (P holotypus).  
 Ref.: Thulin M. 1993. Fl. of Somalia 1: 414.
- Microcharis wajirensis** (J.B.Gillett) Schrire, Bothalia 22 (2): 167 (1992).  
 Ref.: Schrire B.D. 1992. Bothalia 22 (2): 167.

## LEGUMINOSAE-PAPILIONOIDEAE

- Lathyrus kilimandscharicus* Taub. var. *scioanus* (=) **Vicia paucifolia** Baker, in Oliver D., Fl. Trop. Afr. 2: 173 (1871).  
 Fiori, Ric. bot. fiensi Imp.: 38 (1940).  
 Syntypus: Bartolozzi s. nr.  
 Ethiopia.
- Liebrechtsia schweinfurthii* De Wild., Ann. Mus. Congo, Sér. 1, Bot. sér. 4, 1: 73 (1902).  
 Isosyntypi: Schweinfurth 1203, 1724.  
 (BR syntypi. Thulin, Fl. of Ethiopia 3: 176. 1989).  
 Eritrea.
- Lonchocarpus barlassinae* Chiov., Racc. Bot. Miss. Consolata Kenya: 37 (1935).  
 Holotypus: Balbo 375 \*.  
 Kenya.
- Lotononis leobordea* Benth. var. *filicaulis* (=) **Lonchocarpus eriocalyx** Harms, Bot. Jahrb. Syst. 30: 89 (1901).  
 A.Terracc., Annuario Reale Ist. Bot. Roma 5 (3): 109 (1894).  
 Holotypus: Terracciano 1742.  
 Eritrea.
- Lotus arabicus* L. var. *glabrescens* Schweinf., (=) **Lotononis platycarpos** (Viv.) Pic.Serm., Webbia 7: 331 (1950).  
 Bull. Herb. Boissier 4, app. 2: 234 (1896).  
 Isosyntypi: Schweinfurth 1498; Schweinfurth & Riva 1849.  
 (B syntypi destr. Thulin, Fl. of Ethiopia 3: 225. 1989).  
 Eritrea.
- Lotus arabicus* L. var. *torulosus* Chiov., Annuario Reale Ist. Bot. Roma 8 (1): 86 (1903).  
 Syntypi: Pappi 39, 64, 1725, 4127; Scotti s. nr.  
 Eritrea.  
 In the protologue there is 'Pappi 4117' instead of 'Pappi 4127'.
- Macrolotus rivaе* Harms, Annuario Reale Ist. Bot. Roma 7 (1): 89 (1897).  
 Isotypus: Riva 638.  
 (B holotypus destr. Thulin, Fl. of Ethiopia 3: 220. 1989).  
 Ethiopia.
- Microcharis nematophylla* Thulin, Nordic J. Bot. 12 (3): 325, ♀ 324 (1992).  
 Isotypus: Kuchar 17682.  
 (UPS holotypus. Thulin, Nordic J. Bot. 12 (3): 325. 1992).  
 Somalia.
- Vicia paucifolia** Baker, in Oliver D., Fl. Trop. Afr. 2: 173 (1871).  
 Typus: Schimper 1218 (K holotypus; BM isotypus).  
 Ref.: Thulin M. in Hedberg I. & Edwards S. 1989. Fl. of Ethiopia 3: 248, ♀ 251.
- Vigna debanensis** Martelli, Fl. Bogos. 28 (1886).  
 Typus: Beccari 152 (FT holotypus).  
 Ref.: Thulin M. in Hedberg I. & Edwards S. 1989. Fl. of Ethiopia 3: 176.
- Lonchocarpus eriocalyx** Harms, Bot. Jahrb. Syst. 30: 89 (1901).  
 Typus: Stuhlmann 509 (B holotypus destr.; K fragm.).  
 Ref.: Gillett J.B., Polhill R.M. & Verdcourt B. in Milne-Redhead E. & Polhill R.M., 1971. Fl. Trop. E. Afr., Leguminosae subfam. Papilioideae 1: 70.
- Lotononis platycarpos** (Viv.) Pic.Serm., Webbia 7: 331 (1950).  
 Typus: Figari (GE holotypus).  
 Ref.: Thulin M. in Hedberg I. & Edwards S. 1989. Fl. of Ethiopia 3: 195.
- Lotus lalambensis** Schweinf., Bull. Herb. Boissier 4, app. 2: 235 (1896).  
 Typi: Schweinfurth 861, 1520 (B syntypi destr.).  
 Ref.: Thulin M. in Hedberg I. & Edwards S. 1989. Fl. of Ethiopia 3: 225.
- Lotus torulosus** (Chiov.) Fiori, Nuovo Giorn. Bot. Ital. n. s. 19: 451 (1912).  
 Ref.: Thulin M. in Hedberg I. & Edwards S. 1989. Fl. of Ethiopia 3: 225.
- Argyrolobium fischeri** Taub., in Engler, Pflanzenw. Ost-Afrikas C: 207 (1895).  
 Typi: Fischer 159, 229, 230 (B syntypi destr.).  
 Ref.: Thulin M. in Hedberg I. & Edwards S. 1989. Fl. of Ethiopia 3: 220.

## LEGUMINOSAE-PAPILIONOIDEAE

**Millettia acuticarinata** Baker f., Bol. Soc. Brot. Serie II, 8: 104 (1933).

Isotypus: Carrisso & Mendonça 120.  
(BM holotypus. Torre, Consp. Fl. Angol. 3 (1): 174. 1962).  
Angola.

**Millettia bibracteolata** Pellegr., Bull. Soc. Bot. France 95: 259 (1948).

Isosyntypus: Le Testu 7838 (P syntypus?).  
Gabon.

*Millettia rooseveltii* De Wild., Pl. Bequaert. 3 : (≡) 353 (1925).

Isotypus: Mearns 3004.  
(BR holotypus. Polhill, Kew Bull. 23 (3): 490. 1969).  
Sudan.

**Andira inermis** (Wright) DC. subsp. **rooseveltii** (De Wild.) J.B.Gillett ex Polhill, Kew Bull. 23 (3): 490 (1969).

Ref.: Gillett J.B., Polhill R.M. & Verdcourt B. in Milne-Redhead E. & Polhill R.M., 1971. Fl. Trop. E. Afr., Leguminosae subfam. Papilionoideae 1: 63, ♦ 64.

*Mucuna melanocarpa* Hochst. ex A.Rich. var. *somalensis* Taub. ex Harms, Annuario Reale Ist. Bot. Roma 7 (1): 97 (1897).

Isosyntypi: Riva 150, 1411.  
Ethiopia.

**Mucuna melanocarpa** Hochst. ex A.Rich., Tent. Fl. Abyss. 1: 215 (1847).

Typi: Schimper III: 1425; Quartin-Dillon s. nr. (P syntypus).  
Ref.: Thulin M. in Hedberg I. & Edwards S. 1989. Fl. of Ethiopia 3: 164, ♦ 163.

*Ormocarpum melanodictyon* Chiov., Miss. Biol. Borana, Racc. Bot. Angiosp.-Gymnosp.: 83, ♦ 84 (1939).

Holotypus/Isotypus: Cufodontis 567.  
Ethiopia.

**Ormocarpum trachycarpum** (Taub.) Harms, in Engler, Pflanzenw. Afr. 3 (1): 609 (1915).

Typi: Fischer 224; Stuhlmann 667 (both B syntypus destr.).

Ref.: Thulin M. in Hedberg I. & Edwards S. 1989. Fl. of Ethiopia 3: 143.

**Ormocarpum muricatum** Chiov., Miss. Biol. Borana, Racc. Bot. Angiosp.-Gymnosp.: 85, ♦ 86 (1939).

Holotypus/Isotypus: Cufodontis 111.  
Ethiopia.

*Ormocarpum rectangulare* Thulin, Nordic J. Bot. 10 (4): 435, ♦ 434, 435 (1990).

Holotypus: Tardelli 4.  
Somalia.

**Zygocarpum rectangulare** (Thulin) Thulin & Lavin, Syst. Bot. 26 (2) : 310 (2001).

Ref.: Thulin M. & Lavin M. 2001. Syst. Bot. 26 (2): 310, ♦ 306.

**Ormocarpum sp. = Balladelli 266**, M. Thulin, Fl. of Somalia 1: 424 (1993).

Exsicc. (pro typus): Balladelli 266.  
Somalia.

*Phaseolus cibellii* Chiov., Ann. Bot. (Rome) 13 (= 3): 382 (1915).

Syntypi: Paoli 556, 1114.  
Somalia.

**Vatovaea pseudolablab** (Harms) J.B.Gillett, Kew Bull. 20 (1): 104, ♦ 105 (1966).

Typi: Neumann 100 (B syntypus destr.); Kassner 477 (B syntypus destr.; BM, K, isosyntypus).

Ref.: Thulin M. 1993. Fl. of Somalia 1: 433, ♦ 433.

## LEGUMINOSAE-PAPILIONOIDEAE

- Pueraria hochstetteri* Chiov., Annuario Reale Ist. Bot. Roma 8 (3): 434 (1908). (=) **Neorautanenia mitis** (A.Rich.) Verdc., Common Poisonous Pl. E. Afr.: 89 (1969).  
Syntypi: Pappi 2998, 3064 bis, 3721, 3728, 5795.  
Eritrea.
- Rhynchosia albomarginata* Chiov., Fl. Somalia II: 170 (1932). (=) **Rhynchosia albissima** Gand., Bull. Soc. Bot. France 60: 461 (1913).  
Holotypus: Tozzi 259.  
Somalia.
- Rhynchosia buramensis* Hutch. & E.A.Bruce, Bull. Misc. Inf. Kew 1941 (2): 121 (1941). (=) **Rhynchosia elegans** A.Rich., Tent. Fl. Abyss. 1: 228 (1847).  
Isotypus: Gillett 4850.  
(K holotypus. Hutchinson & Bruce, Bull. Misc. Inf. Kew 1941 (2): 121. 1941).  
Somalia.
- Rhynchosia elachistantha* Chiov., Annuario Reale Ist. Bot. Roma 8 (1): 100, ♀ t. 11 f. 1 (1903). (=) **Rhynchosia pulverulenta** Stocks, in Hook., J. Bot. Kew Misc. 4: 147 (1852).  
Holotypus: Terracciano & Pappi 21.  
Eritrea.
- Rhynchosia erythraeae** Schweinf., Bull. Herb. Boissier 4, App. II: 258 (1896).  
Isolectotypus: Schweinfurth 1850.  
(K lectotypus. Thulin, Nordic J. Bot. 1 (1): 38. 1981).  
Eritrea.
- Rhynchosia gansole** Chiov., Atti Reale Accad. Italia, Mem. Cl. Sci. Fis., Ser. 7, 11 (2): 28 (1940).  
Lectotypus: Robecchi-Bricchetti 361 (Thulin, Nordic J. Bot. 8 (5): 478. 1989).  
Syntypi: Robecchi-Bricchetti 359, 360, 495.  
Somalia.
- Rhynchosia glomerulans* Fiori, Nuovo Giorn. Bot. Ital. n. ser., Mem. Soc. Bot. Ital. 19: 455, ♀ 455 (1912). (=) **Rhynchosia densiflora** (Roth) DC. subsp. **chrysadenia** (Taub.) Verdc., Kew Bull. 25 (1): 73 (1971).  
Holotypus: Fiori 1140.  
Eritrea.
- Rhynchosia flavissima* Hochst. var. *macrocalyx* Chiov., Annuario Reale Ist. Bot. Roma 8 (3): 442 (1908). (=) **Rhynchosia minima** (L.) DC. var. **macrocalyx** (Chiov.) Verdc., Kew Bull. 25 (1): 105 (1971).  
Holotypus: Pappi 1400.  
Eritrea.
- Rhynchosia sennaarensis* Hochst. ex Schweinf. var. *flavissima* Schweinf., Verh. K.K. Zool.-Bot. Ges. Wien 18: 656 (1868). (=) **Rhynchosia malacophylla** (Spreng.) Bojer, Hortus Maurit.: 104 (1837).  
Isosyntypus: Schimper 192.  
(B syntypus destr. Thulin, Fl. of Ethiopia 3: 187. 1989).  
Ethiopia.
- Syntypi: Quartin Dillon (P holotypus).  
Ref.: Thulin M. in Hedberg I. & Edwards S. 1989. Fl. of Ethiopia 3: 181, ♀ 180.
- Typus: Burke 78; Zeyher 503; Schlechter 3619 (K isosyntypus); Zeyher 383 (? syntypus).  
Ref.: Thulin M. 1993. Fl. of Somalia 1: 445.
- Typi: Schimper I: 88, II: 518; Quartin Dillon; Petit (P syntypus).  
Ref.: Thulin M. 1993. Fl. of Somalia 1: 443.
- Typus: Stocks 658 (K holotypus).  
Ref.: Thulin M. in Hedberg I. & Edwards S. 1989. Fl. of Ethiopia 3: 187.

**LEGUMINOSAE-PAPILIONOIDEAE**

- Rhynchosia transjubensis*** Chiov., Fl. Somalia II: 169 (1932).  
 Syntypi: Senni 352, 355.  
 Somalia.
- Rhynchosia usambarensis*** Taub. var.  
***obtusifoliola*** Verdc., Kew Bull. 25 (1): 96 (1971).  
 Isotypus: Gillett 14251.  
 (K holotypus. Verdcourt, Kew Bull. 25 (1): 96.  
 1971).  
 Ethiopia.
- Sesbania aculeata*** (Schreb.) Pers. var. ***micrantha*** (Chiov., Fl. Somalia II: 164 (1932).  
 Syntypi: Senni 446, 490.  
 Somalia.
- Sesbania leptocarpa*** DC. var. ***confaloniana*** Chiov., (Fl. Somalia II: 163 (1932).  
 Holotypus/Isotypus: Confalone 57.  
 Somalia.
- Sesbania melanocaulis*** Bidgood & Friis, Nordic J. Bot. 18 (2): 211, ♀ 210, 211 (1998).  
 Isotypus: Friis, Bidgood, Høst, Dessalegn Desissa & Shigulte Kebede 7051.  
 (C holotypus. Bidgood & Friis, Nordic J. Bot. 18 (2) : 211. 1998).  
 Ethiopia.
- Sesbania sesban*** (L.) Merr. var. ***nubica*** Chiov., Fl. Somalia: 145 (1929).  
 Holotypus: Puccioni & Stefanini 185 [209].  
 Somalia.
- Sesbania somalensis*** J.B.Gillett, Kew Bull. 17 (1) : 123, ♀ 110 (1963).  
 Isotypus: Hemming 1544.  
 (K holotypus. Gillett, Kew Bull. 17 (1): 123.  
 1963).  
 Ethiopia.
- Sophora somalensis*** Chiov., Fl. Somalia II: 171 (1932).  
 Holotypus: Senni 551.  
 Somalia.
- Stylosanthes suborbiculata*** Chiov., Ann. Bot. (Rome) 13 (3): 381 (1915).  
 Holotypus: Paoli 239.  
 Somalia.
- Rhynchosia sublobata*** (Schumach.) Meikle, Kew Bull. 6: 176, ♀ f. 3, 4 (1951).  
 Typus: Thonning (C holotypus).  
 Ref.: Thulin M. 1993. Fl. of Somalia 1: 444.
- Sesbania bispinosa*** (Jacq.) W.Wight var. ***micrantha*** (Chiov.) J.B.Gillett, Kew Bull. 17 (1) : 130 (1963).  
 Ref.: Thulin M. 1993. Fl. of Somalia 1: 422.
- Sesbania sesban*** (L.) Merr. var. ***nubica*** Chiov., Fl. Somalia: 145 (1929).  
 Typus: Puccioni & Stefanini 185 [209] (FT holotypus).  
 Ref.: Thulin M. 1993. Fl. of Somalia 1: 421, ♀ 421.
- Milletia usaramensis*** Taub., Pflanzenw. Ost-Afrikas C: 212 (1895).  
 Typi: Stuhlmann 6358, 6395, 7044 (all B syntypi destr.).  
 Ref.: Thulin M. 1993. Fl. of Somalia 1: 395, ♀ 395.
- Stylosanthes fruticosa*** (Retz.) Alston, in Trimen, Handb. fl. Ceylon 6, Suppl.: 77 (1931).  
 Typi: König (LD syntypi); Trifolium procumbens zeylanicum hirsutum Loti facie of Burm., Thes. Zeyl.: 226, t. 106/20 (1737) (syntypus).  
 Ref.: Thulin M. 1993. Fl. of Somalia 1: 426, ♀ 426.

## LEGUMINOSAE-PAPILIONOIDEAE

**Taverniera longisetosa** Thulin, Symb. Bot.

Upsal. 25 (1): 85, ♀ 85 (1985).

Isotypus: Bally & Melville 15632.

(K holotypus. Thulin, Symb. Bot. Upsal. 25 (1): 85. 1985).

Somalia.

*Taverniera stefaninii* Chiov., Fl. Somalia : 146, ♀ (= t. XIV f. 3 (1929).

Holotypus: Puccioni & Stefanini 628 [691].  
Somalia.

In the protologue the figure is wrongly cited as  
't. XIV f. 2'.

**Tephrosia anomala** Thulin, Nordic J. Bot. 10 (3):

273, ♀ 274 (1990).

Holotypus/Isotypi: Tardelli 92.  
Somalia.

*Tephrosia apollinea* (Delile) Link var. *subuniflora* (= A.Terracc., Annuario Reale Ist. Bot. Roma 5 (3): 109 (1894).

Holotypus: Terracciano 1738.  
Eritrea.

*Tephrosia boranensis* Chiov., Miss. Biol. Borana, Racc. Bot. Angiosp.-Gymnosp.: 80, ♀ 81 (1939).

Holotypus/Isotypus: Cufodontis 310.  
Ethiopia.

*Tephrosia encoptosperma* Schweinf., Bull. Herb. Boissier 4, App. II: 246 (1896).

Isosyntypus: Schweinfurth & Riva 319.  
(B syntypus destr. Thulin, Fl. of Ethiopia 3: 112. 1989).  
Eritrea.

**Tephrosia filiflora** Chiov., Fl. Somalia: 143, ♀ t. XIV f. 1 (1929).

Syntypi: Puccioni & Stefanini 33 [33], 357 [408], 379 [430], 424 [475], 735 [814].  
Somalia.

*Tephrosia graminifolia* Chiov., Ann. Bot. (Rome) 13 (3): 381 (1915).

Holotypus: Paoli 1320.  
Somalia.

**Tephrosia hochstetteri** Chiov., Annuario Reale Ist. Bot. Roma 8 (3): 420 (1908).

Syntypi: Tellini 1294; Pappi 1046, 2463, 3011, 6585, 7316.  
Eritrea.

**Taverniera lappacea** (Forssk.) DC., Prodr. 2 : 339 (1825).

Typus: Forsskål s. nr. (C lectotypus; BM, S isolectotypus).

Ref.: Thulin M. 1993. Fl. of Somalia 1: 463.

**Tephrosia subtriflora** Hochst. ex Baker, in Oliver D., Fl. Trop. Afr. 2: 117 (1871).

Typus: Schimper 2312 (K holotypus; BM, P isotypi).

Ref.: Thulin M. in Hedberg I. & Edwards S. 1989. Fl. of Ethiopia 3: 112, ♀ 110.

**Tephrosia hildebrandtii** Vatke, Oesterr. Bot. Z. 29: 222 (1879).

Typus: Hildebrandt 2788 (K isotypus).

Ref.: Thulin M. in Hedberg I. & Edwards S. 1989. Fl. of Ethiopia 3: 113.

**Tephrosia subtriflora** Hochst. ex Baker, in Oliver D., Fl. Trop. Afr. 2: 117 (1871).

Typus: Schimper 2312 (K holotypus; BM, P isotypi).

Ref.: Thulin M. in Hedberg I. & Edwards S. 1989. Fl. of Ethiopia 3: 112, ♀ 110.

**Tephrosia subtriflora** Hochst. ex Baker, in Oliver D., Fl. Trop. Afr. 2: 117 (1871).

Typus: Schimper 2312 (K holotypus; BM, P isotypi).

Ref.: Thulin M. 1993. Fl. of Somalia 1: 399, ♀ 398.

## LEGUMINOSAE-PAPILIONOIDEAE

- Tephrosia nubica*** (Boiss.) Baker var. *polyphylla* (=) ***Tephrosia polyphylla*** (Chiov.) J.B.Gillett, Kew Bull. 1958: 123 (1958).  
 Chiov., Fl. Somalia II: 162 (1932).  
 Lectotypus: Gorini 394 (Gillett, Kew Bull. 1958: 123. 1958)  
 Syntypi: Gorini 376, 393.  
 Somalia.
- Tephrosia obbiadensis*** Chiov., Fl. Somalia: 144,  
 ♀ t. VII f. 2 (1929).  
 Syntypi: Puccioni & Stefanini 467 [519], 534  
 [586], 547 [601], 556 [610].  
 Somalia.
- Tephrosia rivae*** Taub. ex Harms, Annuario Reale Ist. Bot. Roma 7 (1): 92 (1897). (=)  
 Holotypus: Riva 1222.  
 Ethiopia.
- Tephrosia holstii*** Taub., Pflanzenw. Ost-Afrikas C: 211 (1895).  
 Typi: Holst 2; Volkens 348, 1420, 1420a (all B syntypi destr.).  
 Ref.: Thulin M. in Hedberg I. & Edwards S. 1989. Fl. of Ethiopia 3: 113, ♀ 114.
- Tephrosia scopulata*** Thulin, Nordic J. Bot. 8 (5): 464, ♀ 465 (1989).  
 Isotypus: Thulin & Warfa 5980.  
 (UPS holotypus. Thulin, Nordic J. Bot. 8 (5): 464. 1989).  
 Somalia.
- Tephrosia similis*** Chiov., Fl. Somalia II: 161 (=) (1932).  
 Syntypi: Gorini 53 ; Senni 489.  
 Somalia.  
 In the protologue Chiovenda quotes:  
 'Exemplar typus Gorini n. 53'.
- Tephrosia pentaphylla*** (Roxb.) G.Don, in Sweet, Hort. Brit. ed. 3: 170 (1839).  
 Typus: Roxburgh Drawing 1628 (K holotypus).  
 Ref.: Thulin M. 1993. Fl. of Somalia 1: 399, ♀ 398.
- Tephrosia socotrana*** Thulin, Nordic J. Bot. 17 (4): 349, ♀ 350 (1997).  
 Isotypus: Thulin & Gifri 8893.  
 (UPS holotypus. Thulin, Nordic J. Bot. 17 (4): 349. 1997).  
 Yemen, Socotra.
- Tephrosia sulphurea*** Chiov., Fl. Somalia: 142 (=) (1929).  
 Holotypus: Puccioni & Stefanini 473 [525].  
 Somalia.
- Tephrosia subtriflora*** Hochst. ex Baker, in Oliver D., Fl. Trop. Afr. 2: 117 (1871).  
 Typus: Schimper 2312 (K holotypus; BM, P isotypus).  
 Ref.: Thulin M. 1993. Fl. of Somalia 1: 399, ♀ 398.
- Tephrosia transjubensis*** Chiov., Fl. Somalia II: 161 (=) (1932).  
 Syntypi: Gorini 49, 50, 51, 52.  
 Somalia.
- Tephrosia uniflora*** Pers., Syn. Pl. 2: 329 (1807).  
 Typus: Roussillon (P-LA holotypus).  
 Ref.: Thulin M. 1993. Fl. of Somalia 1: 399, ♀ 398.
- Tephrosia ustulata*** Taub. ex Harms, Annuario Reale Ist. Bot. Roma 7 (1): 93 (1897). (=)  
 Holotypus: Riva 556.  
 Ethiopia.
- Tephrosia emeroides*** A.Rich., Tent. Fl. Abyss. 1: 190 (1847).  
 Typus: Petit s. nr. (P holotypus; K isotypus).  
 Ref.: Thulin M. in Hedberg I. & Edwards S. 1989. Fl. of Ethiopia 3: 113, ♀ 114.

## LEGUMINOSAE-PAPILIONOIDEAE

- Tephrosia vicioides* A.Rich. var. *inflexa* Chiov., (=) *Tephrosia pumila* (Lam.) Pers., Syn. Pl. 2: 330 (1807).  
 Annuario Reale Ist. Bot. Roma 8 (3): 422 (1908).  
 Syntypi: Terracciano 1740; Terracciano & Pappi 1931, 2654; Pappi 7082.  
 Eritrea.
- Teramnus gracilis* Chiov., Annuario Reale Ist. Bot. Roma 8 (3): 432 (1908). (≡)  
 Syntypi: Pappi 60, 4057; Terracciano 16, 736.  
 Eritrea.  
 On the label of the syntype “Terracciano I. Dahalak 11-12 III 1892” there is also the number 739.
- Trifolium acaule* Steud. ex A.Rich. var. *emarginatum* Chiov. ex Fiori, Nuovo Giorn. Bot. Ital. 55 (3): 343, ♦ f. 17 (1948), nom. invalid.  
 Typus: Vatova 2460.  
 Ethiopia.
- Trifolium baccarinii** Chiov., Ann. Bot. (Rome) 9 (1): 57 (1911).  
 Syntypi: Chiovenda 1774, 2010, 2155.  
 Ethiopia.  
 The most recent works on the genus Trifolium not quote the syntype ‘Chiovenda 2010’.
- Trifolium bellianum* Chiov., Annuario Reale Ist. Bot. Roma 8 (3): 407 (1908). (=) **Trifolium steudneri** Schweinf., Verh. K.K. Zool.-Bot. Ges. Wien 18: 652 (1868).  
 Syntypi: Pappi 104, 2315.  
 Ethiopia.
- Trifolium calocephalum* Fresen. var. *parviflorum* Chiov., Annuario Reale Ist. Bot. Roma 8 (3): 405 (1908). (≡) **Trifolium tembense** Fresen., Flora 22: 51 (1839).  
 Syntypi: Pappi 864 bis, 720, 2821.  
 Ethiopia.
- Trifolium cheranganiense** J.B.Gillett, Kew Bull. 7 (3): 373 (1952).  
 Isotypus: Rawlins 2.  
 (K holotypus. Gillett, Polhill & Verdcourt, Fl. Trop. E. Afr., Leguminosae subfam. Papilionoideae 2: 1026. 1971).  
 Kenya.
- Trifolium chilaloense** Thulin, Bot. Not. 129: 169, ♦ 168 (1976).  
 Isotypus: Thulin 1642.  
 (UPS holotypus. Thulin, Bot. Not. 129: 169. 1976).  
 Ethiopia.
- Trifolium decorum** Chiov., Ann. Bot. (Rome) 9 (1): 56 (1911).  
 Syntypi: Chiovenda 1110, 1197, 1199, 1391.  
 Ethiopia.

## LEGUMINOSAE-PAPILIONOIDEAE

**Trifolium mattiorianum** Chiov., Ann. Bot.

(Rome) 9 (1): 57 (1911).

Syntypi: Chiovenda 1422, 1706.

Ethiopia.

*Trifolium petitianum* A.Rich. var. *cuneatum* Baker f., Legum. Trop. Africa 1: 78 (1926).

Isotypus: Pappi 1084 (also numbered 336; fide Gillett, Kew Bull. 7 (3): 384. 1952).

(K holotypus. Thulin, Fl. of Ethiopia 3: 240. 1989).

Eritrea.

**Trifolium acaule** Steud. ex A.Rich., Tent. Fl. Abyss. 1: 169 (1847).

Typus: Schimper II: 587 (P holotypus; BM, K, UPS isotypi).

Ref.: Thulin M. in Hedberg I. & Edwards S. 1989. Fl. of Ethiopia 3: 240.

**Trifolium pichisermollii** J.B.Gillett, Kew Bull. 7 (3): 388 (1952).

Holotypus: Negri 85 bis.

Ethiopia.

*Trifolium pseudocryptopodium* Chiov. ex Fiori, Nuovo Giorn. Bot. Ital. 55 (3): 343, ♦ f. 20 (1948), nom. invalid.

Syntypi: Vatova 833, 1627.

Ethiopia.

**Trifolium usambarensense** Taub., in Engler, Pflanzenw. Ost-Afrikas C: 208 (1895).

Typi: Holst 108; Volkens 578, 579 (B syntypi destr.).

Ref.: Thulin M. in Hedberg I. & Edwards S. 1989. Fl. of Ethiopia 3: 236.

**Trifolium semipilosum** Fresen. var. **brunellii** Thulin, Nordic J. Bot. 2 (1): 51 (1982).

Holotypus: Vatova 717.

Ethiopia.

*Trifolium semipilosum* Fresen. var. *microphyllum* Chiov., Annuario Reale Ist. Bot. Roma 8 (3): 406 (1908).

Lectotypus: Pappi 1132 (Thulin, Fl. of Ethiopia 3: 237. 1989, sub holotypus).

Syntypus: Pappi 5197.

Eritrea.

**Trifolium semipilosum** Fresen. var. **semipilosum**, Flora 22: 52 (1839).

Typus: Ruepell s. nr. (FR holotypus).

Ref.: Thulin M. in Hedberg I. & Edwards S. 1989. Fl. of Ethiopia 3: 237, ♦ 235.

*Trifolium semipilosum* Fresen. var. *sennii* Chiov. ex Fiori, Nuovo Giorn. Bot. Ital. n. s. 55 (3): 342, ♦ 340 f. 10 (1948), nom. invalid.

Typus: Senni 1235.

Ethiopia.

**Trifolium semipilosum** Fresen. var. **semipilosum**, Flora 22: 52 (1839).

Typus: Ruepell s. nr. (FR holotypus).

Ref.: Thulin M. in Hedberg I. & Edwards S. 1989. Fl. of Ethiopia 3: 237, ♦ 235.

**Trifolium somalense** Taub., Annuario Reale Ist. Bot. Roma 7 (1): 90 (1897).

Holotypus: Riva 1301.

Ethiopia.

**Trifolium spananthum** Thulin, Bot. Not. 129: 167, ♦ 168 (1976).

Isotypus: Thulin 1355.

(UPS holotypus. Thulin, Bot. Not. 129: 167. 1976).

Ethiopia.

*Vatovaea biloba* Chiov., Webbia 8 (1): 231 (1851). (=)

Holotypus: Vatova 87.

Ethiopia.

The date on the holotype label (20 X 1937) differs from the date quoted in the protologue (20 novembre 1937).

**Vatovaea pseudolablab** (Harms) J.B.Gillett, Kew Bull. 20 (1): 104, ♦ 105 (1966).

Typi: Neumann 100; Kassner 477 (B syntypi destr.).

Ref.: Thulin M. in Hedberg I. & Edwards S. 1989. Fl. of Ethiopia 3: 169, ♦ 170.

## LEGUMINOSAE-PAPILIONOIDEAE

- Vicia sativa* L. var. *aristulata* Chiov., Atti Reale Accad. Italia, Mem. Cl. Sci. Fis., Ser. 7, 11 (2): 29 (1940).  
 Holotypus/Isotypus: Piovano 244.  
 Ethiopia.
- Vigna caesia* Chiov., Fl. Somalia II: 167 (1932).  
 Holotypus: Senni 298.  
 Somalia.
- Vigna debanensis** Martelli, Fl. Bogos. 28 (1886).  
 Holotypus: Beccari 152.  
 Eritrea.
- Vigna glandulosa* Chiov., Ann. Bot. (Rome) 13 (3): 384 (1915).  
 Holotypus: Negri 1103.  
 Ethiopia.
- Vigna mensensis* Schweinf. var. *hastata* Chiov., (= Annuario Reale Ist. Bot. Roma 8 (3): 438 (1908).  
 Holotypus: Terracciano & Pappi 1776.  
 Eritrea.
- Vigna micrantha* Chiov. nom. illeg., non Harms (1899), Ann. Bot. (Rome) 9 (1): 59 (1911).  
 Syntypi: Chiovenda 2089, 2289, 2324.  
 Ethiopia.  
 Baker published in Legum. Trop. Africa 2: 402 (1929) 'Vigna chiovendae', based on the same syntypes of 'Vigna micrantha' Chiov.'
- Vigna proboscidella* Chiov., Ann. Bot. (Rome) 9 (1): 59 (1911).  
 Holotypus: Chiovenda 2704.  
 Ethiopia.
- Vigna sinensis* (L.) Endl. ex Hassk. var. *spontanea* Schweinf., Bull. Herb. Boissier 4, app II: 260 (1896).  
 Isotypus: Schweinfurth 602.  
 Eritrea.
- Vigna triloba* Walp. var. *somalensis* Chiov., Fl. Somalia: 151 (1929).  
 Syntypi: Puccioni & Stefanini 593 [647], 1038 [627 bis].  
 Somalia.
- Vigna virescens** Thulin, Nordic J. Bot. 11 (5): 545, ♀ 546 (1991).  
 Isotypus: Thulin & Warfa 5354.  
 (UPS holotypus. Thulin, Nordic J. Bot. 11 (5): 545. 1991).  
 Somalia.
- (=) **Vicia sativa** L. var. *angustifolia* L., Fl. Suecica, ed 2: 255 (1755).  
 Typus: Haller (P lectotypus).  
 Ref.: Thulin M. in Hedberg I. & Edwards S. 1989. Fl. of Ethiopia 3: 249.
- Vigna membranacea** A.Rich. subsp. *caesia* (Chiov.) Verdc., Kew Bull. 24 (3): 536 (1970).  
 Ref.: Thulin M. 1993. Fl. of Somalia 1: 435.
- Vigna frutescens** A.Rich., Tent. Fl. Abyss. 1: 218 (1847).  
 Typus: Petit s. nr. (P holotypus).  
 Ref.: Thulin M. in Hedberg I. & Edwards S. 1989. Fl. of Ethiopia 3: 174.
- Vigna membranacea** A.Rich., Tent. Fl. Abyss. 1: 219 (1847).  
 Typi: Schimper I: 352; Quartin-Dillon s. nr. (P syntypi).  
 Ref.: Thulin M. in Hedberg I. & Edwards S. 1989. Fl. of Ethiopia 3: 173.
- Vigna ambacensis** Welw. ex Baker, in Oliver D., Fl. Trop. Afr. 2: 201 (1871).  
 Typus: Welwitsch 2260 (LISU holotypus; BM, K isotypi).  
 Ref.: Thulin M. in Hedberg I. & Edwards S. 1989. Fl. of Ethiopia 3: 173.
- Vigna macrorhyncha** (Harms) Milne-Redh., Bull. Misc. Inform. Kew 1936 (9): 473 (1936) (as *macrorrhyncha*).  
 Typus: Goetze 345 (B holotypus, destr.).  
 Ref.: Thulin M. in Hedberg I. & Edwards S. 1989. Fl. of Ethiopia 3: 177.
- Vigna unguiculata** (L.) Walp. subsp. *dekindtiana* (Harms) Verdc., Kew Bull. 24 (3): 544 (1970).  
 Typus: Dekindt 468 (B holotypus destr.).  
 Ref.: Pienaar B.J 1992. In schedis.
- (=) **Vigna monantha** Thulin, Nordic J. Bot. 11 (5): 543, ♀ 544 (1991).  
 Typus: Thulin & Abdi Dahir 6616 (UPS holotypus; K, MOG isotypi).  
 Ref.: Thulin M. 1993. Fl. of Somalia 1: 436, ♀ 435.

## LEGUMINOSAE-PAPILIONOIDEAE

**Zornia albolutescens** Mohlenbr., Kew Bull. 15 (2): 327, ♫ 328 (1961).

Isotype: Bogdan 4023.

(K holotypus. Mohlenbrock, Kew Bull. 15 (2): 327. 1961).

Kenya.

**Zornia apiculata** Milne-Redh., Bol. Soc. Brot., ser. 2, 28: 90 (1954).

Isotype: Gillett 13566.

(K holotypus. Milne-Redhead, Bol. Soc. Brot., ser. 2, 28: 92. 1954).

Kenya.

## LORANTHACEAE

*Loranthus amblyphyllus* Chiov., Fl. Somalia II: (=) 384, ♫ 385.

Holotypus: Senni 137.  
Somalia.

**Agelanthus scassellatii** (Chiov.) Polhill & Wiens, in Lebrun J.-P. & Stork A., Énum. Pl. Fleurs Afr. Trop. 2: 165 (1992).

Typus: Scassellati & Mazzocchi 111 (FT holotypus).

Ref.: Polhill R.M. & Wiens D. in Thulin M. 1999. Fl. of Somalia 2: 141, ♫ 140.

*Loranthus dichrostachydis* Chiov., Fl. Somalia II: (=) 386, ♫ 386 (1932).

Holotypus: Senni 482.  
Somalia.

**Oncocalyx fischeri** (Engl.) M.G.Gilbert, Nordic J. Bot. 5 (3): 222 (1985).

Typus: Fischer 130 (HBG lectotypus; B isolectotypus).

Ref.: Polhill R.M. & Wiens D. in Thulin M. 1999. Fl. of Somalia 2: 136, ♫ 136.

*Loranthus dregei* Eckl. & Zeyh. var. *kerenicus* Sprague, in Thiselton-Dyer W.T., Fl. Trop. Afr. 6 (1): 312 (1910).

Isosyntypus: Beccari 82.  
(K syntypus. Gilbert, Fl. of Ethiopia 3: 366. 1989, sub holotypus).  
Eritrea.

**Erianthemum dregei** (Eckl. & Zeyh.) Tiegh., Bull. Soc. Bot. France 42: 248 (1895).

Typus: Ecklon & Zeyher 2284 (B, G, MO isotypi).

Ref.: Gilbert M.G. in Hedberg I. & Edwards S. 1989. Fl. of Ethiopia 3: 366, ♫ 366.

*Loranthus erythraeus* Sprague, in Thiselton-Dyer W.T., Fl. Trop. Afr. 6 (1): 287 (1910).

Isosyntypus: Schweinfurth & Riva 785.  
(K syntypus. Gilbert, Fl. of Ethiopia 3: 367. 1989).  
Eritrea.

**Phragmanthera erythraea** (Sprague) M.G.Gilbert, Nordic J. Bot. 5 (3): 224 (1985).

Ref.: Gilbert M.G. in Hedberg I. & Edwards S. 1989. Fl. of Ethiopia 3: 367, ♫ 367.

*Loranthus ostinii* Chiov., Ann. Bot. (Rome) 9 (2): (=) 133 (1911).

Syntypi: Chiovenda 1845, 2696.  
Ethiopia.

**Tapinanthus globiferus** (A.Rich.) Tiegh., Bull. Soc. Bot. France 42: 267 (1895).

Typus: Quartin-Dillon (P holotypus).

Ref.: Gilbert M.G. in Hedberg I. & Edwards S. 1989. Fl. of Ethiopia 3: 373, ♫ 373.

## LORANTHACEAE

- Loranthus rhodanthus* Chiov., Fl. Somalia II: 383, (=) ♦ 383 (1932).  
Holotypus: Senni 349.  
Somalia.
- Loranthus sarertaensis* Hutch. & E.A.Bruce, Bull. Misc. Inf. Kew 1941 (2): 127 (1941).  
(=)  
Isotypus: Gillett 5194.  
(K holotypus. Gilbert, Fl. of Ethiopia 3: 367. 1989).  
Ethiopia.
- Loranthus scassellatii* Chiov., Result. Sc. Miss. Stefanini-Paoli Somal. Ital. I: 218 (1916).  
Holotypus: Scassellati & Mazzocchi 111.  
Somalia.
- Loranthus scassellatii* Chiov. var. *glabrescens* (Balle ex Pic.Serm., Miss. Stud. Lago Tana, VII, Ricerche Bot. I: 29 (1951)).  
(=)  
Holotypus: Pichi-Sermanni 2492.  
Ethiopia.
- Loranthus schimperi* Hochst. ex A.Rich. var. *parviflorus* Hutch. & E.A.Bruce, Bull. Misc. Inf. 1941 (2): 127 (1941).  
Isolectotypus: Gillett 5271 (K lectotypus. Gilbert, Fl. of Ethiopia 3: 370. 1989, sub holotypus).  
Syntypi: Gillett 3947, 4568.  
Somalia and Ethiopia.
- Loranthus somalensis* Chiov., Result. Sc. Miss. Stefanini-Paoli Somal. Ital. I: 155, tav. 15 fig. B (1916).  
Holotypus: Paoli 342.  
Somalia.  
The t. 15 f. B of the protologue bears the caption: 'Loranthus stefaninii Chiov.'
- Loranthus ugogensis* Engl. var. *ganocalyx* Chiov., (=) Miss. Biol. Borana, Racc. Bot. Angiosp.-Gymnosp.: 39, ♦ 40 (1939).  
Holotypus: Cufodontis 602.  
Ethiopia.
- Loranthus woodfordioides* Schweinf. var. *minor* Chiov., Racc. Bot. Miss. Consolata Kenya: 109 (1935).  
Syntypi: Balbo 21 \*, 44 \*, 58 \*, 86 \*. Kenya.
- Agelanthus kayseri* (Engl.) Polhill & Wiens, in Lebrun J.-P. & Stork A., Énum. Pl. Fleurs Afr. Trop. 2: 164 (1992).  
Typus: Stuhlmann I. 116 (B syntypus); Hildebrandt 1226 (B syntypus destr.; BM, K, P isosyntypus).  
Ref.: Polhill R.M. & Wiens D. in Thulin M. 1999. Fl. of Somalia 2: 140.
- Phragmanthera sarertaensis** (Hutch. & E.A.Bruce) M.G.Gilbert, Nordic J. Bot. 5 (3): 224 (1985).  
Ref.: Gilbert M.G. in Hedberg I. & Edwards S. 1989. Fl. of Ethiopia 3: 367, ♦ 367.
- Agelanthus scassellatii* (Chiov.) Polhill & Wiens, in Lebrun J.-P. & Stork A., Énum. Pl. Fleurs Afr. Trop. 2: 165 (1992).  
Ref.: Polhill R.M. & Wiens D. in Thulin M. 1999. Fl. of Somalia 2: 141, ♦ 140.
- Agelanthus heteromorphus* (A.Rich.) Polhill & Wiens, in Lebrun J.-P. & Stork A., Énum. Pl. Fleurs Afr. Trop. 2: 164 (1992).  
Typus: Quartin-Dillon (P holotypus).  
Ref.: Polhill R.M. & Wiens D. in Lebrun J.-P. & Stork A. 1992. Énum. Pl. Fleurs Afr. Trop. 2: 164.
- Oncocalyx schimperi** (Hochst. ex A.Rich.) M.G.Gilbert, Nordic J. Bot. 5 (3): 222 (1985).  
Typus: Schimper I: 158 (P holotypus; BM, ETH, FI, K isotypi).  
Ref.: Polhill R.M. & Wiens D. in Thulin M. 1999. Fl. of Somalia 2: 137, ♦ 137.
- Helixanthera kirkii** (Oliv.) Danser, Verh. Kon. Ned. Akad. Wetensch., Afd. Natuurk., Tweede Sect. 29 (6): 57 (1933).  
Typus: Kirk s. nr. (K holotypus).  
Ref.: Polhill R.M. & Wiens D. in Thulin M. 1999. Fl. of Somalia 2: 131.
- Oncocalyx glabratus* (Engl.) M.G.Gilbert, Nordic J. Bot. 5 (3): 222 (1985).  
Typus: Ellenbeck s. nr.; Ellenbeck 1229 (both syntypi B).  
Ref.: Gilbert M.G. in Hedberg I. & Edwards S. 1989. Fl. of Ethiopia 3: 369.
- Englerina woodfordioides** (Schweinf.) Balle ex M.G.Gilbert, Nordic J. Bot. 5 (3): 223 (1985).  
Typus: von Hoehnel 39 (B holotypus).  
Ref.: Polhill R.M. & Wiens D. in Beentje H.J. & Whitehouse C.M. 1999. Fl. Trop. E. Afr., Loranthaceae: 28.

## LORANTHACEAE

**Oncocalix cordifolius** Wiens & Polhill,  
Mistletoes Afr.: 110, ♫ photo. 37 (1998).  
Isotypus: Greenway 9439.  
(K holotypus. Polhill & Wiens, Fl. Trop. E.  
Africa, Loranthaceae: 20. 1999).  
Kenya.

**Plicosepalus robustus** Wiens & Polhill, Nordic J.  
Bot. 5 (3): 221 (1985).  
Isotypus: Gillett 14869.  
(K holotypus. Gilbert, Polhill & Wiens, Nordic  
J. Bot. 5 (3): 221. 1985).  
Ethiopia.

## MALPIGHIAEAE

**Acridocarpus glaucescens** Engl., Annuario Reale  
Ist. Bot. Roma 9 (3): 253 (1902).  
Holotypus: Riva 200.  
Somalia.  
In the protologue there is ‘Riva 206’ instead of

*Acridocarpus glaucescens* Engl. var. *graniticus* (=)  
Fiori, Bull. Soc. Bot. Ital. 1915: 49 (1915).  
Lectotypus: Stefanini & Paoli 714 (Thulin, Fl.  
of Somalia 1: 260. 1993, sub holotypus).  
Syntypi: Stefanini & Paoli 720, 784.

*Acridocarpus zanzibaricus* A.Juss. var. *brachyphyllus* (=)  
Chiov., Fl. Somalia II: 42, ♫ 43 (1932).  
Holotypus: Senni 548.  
Somalia.

The taxon was published as ‘*Acridocarpus zanzibaricus* A.Juss. var. *brachyphyllus* Chiov.’,  
but the figure in the protologue bears the caption:  
‘*Acridocarpus zanzibarensis* var. *somalicus*  
Chiov.’

*Caucanthus argenteus* Chiov., Fl. Somalia II: 41 (=)  
(1932), non Nied. (1904) nom. illegit.  
Lectotypus: Senni 341 (Launert, Fl. Trop. E.  
Afr., Malpighiaceae: 26. 1968).

Syntypus: Senni 805.  
Somalia.  
Cufodontis in Bull. Jard. Bot. État 26 (3),  
Suppl.: 403 (1965) published “*Caucanthus chiovendae*” with the same syntypes.

*Caucanthus squarrosum* (Radlk.) Nied. var. *benadirensis* (=)  
Fiori, Bull. Soc. Bot. Ital. 1915: 49  
(1915).  
Holotypus: Stefanini & Paoli 82.  
Somalia.

**Acridocarpus glaucescens** Engl., Annuario Reale  
Ist. Bot. Roma 9 (3): 253 (1902).  
Typus: Riva 200 (FT holotypus).  
Ref.: Thulin M. 1993. Fl. of Somalia 1: 260.

**Acridocarpus zanzibaricus** A.Juss., Ann. Sci.  
Nat. Bot. sér. 2, 13: 271 (1840).  
Typus: Bojer (P holotypus).  
Ref.: Thulin M. 1993. Fl. of Somalia 1: 262.

**Caucanthus albidus** (Nied.) Nied., in Engler,  
Pflanzenr. IV 141: 36, ♫ 37 (1928).  
Typus: Hildebrandt 2585 (B holotypus).  
Ref.: Launert E. in Edwards S., Mesfin  
Tadesse & Hedberg I. 1995. Fl. of Ethiopia and  
Eritrea 2 (2): 262.

**Caucanthus edulis** Forssk., Fl. aegypt.-arab.: CXI  
(1775).  
Typi: Forsskål 477, 1068 (C syntypi).  
Ref.: Thulin M. 1993. Fl. of Somalia 1: 264, ♫  
264.

## MALPIGHIACEAE

**Triaspis erlangeri** Engl., Bot. Jahrb. Syst. 36: 248 (1905).

Neotypus: Corradi 6975 (Ellenbeck 998, 1034, B syntypi destr. Launert, Fl. Trop. E. Afr., Malpighiaceae: 14. 1968). Ethiopia.

*Tristellateia cynanchoides* Chiov., Fl. Somalia II: (=) 44 (1932).

Syntypi: Senni 805 bis, 837. Somalia.

*Tristellateia somalensis* Chiov., Result. Sc. Miss. (=) Stefanini-Paoli Somalia Ital. 1: 37 (1916).

Holotypus: Paoli 101. Somalia.

**Triaspis niedenzuiana** Engl., Bot. Jahrb. Syst. 36: 247 (1905).

Typus: Uhlig 863 (B syntypus destr.; EA isosyntypus).

Ref.: Launert E. in Edwards S., Mesfin Tadesse & Hedberg I. 1995. Fl. of Ethiopia and Eritrea 2 (2): 260, ♦ 260.

**Caucanthus edulis** Forssk., Fl. aegypt.-arab.: CXI (1775).

Typi: Forsskål 477, 1068 (C syntypi).

Ref.: Thulin M. 1993. Fl. of Somalia 1: 264, ♦ 264.

## MELIACEAE

**Melia volkensii** Gürke, in Engler, Pflanzenw. Ost-Afrikas C: 231 (1895).

Isonotypus: Gillett 15168

(K neotypus. Styles & White, Fl. Trop. E. Afr., Meliaceae: 25. 1991).

Kenya.

*Polyscias lepidota* Chiov., Atti Reale Accad. (=) Italia, Mem. Cl. Sci. Fis., Ser. 7, 11 (2): 32 (1940).

Holotypus: Chiideri 239. Ethiopia.

**Ekebergia capensis** Sparrm., Kongl. Vetensk. Acad. Handl. 40: 282, ♦ t. 9 (1779).

Typus: Sparrmann s. nr. (S holotypus).

Ref.: Friis I. in Friis I. & Ryding O. 2001. Biod. Res. Horn Afr. Reg.: 53.

*Trichilia jubensis* Chiov., Fl. Somalia II: 129, ♦ (=) 130 (1932).

Holotypus: Tozzi 326. Somalia.

**Trichilia emetica** Vahl, Symb. Bot. 1: 31 (1790).

Typus: Forsskål 478 (C holotypus; BM isotypus).

Ref.: Hassan A.S. & Cheek M. in Thulin M. 1999. Fl. of Somalia 2: 236, ♦ 237.

*Trichilia somalensis* Chiov., Result. Sc. Miss. (=) Stefanini-Paoli Somalia Ital. 1: 50 (1916).

Holotypus: Paoli 515. Somalia.

**Trichilia emetica** Vahl, Symb. Bot. 1: 31 (1790).

Typus: Forsskål 478 (C holotypus; BM isotypus).

Ref.: Hassan A.S. & Cheek M. in Thulin M. 1999. Fl. of Somalia 2: 236, ♦ 237.

**Turraea kokwaroana** Styles & F.White, Bull. Jard. Bot. Belg. 59: 258 (1989).

Isotypus: Gillett 12577.

(K holotypus. Styles & White, Fl. Trop. E. Afr., Meliaceae: 18. 1991).

Kenya.

## MELIACEAE

*Turraea nilotica* Kotschy & Peyr. var. *glabrata* (=) *Turraea nilotica* Kotschy & Peyr., Pl. Tinn.: 12, Fiori, Result. Sc. Miss. Stefanini-Paoli Somalia Ital. 1: 49 (1916).

Syntypi: Paoli 849, 981.  
Somalia.

*Turraea nilotica* Kotschy & Peyr., Pl. Tinn.: 12, ♀ t. 6 (1867).

Typi: Heuglin 54, 55, 56; Knoblecher (all W syntypi).

Ref.: Hassan A.S. & Cheek M. in Thulin M. 1999. Fl. of Somalia 2: 230, ♀ 230.

**Turraea retusa** Styles & F.White, Bull. Jard. Bot. Belg. 60 (3-4): 416 (1990).  
Isotypus: Collenette 139.  
(K holotypus. Hassan & Cheek, Fl. of Somalia 2: 232. 1999).  
Somalia.

## MENISPERMACEAE

*Bricchettia somalensis* Pax, Annuario Reale Ist. Bot. Roma 6 (3): 181 (1897).

Lectotypus: Robecchi-Bricchetti 409 (503) (Benvenuto, Webbia 29 (1): 45. 1974).  
Syntypi: Robecchi-Bricchetti 311, 340, 406, 428, 528; Riva 2.  
Ethiopia?.

*Cocculus villosus* (Lam.) DC. var. *glabratus* (=) Schweinf., Bull. Herb. Boissier 4 App. II: 180 (1896).

Isotypus: Schweinfurth & Riva 1434.  
(G holotypus. Benvenuto, Webbia 29 (1): 42. 1974).  
Eritrea.

**Cocculus pendulus** (J.R.Forst. & G.Forst.) Diels, in Engler, Pflanzenr. 46 (IV 94): 237 f. 78 (1910).

Typus: Forster s. nr. (BM holotypus).

Ref.: Edwards S., Mesfin Tadesse, Sebsebe Demissew & Hedberg I. 2000. Fl. of Ethiopia and Eritrea 2 (1): 45, ♀ 46.

**Cocculus hirsutus** (L.) W.Theob., in Mabberley D.J., Taxon ed. 3, 2: 657 (1883).

Typus: Plukenet's drawing Amalthe. Bot. 61 t. 384 f. 7 (1705); specimen in Herb. Sloane (BM).

Ref.: Edwards S., Mesfin Tadesse, Sebsebe Demissew & Hedberg I. 2000. Fl. of Ethiopia and Eritrea 2 (1): 45, ♀ 46.

## MOLLUGINACEAE

**Limeum praetermissum** C.Jeffrey, Kew Bull. 14: 235 (1960).

Isotypus: Gillett 13371.  
(K holotypus. Jeffrey, Kew Bull. 14: 235. 1960).  
Kenya.

**Mollugo angustifolia** M.G.Gilbert & Thulin, Nordic J. Bot. 13 (2): 169, ♀ 170 (1993).

Isotypus: Thulin, Hedrén & Abdi Dahir 7606.  
(UPS holotypus. Gilbert & Thulin, Nordic J. Bot. 13 (2): 169. 1993).  
Somalia.

**Mollugo sp. = Corradi 8502**, M.G.Gilbert, Flora of Ethiopia and Eritrea 2 (1): 237 (2000).

Holotypus: Corradi 8502.  
Ethiopia.

## MORACEAE

- Dorstenia crispa* Engl., Monogr. Afrik. Pflanzen- Fam. 1: 27, ♦ t. 9 f. A (1898).  
 Isotypus: Riva 441.  
 (B holotypus, destr. Friis, Nordic J. Bot. 3 (5): 538. 1983).  
 Ethiopia.
- Dorstenia palmata* Engl. var. *integrifolia* Chiov., (=) Miss. Biol. Borana, Racc. Bot. Angiosp.- Gymnosp.: 36, ♦ 37 (1939).  
 Syntypi: Cufodontis 230, 320.  
 Ethiopia.
- Dorstenia triternata* Chiov., Atti Reale Accad. Italia, Mem. Cl. Sci. Fis., Ser. 7, 11 (2): 56 (1940).  
 Holotypus: Reghini 10.  
 Ethiopia.
- Ficus brachypoda* Hutch. var. *scioana* Chiov., (=) Malpighia 34: 527 (1935).  
 Holotypus: Taschdjian 145.  
 Ethiopia.
- Ficus changensis* Warb. var. *somalensis* Pamp., (=) Bull. Soc. Bot. Ital. 1915: 14 (1915).  
 Syntypi: Paoli 722, 933 e 1217.  
 Somalia.
- Ficus glomosa* Delile var. *glaberrima* Martelli, Fl. Bogos.: 76 (1886).  
 Holotypus: Beccari 40.  
 Eritrea.
- Ficus glomosa* Delile var. *intermedia* Martelli, Fl. Bogos.: 76 (1886).  
 Holotypus: Beccari 19.  
 Eritrea.
- Ficus glomosa* Delile var. *lanuginosa* Martelli, Fl. Bogos.: 76 (1886).  
 Holotypus: Beccari 17.  
 Eritrea.
- Ficus hararensis* Warb., Bot. Jahrb. Syst. 36: 212 (= 1905).  
 Syntypi: Robecchi-Bricchetti 156, 162.  
 Ethiopia.
- Ficus paolii* Pamp., Bull. Soc. Bot. Ital. 1915: 15 (= 1915).  
 Holotypus: Paoli 983.  
 Somalia.
- (=) ***Dorstenia foetida*** (Forssk.) Schweinf. ssp. ***foetida*** var. ***foetida***, Bull. Herb. Boissier 4, App. 2: 120 (1896).  
 Typus: Forsskål s. nr. (C holotypus).  
 Ref.: Friis I. 1983. Nordic J. Bot. 3 (5): 538.
- Dorstenia barnimiana*** Schweinf., Pl. Quaedam Nilot.: 36, ♦ t. 12 (1862).  
 Typus: Hartmann s. nr. (B holotypus, destr.).  
 Ref.: Friis I. in Thulin M. 1999. Fl of Somalia 2: 94, ♦ 94.
- Dorstenia barnimiana*** Schweinf., Pl. Quaedam Nilot.: 36, ♦ t. 12 (1862).  
 Typus: Hartmann s. nr. (B holotypus, destr.).  
 Ref.: Friis I. in Hedberg I. & Edwards S. 1989. Fl. of Ethiopia 3: 278, ♦ 279.
- Ficus ovata*** Vahl, Enum. Pl. 2: 185 (1805).  
 Typus: Thonning 246 (S holotypus).  
 Ref.: Friis I. in Hedberg I. & Edwards S. 1989. Fl. of Ethiopia 3: 292, ♦ 293.
- Ficus bussei*** Mildbr. & Burret, Bot. Jahrb. Syst. 46: 213 (1911).  
 Typi: Busse 1024, 2427; Stuhlmann s. nr. (B syntypi).  
 Ref.: Friis I. in Thulin M. 1999. Fl of Somalia 2: 102.
- Ficus glomosa*** Delile, Cent. Pl. Meroé: 63 (1826).  
 Typus: Cailliaud (MPU holotypus).  
 Ref.: Friis I. in Thulin M. 1999. Fl of Somalia 2: 101, ♦ 101.
- Ficus glomosa*** Delile, Cent. Pl. Meroé: 63 (1826).  
 Typus: Cailliaud (MPU holotypus).  
 Ref.: Friis I. in Thulin M. 1999. Fl of Somalia 2: 101, ♦ 101.
- Ficus glomosa*** Delile, Cent. Pl. Meroé: 63 (1826).  
 Typus: Cailliaud (MPU holotypus).  
 Ref.: Friis I. in Thulin M. 1999. Fl of Somalia 2: 101, ♦ 101.
- Ficus vasta*** Forssk., Fl. Aegypt.-Arab.: 179 (1775).  
 Typus: Forsskål 776 (C holotypus).  
 Ref.: Friis I. in Hedberg I. & Edwards S. 1989. Fl. of Ethiopia 3: 296, ♦ 297.
- Ficus caprifolia*** Delile, Ann. Sci. Nat. Bot. sér. 2, 20: 94 (1843) as “*capreaefolia*”.  
 Typus: Galinier 167 (MPU holotypus).  
 Ref.: Friis I. in Thulin M. 1999. Fl of Somalia 2: 97, ♦ 97.

## MORACEAE

- Ficus populifolia* Vahl var. *somalensis* Warb., Bot. Jahrb. Syst. 36: 212 (1905). (=) ***Ficus populifolia*** Vahl, Symb. Bot. 1: 82, ♦ t. 22 (1790).  
Syntypus: Ruspoli & Riva 1012.  
Somalia.
- Ficus rivae* Warb., Bot. Jahrb. Syst. 36: 211 (1905). (=)  
Isotypus: Riva 230.  
(? B holotypus, destr. Friis, Fl. of Ethiopia 3: 296. 1989).  
Ethiopia.
- Ficus ruspolii* Warb., Bot. Jahrb. Syst. 36: 211 (1905). (=)  
Holotypus: Ruspoli & Riva 526.  
Ethiopia.
- Ficus scassellatii*** Pamp., Bull. Soc. Bot. Ital. 1915: 15 (1915).  
Lectotypus: Scassellati Ser. V 31 (Friis, Nordic J. Bot. 5 (4): 331. 1985).  
Syntypus: Scassellati s. nr.  
Somalia.
- Ficus sur* Forssk. var. *erythreae* Fiori, Bull. Soc. Tosc. Ortic. 35: 166 (1910). (=)  
Isotypus: Fiori 40.  
Ethiopia.
- Ficus vasta* Forssk. var. *velutina* Fiori, Bull. Soc. Tosc. Ortic. 35: 166 (1910). (=)  
Holotypus: Fiori 37.  
Eritrea.
- Ficus vasta*** Forssk., Fl. Aegypt.-Arab.: 179 (1775).  
Typus: Forsskål 776 (C holotypus).  
Ref.: Friis I. in Hedberg I. & Edwards S. 1989. Fl. of Ethiopia 3: 296, ♦ 297.
- Ficus thonningii*** Blume, Rumphia 2: 17 (1836).  
Typus: Thonning 325 (non traced, probably lost).  
Ref.: Friis I. in Thulin M. 1999. Fl of Somalia 2: 103.

## MORINGACEAE

- Moringa longituba*** Engl., Annuario Reale Ist. Bot. Roma 9: 251 (1902).  
Syntypi: Ruspoli & Riva 434, 1024.  
Kenya.
- Moringa rivae*** Chiov., Bull. Soc. Bot. Ital. 1917: 26 (1917).  
Lectotypus: Ruspoli & Riva 1017 (Verdcourt, Kew Bull. 40 (1): 13. 1985).  
Syntypus: Ruspoli & Riva 816.  
Ethiopia.
- Moringa ruspoliana*** Engl., Annuario Reale Ist. Bot. Roma 9: 250 (1902).  
Holotypus: Ruspoli & Riva 758.  
Ethiopia.

## MORINGACEAE

*Moringa streptocarpa* Chiov., Miss. Biol. Borana, (=) Racc. Bot. Angiosp.-Gymnosp.: 51, ♫ 52 (1939).

Holotypus/Isotypus: Cufodontis 746.  
Ethiopia.

*Moringa stenopetala* (Baker f.) Cufod., Senckenberg. Biol. 38: 407 (1957).

Typus: Donaldson-Smith 398 (BM holotypus).

Ref.: Verdcourt B. in Edwards S., Mesfin Tadesse, Sebsebe Demissew & Hedberg I. 2000. Fl. of Ethiopia and Eritrea 2 (1): 160, ♫ 161.

## MYRICACEAE

**Myrica arborea** Hutch. var. **kenyensis** Chiov.

Racc. Bot. Miss. Consol. Kenya: 115 (1935).

Holotypus: Balbo 4 \*.  
Kenya.

## NYCTAGINACEAE

*Boerhavia reniformis* Chiov., Fl. Somalia: 283, ♫ (≡) t. XXXIII f. 2 (1929).

Holotypus: Puccioni & Stefanini 1002 [1106].  
Somalia.

**Commicarpus reniformis** (Chiov.) Cufod., Bull. Jard. Bot. Belg. 39 (4), Suppl.: XXI (1969).

Ref.: Thulin M. 1993. Fl. of Somalia 1: 174.

*Boerhavia repens* L. forma *amphilahensis* (=) A.Terracc., Annuario Reale Ist. Bot. Roma 5 (3): 101 (1894).

Holotypus: Terracciano 56.  
Eritrea.

**Boerhavia repens** L., Sp. Pl.: 3 (1753).

Typus: Linnean Herbarium 9.8 (LINN neotypus, microfiche).

Ref.: Gilbert M.G. in Edwards S., Mesfin Tadesse, Sebsebe Demissew & Hedberg I. 2000. Fl. of Ethiopia and Eritrea 2 (1): 268, ♫ 269.

*Boerhavia stenocarpa* Chiov., Fl. Somalia: 283 (≡) (1929).

Holotypus: Puccioni & Stefanini 606 [667].  
Somalia.

**Commicarpus stenocarpus** (Chiov.) Cufod., Bull. Jard. Bot. Belg. 39 (4), Suppl.: XXI (1969).

Ref.: Thulin M. 1993. Fl. of Somalia 1: 172.

*Boerhavia verticillata* (Poir.) Standl. forma *repanda* A.Terracc., Annuario Reale Ist. Bot. Roma 5 (3): 101 (1894).

Syntypi: Terracciano 70 (Terra ferma 23 III), 188 (I. Midir 22 III).  
Eritrea.

Material of uncertain identity, perhaps 'Commicarpus helenae' (Schult.) Meikle' (fide Gilbert, Fl. of Ethiopia and Eritrea 2 (1): 273. 2000).

**Commicarpus parviflorus** Thulin, Nordic J. Bot. 10 (4): 408, ♫ 407 (1990).

Isotypus: Thulin & Abdi Dahir 6542.  
(UPS holotypus. Thulin, Nordic J. Bot. 10 (4): 408. 1990).  
Somalia.

## NYCTAGINACEAE

**Selinocarpus somalensis** Chiov., Fl. Somalia: 284,  
✧ t. XXXIII f. 1 (1929).  
Holotypus: Puccioni & Stefanini 814 [901].  
Somalia.

## OPILIACEAE

*Opilia celtidifolia* (Guill. & Perr.) Endl. ex Walp. (=) **Opilia amentacea** Roxb., Pl. Corom. 2: 31, ✧ t. 158 (1802).  
var. *sphaerocarpa* Chiov., Webbia 8 (1): 231  
(1951).  
Lectotypus: Corradi 8425 (Hiepko,  
Willdenowia 12 (2): 164. 1982).  
Syntypi: Corradi 8420, 8421, 8422, 8423,  
8424, 8426, 8427.  
Ethiopia.

Typus: t. 158 in Roxb., Pl. Corom. 2. 1802  
(lectotypus).  
Ref.: Hiepko P. in Hedberg I. & Edwards S.  
1989. Fl. of Ethiopia 3: 358.

## OXALIDACEAE

**Oxalis anthelmintica** A.Rich. var. **glabrostyla**  
Roti Mich., Webbia 32 (2): 447, ✧ 448 (1978).  
Holotypus: Pappi 3444 pro parte.  
Eritrea.

*Oxalis corniculata* L. var. *glabrocapsula* Roti (=) **Oxalis radicosa** A.Rich., Tent. Fl. Abyss. 1: 123  
Mich., Webbia 32 (2): 429, ✧ 431 (1978).  
Holotypus: Negri 185.  
Ethiopia.

Typus: Quartin Dillon & Petit s. nr. (P  
holotypus).  
Ref.: Lourteig A. 1980. Phytologia 46 (3): 143.

## PHYTOLACCACEAE

*Phytolacca dodecandra* L'Hér. var. *pubescens* (=)  
Fiori, Boschi e piante legnose dell'Eritrea: 132  
(1911).  
Syntypi: Fiori 53, 498.  
Eritrea.

**Phytolacca dodecandra** L'Hér., Stirp. nov.: 143,  
✧ t. 69 (1791).  
Typus: plant cultivated in Paris from seeds  
collected by Bruce in Ethiopia (P holotypus).  
Ref.: Polhill R.M. in Edwards S., Mesfin  
Tadesse, Sebsebe Demissew & Hedberg I. 2000.  
Fl. of Ethiopia and Eritrea 2 (1): 274, ✧ 275.

## PIPERACEAE

*Peperomia abyssinica* Miq. var. *subrotundata* (=) **Peperomia abyssinica** Miq., in Hooker, Lond. J. Bot. 4: 419 (1845).  
Chiov., Ann. Bot. (Rome) 9 (2): 134 (1911).  
Holotypus: Chiovenda 1043.  
Ethiopia.

Typus : Schimper II 1319 (K holotypus ; BM isotypus).  
Ref.: Gilbert M.G. in Edwards S., Mesfin Tadesse, Sebsebe Demissew & Hedberg I. 2000.  
Fl. of Ethiopia and Eritrea 2 (1): 64, ♦ 62.

## PITTOSPORACEAE

*Pittosporum cardiospermum* Cufod., Oesterr. Bot. Z. 98 (1/2): 123, ♦ 133 (1951).  
Holotypus: Giordano 2347.  
Ethiopia.

**Pittosporum abyssinicum** Hochst. ex Delile, Ann. Sci. Nat. Bot. sér. 2, 20: 89 (1843).  
Typus: Ferret & Galinier s. nr. (MPU holotypus).  
Ref.: Friis I. in Hedberg I. & Edwards S. 1989.  
Fl. of Ethiopia 3: 1.

*Pittosporum feddeanum* Pax, Bot. Jahrb. Syst. 39: (=) 622 (1907).  
Isoneotypus: Gillett 5389.  
(K neotypus. Cufodontis, Fedde Repert. 55 : 67. 1952).  
Ethiopia.

**Pittosporum viridiflorum** Sims, in Curtis, Bot. Mag. 41: t. 1684, ♦ t. 1684 (1814).  
Typus: Illustration in Curtis, Bot. Mag. 41, t. 1684 (1814) of a plant from the Cape of Good Hope cultivated in London.  
Ref.: Friis I. in Hedberg I. & Edwards S. 1989.  
Fl. of Ethiopia 3: 2, ♦ 3.

*Pittosporum lanatum* Hutch. & E.A.Bruce, Bull. Misc. Inf. Kew 1941 (2): 97 (1941).  
Isotypus: Gillett 5228.  
(K holotypus. Hutchinson & Bruce, Bull. Misc. Inf. Kew 1941 (2): 97. 1941).  
Ethiopia.

**Pittosporum abyssinicum** Hochst. ex Delile, Ann. Sci. Nat. Bot. sér 2, 20: 89 (1843).  
Typus: Ferret & Galinier s. nr. (MPU holotypus).  
Ref.: Friis I. in Hedberg I. & Edwards S. 1989.  
Fl. of Ethiopia 3: 1.

*Pittosporum quartinianum* Cufod., Oesterr. Bot. Z. 98 (1/2): 132, ♦ 133 (1951).  
Holotypus: Pappi 4660.  
Eritrea.

**Pittosporum viridiflorum** Sims, in Curtis, Bot. Mag. 41: t. 1684, ♦ t. 1684 (1814).  
Typus: Illustration in Curtis, Bot. Mag. 41, t. 1684 (1814) of a plant from the Cape of Good Hope cultivated in London.  
Ref.: Friis I. in Hedberg I. & Edwards S. 1989.  
Fl. of Ethiopia 3: 2, ♦ 3.

## PODOSTEMACEAE

*Sphaerothylax sanguinea* Chiov., Ann. Bot. (Rome) 9 (1): 131 (1911).  
Holotypus: Chiovenda 2939.  
Ethiopia.

**Sphaerothylax abyssinica** (Wedd.) Warm., Kongel. Danske Vidensk. Selsk. Naturvidensk. Math. Afh. 6 Roekke, VII-4: 145 (1891).  
Typus: Schimper (1863) 1181 (B holotypus; K isotypus).  
Ref.: Gilbert M.G. in Edwards S., Mesfin Tadesse, Sebsebe Demissew & Hedberg I. 2000.  
Fl. of Ethiopia and Eritrea 2 (1): 194, ♦ 193.

## POLYGALACEAE

- Carpolobia suaveolens* Meikle, Kew Bull. 1950: (=) 337 (1951).  
 Isotypus: Faulkner K 106.  
 (K holotypus. Meikle, Kew Bull. 1950: 337. 1951).  
 Mozambique.
- Polygala effusa** Paiva & Thulin, Nordic J. Bot. 10 (5): 471, ♫ 472 (1990).  
 Isotypus: Ellis 229.  
 (K holotypus. Thulin, Nordic J. Bot. 10 (5): 471. 1990).  
 Ethiopia.
- Polygala eriopetra* DC. var. *abyssinica* Chodat, (=) Mém. Soc. Phys. Genève 31 (2): 344 (1893).  
 Isotypus: Schewinfurth & Riva 125.  
 Eritrea.
- Polygala eriopetra** DC., Prodr. 1: 326 (1824).  
 Typus: Bacle s. nr. (G-DC lectotypus).  
 Ref.: Gilbert M.G. in Edwards S., Mesfin Tadesse, Sebsebe Demissew & Hedberg I. 2000. Fl. of Ethiopia and Eritrea 2 (1): 182, ♫ 181.
- Polygala gondarensis** Chiov., Ann. Bot. (Rome) 9 (3): 316 (1911).  
 Lectotypus: Chiovenda 2352 (Paiva, Fontqueria 50: 206. 1998).  
 Syntypus: Chiovenda 2245.  
 Ethiopia.  
 The syntype Chiovenda 1935 is lacking in FT.
- Polygala negrii* Chiov., Ann. Bot. (Rome) 9 (3): (=) 315 (1911).  
 Syntypi: Negri 401, 424.  
 Ethiopia.
- Polygala steudneri** Chodat, Mém. Soc. Phys. Genève 31 (2): 390 (1893).  
 Typus: Steudner s. nr. (B holotypus).  
 Ref.: Gilbert M.G. in Edwards S., Mesfin Tadesse, Sebsebe Demissew & Hedberg I. 2000. Fl. of Ethiopia and Eritrea 2 (1): 185, ♫ 186.
- Polygala obtusissima* Hochst. ex Chodat var. *somalensis* Chiov., Fl. Somalia: 89 (1929).  
 Syntypi: Puccioni & Stefanini 722 [799], 756 [837].  
 Somalia.
- Polygala sennii* Chiov., Fl. Somalia II: 14, ♫ 14 (=) (1932).  
 Holotypus: Senni 387 bis.  
 Somalia.
- Polygala obtusissima** Hochst. ex Chodat, Mém. Soc. Phys. Genève 31 (2): 322, ♫ t. 27, f. 13-15 (1893).  
 Typus: Schimper 2276 (BM, CGE, E, G, K).  
 Ref.: Thulin M. 1993. Fl. of Somalia 1: 82.
- Polygala amboniensis** Gürke, in Engler, Pflanzenw. Ost-Afrikas C: 234 (1895).  
 Typus: Holst 2548 (B holotypus destr.; BREM lectotypus).  
 Ref.: Paiva J.A.R. 1998. Fontqueria 50: 237, ♫ 233.

## POLYGONACEAE

- Oxygonum atriplicifolium* (Meisn.) Martelli var. (=) *Oxygonum atriplicifolium* (Meisn.) Martelli, Fl. Bogos.: 69 (1886).  
*trichocarpum* Chiov., Fl. Somalia II: 380 (1932).  
 Syntypi: Senni 599; Gorini 385.  
 Somalia.
- Oxygonum somalense* Chiov., Result. Sc. Miss. (=) *Oxygonum atriplicifolium* (Meisn.) Martelli, Fl. Bogos.: 69 (1886).  
 Stefanini-Paoli Somal. Ital. I: 152 (1916).  
 Holotypus: Paoli 1323.  
 Somalia.
- Oxygonum somalense* Chiov. var. *pterocarpum* (=) *Oxygonum atriplicifolium* (Meisn.) Martelli, Fl. Bogos.: 69 (1886).  
 Chiov., Fl. Somalia II: 380 (1932).  
 Syntypus: Senni 326.  
 Somalia.  
 The exsicc. (pro sytype) 'Gorini 72' must by referred to 'Oxygonum sinuatum (Meisn.) Dammer' (Fide Thulin, Fl. of Somalia 1: 178, 1993).
- Polygonum arussense** Chiov., Ann. Bot. (Rome) 10 (3): 403 (1912).  
 Holotypus: Negri 730.  
 Ethiopia
- Polygonum senegalense** Meisn. var. **semilanigerum**  
 Chiov., Fl. Somalia: 295 (1929).  
 Holotypus: Puccioni & Stefanini 179 [203].  
 Somalia.
- Rumex abyssinicus* Jacq. var. *calystegiifolius* (=) *Rumex abyssinicus* Jacq., Hort. bot. Vindob. 3: 48, ♦ t. 93 (1776).  
 Rech.f., Bot. Not., Suppl. 3 (3): 35 (1954).  
 Holotypus: Pappi 237.  
 Eritrea.
- Rumex abyssinicus* Jacq. var. *retrorsilobatus* (=) *Rumex abyssinicus* Jacq., Hort. bot. Vindob. 3: 48, ♦ t. 93 (1776).  
 Rech.f., Bot. Not., Suppl. 3 (3): 36 (1954).  
 Holotypus: Chiovenda 1886.  
 Ethiopia.
- Typus: a cultivated plant from Ethiopia (W holotypus destr.).  
 Ref.: Hedberg O. in Edwards S., Mesfin Tadesse, Sebsebe Demissew & Hedberg I. 2000. Fl. of Ethiopia and Eritrea 2 (1): 339, ♦ 339.
- Typus: a cultivated plant from Ethiopia (W holotypus destr.).  
 Ref.: Hedberg O. in Edwards S., Mesfin Tadesse, Sebsebe Demissew & Hedberg I. 2000. Fl. of Ethiopia and Eritrea 2 (1): 339, ♦ 339.

## PORTULACACEAE

**Portulaca erythraeae** Schweinf., Bull. Herb. Boissier 4, App. II: 171 (1896).  
Isotypus: Schweinfurth 1755.  
(B holotypus. Gilbert, Fl. of Ethiopia and Eritrea 2 (1): 254. 2000).  
Eritrea.

**Portulaca greenwayi** M.G.Gilbert, Kew Bull. 55 (4): 775, ♫ 776 (2000).  
Isotypus: Greenway 9251.  
(K holotypus. Gilbert & Phillips, Kew Bull. 55 (4): 775. 2000).  
Kenya.

**Portulaca quadrifida** L. forma **vestita** Engl. ex Poelln., Repert. Spec. Nov. Regni Veg. 50: 63 (1941).  
Isotypus: Robecchi-Bricchetti 151.  
Somalia.

## RANUNCULACEAE

**Clematis burgensis** Engl., Bot. Jahrb. Syst. 45: 272 (1911).  
Isotypus: Ruspoli & Riva 1348.  
(B holotypus. Teketay, Belmontia n. s. 19 (108): 7. 1987).  
Ethiopia.

**Clematis intermedia** Chiov., Ann. Bot. (Rome) 9 (= 1): 51 (1911).  
Holotypus: Chiovenda 2878.  
Ethiopia.

**Clematis wightiana** Wall. ex Wight var. *gallaënsis* (= Engl., in Mildbraed, Wiss. Erg. deut. Zentr.-Afr. Exped., Bot. 2: 207 (1911).  
Syntypus: Ruspoli & Riva 1295.  
Ethiopia.

**Delphinium ruspolianum** Engl., Bot. Jahrb. Syst. 45: 267, ♫ 268 (1911).  
Isosyntypus: Ruspoli & Riva 1218.  
(B syntypus. Milne-Redhead & Turrill, Fl. Trop. E. Afr., Ranunculaceae: 20. 1952, sub holotypus).  
Ethiopia.

**Delphinium ruspolianum** Engl. forma *albiflorum* (= Chiov., Malpighia 34: 487 (1937).  
Holotypus: Taschdjian 129.  
Ethiopia.

**Clematis hirsuta** Guill. & Perr., Fl. Seneg. Tent. 1: 1 (1831).  
Typus: Leprieur s. nr. (P holotypus).  
Ref.: Demel Teketay 1987. Belmontia 19 (108): 9, ♫ 10.

**Clematis hirsuta** Guill. & Perr., Fl. Seneg. Tent. 1: 1 (1831).  
Typus: Leprieur s. nr. (P holotypus).  
Ref.: Demel Teketay 1987. Belmontia 19 (108): 9, ♫ 10.

**Delphinium wellbyi** Hemsley, Bull. Misc. Inf. Kew 1907: 360 (1907).  
Typus: Wellby s. nr. (K holotypus).  
Ref.: Demel Teketay in Edwards S., Mesfin Tadesse, Sebsebe Demissew & Hedberg I. 2000. Fl. of Ethiopia and Eritrea 2 (1): 30, ♫ 30.

**Delphinium wellbyi** Hemsley, Bull. Misc. Inf. Kew 1907: 360 (1907).  
Typus: Wellby s. nr. (K holotypus).  
Ref.: Demel Teketay in Edwards S., Mesfin Tadesse, Sebsebe Demissew & Hedberg I. 2000. Fl. of Ethiopia and Eritrea 2 (1): 30, ♫ 30.

## RANUNCULACEAE

- Delphinium ruspolianum* Engl. var. *micranthum* (=) ***Delphinium wellbyi*** Hemsley, Bull. Misc. Inf. Kew 1907: 360 (1907).  
Fiori, Nuovo Giorn. Bot. Ital. n. s. 48 (1): 30 (1940).  
Holotypus: Pucci Rapetti anno 1937.  
Ethiopia.
- Typus: Wellby s. nr. (K holotypus).  
Ref.: Demel Teketay in Edwards S., Mesfin Tadesse, Sebsebe Demissew & Hedberg I. 2000. Fl. of Ethiopia and Eritrea 2 (1): 30, ♀ 30.

## RESEDACEAE

- Ochradenus randonioides* Abdallah var. *glaber* (=) ***Ochradenus somalensis*** Baker f., J. Bot. 34: 52 (1896).  
Abdallah, Meded. Landbouwhogeschool 67 (8): 67 (1967).  
Isotypus: Hemming 1622.  
(K holotypus. Abdallah, Meded. Landbouwhogeschool 67 (8): 67. 1967).  
Somalia.
- Typus: Donaldson-Smith s. nr. (BM holotypus).  
Ref.: Thulin M. 1993. Fl. of Somalia 1: 78, ♀ 77.

- Reseda amblycarpa* Fresen. var. *somala* Chiov., (=) ***Reseda amblycarpa*** Fresen., Mus. Senckenberg. 2: 108 (1837).  
Fl. Somalia: 88 (1929).  
Syntypi: Puccioni & Stefanini 649 [713], 728 [805], 854 [942].  
Somalia.
- Typus: Rüppell s. nr. (FR holotypus).  
Ref.: Thulin M. 1993. Fl. of Somalia 1: 79.

- Reseda ellenbeckii*** Perkins, Bot. Jahrb. Syst. 43: 417 (1909).  
Isosyntypus: Ruspoli & Riva 994.  
Ethiopia.

- Reseda massae* Chiov., Atti Reale Accad. Italia, Mem. Cl. Sci. Fis., Ser. 7, 11 (2): 18 (1940).  
Holotypus: Massa 708.  
Eritrea.  
According to Abdallah & de Wit (Meded. Landbouwhogeschool 78 (14): 381. 1978), 'Reseda massae' must be excluded from Resedaceae.

- Reseda migiurtinorum*** Chiov., Fl. Somalia: 87, ♀ t. XXXII f. 2 (1929).  
Lectotypus: Puccioni & Stefanini 644 [708].  
(Abdallah & de Wit, Meded. Landbouwhogeschool 78 (14): 280. 1978).  
Syntypus: Puccioni & Stefanini 620 [683].  
Somalia.

- Reseda nogalensis* Chiov., Fl. Somalia: 88 (1929). (=) ***Reseda amblycarpa*** Fresen., Mus. Senckenberg. 2: 108 (1837).  
Holotypus: Puccioni & Stefanini 940 [1034].  
Somalia.
- Typus: Rüppell s. nr. (FR holotypus).  
Ref.: Thulin M. 1993. Fl. of Somalia 1: 79.

- Stefaninia telephiifolia* Chiov., Fl. Somalia: 77, ♀ t. II f. 1 (1929). (=) ***Reseda telephiifolia*** (Chiov.) Abdallah & de Wit, Meded. Landbouwhogeschool 78 (14): 330, ♀ f. 81 (1978).  
Holotypus: Puccioni & Stefanini 1005 [1110].  
Somalia.
- Ref.: Thulin M. 1993. Fl. of Somalia 1: 79.

## ROSACEAE

- Alchemilla pedata* Hochst. ex A.Rich. var. *argentea* Chiov. ex Fiori, Mem. Soc. Bot. Ital. 23: 481 (1916).  
 Holotypus: Baldrati s. nr.  
 Eritrea.
- Rosa abyssinica* Lindl. var. *microphylla* Almagià, non Crépin (1879), Annuario Reale Ist. Bot. Roma 8 (1): 78 (1903).  
 Syntypi: Terracciano & Pappi 173, 322, 2569, Pappi 3928, Schweinfurth & Riva 2104.  
 Eritrea.
- Rubus aethiopicus** R.A.Graham, Kew Bull. 12: 405 (1958).  
 Isotypus: Mooney 6177.  
 (K holotypus. Hedberg, Nordic J. Bot. 6 (5): 573. 1986).  
 Ethiopia.
- Rubus afrogustafssonii* Chiov., Atti Ist. Bot. Univ. Pavia serie IV, 7:133 (1936).  
 Holotypus: Balbo 421 \*.  
 Kenya.  
 The plant was published as 'Rubus gustaffsoni' by Chiovenda in Racc. Bot. Miss. Consolata Kenya: 41 (1935).
- Rubus assaortinus* Chiov., Ann. Bot. (Rome) 13 (3): 397 (1915).  
 Holotypus: Pappi 2763.  
 Eritrea.
- Rubus chiesae* Chiov., Ann. Bot. (Rome) 9 (3): 319 (1911).  
 Syntypi: Negri 416, 495.  
 Ethiopia.
- Rubus chiovendae* Gust., Ark. Bot. 26 A n. 7: 50,  $\diamond$  t. 9 (1934).  
 Syntypi: Chiovenda 1076, 1317, 1505.  
 Ethiopia.
- Rubus exsuccus* Steud. ex A.Rich. var. *erythraeus* Fiori, Boschi e piante legnose dell'Eritrea: 150 (1909-1912).  
 Lectotypus: Fiori 95 (Gustafsson, Ark. Bot. 26 A n. 7: 37. 1934).  
 Syntypi: Terracciano & Pappi 237, 269.  
 Eritrea.
- Rubus gortanii* Chiov., Atti Reale Accad. Italia, Mem. Cl. Sci. Fis., Ser. 7: 11 (2): 30 (1940).  
 Holotypus: Gortani II/229.  
 Ethiopia.
- Alchemilla pedata** Hochst. ex A.Rich., Tent. Fl. Abyss. 1: 260 (1847).  
 Typus: Schimper II: 1166 (P holotypus; BM, UPS isotypi).  
 Ref. Hedberg O. in Hedberg I. & Edwards S. 1989. Fl. of Ethiopia 3: 39.
- Rosa abyssinica** Lindl., Ros. monogr.: 116,  $\diamond$  tab. 13 (1820).  
 Typus: Salt s. nr. (BM holotypus).  
 Ref.: Nilsson Ö. in Hedberg I. & Edwards S. 1989. Fl. of Ethiopia 3: 36,  $\diamond$  35.
- Rubus keniensis** Standl., Smithsonian Misc. Collect. 68 (5): 2 (1917).  
 Typus: Mearns 2325 (US holotypus; BM isotypus).  
 Ref.: Milne-Redhead E. 1960. In schedis.
- Rubus apetalus** Poir., Encycl. 6: 242 (1804).  
 Typus: Commerson (P holotypus).  
 Ref.: Hedberg O. in Hedberg I. & Edwards S. 1989. Fl. of Ethiopia 3: 34,  $\diamond$  32.
- Rubus volkensii** Engl., Bot. Jahrb. Syst. 19, Beibl. 47: 30 (1894).  
 Typus: Volkens 1526 (B holotypus destr.; BM, K isotypi).  
 Ref.: Hedberg O. in Hedberg I. & Edwards S. 1989. Fl. of Ethiopia 3: 33.
- Rubus apetalus** Poir., Encycl. 6: 242 (1804).  
 Typus: Commerson (P holotypus).  
 Ref.: Hedberg O. in Hedberg I. & Edwards S. 1989. Fl. of Ethiopia 3: 34,  $\diamond$  32.
- Rubus apetalus** Poir., Encycl. 6: 242 (1804).  
 Typus: Commerson (P holotypus).  
 Ref.: Hedberg O. in Hedberg I. & Edwards S. 1989. Fl. of Ethiopia 3: 34,  $\diamond$  32.
- Rubus apetalus** Poir., Encycl. 6: 242 (1804).  
 Typus: Commerson (P holotypus).  
 Ref.: Hedberg O. in Hedberg I. & Edwards S. 1989. Fl. of Ethiopia 3: 34,  $\diamond$  32.
- Rubus apetalus** Poir., Encycl. 6: 242 (1804).  
 Typus: Commerson (P holotypus).  
 Ref.: Hedberg O. 1986. Nordic J. Bot. 6 (5): 574.

## ROSACEAE

- Rubus petalabigens* Gust., Ark. Bot. 26 A n. 7: 31, (=) ♦ t. 4 (1934).  
Syntypi: Pappi 688, 3543.  
Eritrea.
- Rubus quartinianus* A.Rich. var. *hararensis* Engl. (= ex Gust., Ark. Bot. 26 A n. 7: 52 (1934).  
Syntypi: Robecchi-Bricchetti 78, 79.  
Ethiopia.
- Rubus quartinianus* A.Rich. var. *pappianus* Gust., (= Ark. Bot. 26 A n. 7: 52 (1934).  
Syntypi: Pappi 3596; Chiovenda 1266.  
Eritrea and Ethiopia.
- Rubus scioanus* Chiov., Ann. Bot. (Rome) 9 (3): (= 320 (1911).  
Syntypi: Negri 234, 306.  
Ethiopia.
- Rubus apetalus** Poir., Encycl. 6: 242 (1804).  
Typus: Commerson (P holotypus).  
Ref.: Hedberg O. in Hedberg I. & Edwards S. 1989. Fl. of Ethiopia 3: 34, ♦ 32.
- Rubus apetalus** Poir., Encycl. 6: 242 (1804).  
Typus: Commerson (P holotypus).  
Ref.: Hedberg O. in Hedberg I. & Edwards S. 1989. Fl. of Ethiopia 3: 34, ♦ 32.
- Rubus apetalus** Poir., Encycl. 6: 242 (1804).  
Typus: Commerson (P holotypus).  
Ref.: Hedberg O. in Hedberg I. & Edwards S. 1989. Fl. of Ethiopia 3: 34, ♦ 32.
- Rubus steudneri** Schweinf., Verh. K.K. Zool.-Bot. Ges. Wien 18: 669 (1868).  
Typus: Steudner 921 (B holotypus destr.); Ash 1391 (ETH neotypus, K, MO isoneotypi).  
Ref.: Hedberg O. in Hedberg I. & Edwards S. 1989. Fl. of Ethiopia 3: 34, ♦ 32.

## RUTACEAE

- Aeglopsis alexandrae* Chiov., Fl. Somalia II: 50, ♦ (= 49 (1932).  
Holotypus: Tozzi 327.  
Somalia.
- Diphasia dainellii* Pic.Serm., Miss. Stud. Lago Tana, VII, Ricerche Bot. 1: 70, ♦ t. XII (1951).  
Holotypus/Isotypus: Pichi-Sermolli 2350.  
Ethiopia.
- Fagara consolatae* Chiov., Racc. Bot. Miss. (= Consolata Kenya: 14 (1935).  
Holotypus: Balbo 485 \*.  
Kenya.
- Fagara somalensis* Chiov., Fl. Somalia II: 48 (= (1932).  
Holotypus: Senni 223.  
Somalia.
- Fagaropsis gillettii* Chiov., Bull. Misc. Inform. Kew 1941: 130 (1941).  
Isotypus: Gillett 4844.  
(K holotypus. Kokwaro, Fl. Trop. E. Afr., Rutaceae: 49. 1982).  
Somalia.
- Vepris eugeniiifolia** (Engl.) Verd., Bull. Misc. Inf. Kew 1926: 399 (1926).  
Typus: Holst 8869 (B holotypus, destr.; BM, K isotypi).  
Ref.: Thulin M. 1999. Fl. of Somalia 2: 177, ♦ 176.
- Vepris dainellii** (Pic.Serm.) Kokwaro, Kew Bull. 32 (4): 793 (1978).  
Ref.: Gilbert M.G. in Hedberg I. & Edwards S. 1989. Fl. of Ethiopia 3: 424, ♦ 425.
- Zanthoxylum usambarensense** (Engl.) Kokwaro, Kew Bull. 32 (4): 798 (1978).  
Typus: Albers 354 (B holotypus, destr.).  
Ref.: Kokwaro J.O. in Polhill R.M. 1982. Fl. Trop. E. Afr., Rutaceae: 41.
- Zanthoxylum holtzianum** (Engl.) P.G.Waterman, Taxon 24 (2/3): 364 (1975).  
Typus: Heinrichi (B holotypus, destr.).  
Ref.: Thulin M. 1999. Fl. of Somalia 2: 175.
- Fagaropsis hildebrandtii** (Engl.) Milne-Redh., Bull. Misc. Inform. Kew 1936: 475 (1936).  
Typus: Hildebrandt 2814 (B holotypus, destr.).  
Ref.: Thulin M. 1999. Fl. of Somalia 2: 175.

## RUTACEAE

*Harrisonia abyssinica* Oliv. var. *somalensis* Fiori, (=) ***Harrisonia abyssinica*** Oliv., Fl. Trop. Afr. 1: 311  
Result. Sc. Miss. Stefanini-Paoli Somalia Ital. 1:  
39 (1916).  
Holotypus: Stefanini & Paoli 1301.  
Somalia.

Typus: Speke & Grant 700 (K holotypus).  
Ref.: Thulin M. 1999. Fl. of Somalia 2: 173, ♀  
172.

**Teclea boranensis** M.G.Gilbert, Nordic J. Bot. 6  
(2): 141 (1986).  
Isotypus: Gillett 14120.  
(K holotypus. Gilbert, Nordic J. Bot. 6 (2):  
141. 1986).  
Kenya.

*Teclea evodiaoides* Chiov., Fl. Somalia II: 47 (1932) (=)  
as “*ovodioides*”.  
Holotypus: Senni 217.  
Somalia.

**Vepris sp. = Burger 3072**, M.G. Gilbert, Fl. of  
Ethiopia 3: 426 (1989).  
Exsicc. (pro typus): Burger 3072.  
Ethiopia.

**Vepris glomerata** (F.Hoffm.) Engl. var. **glabra**  
Kokwaro, Kew Bull. 32 (4): 795 (1978).  
Typus: Kerfoot 949 (EA holotypus; ENT  
isotypus).

Ref.: Thulin M. 1999. Fl. of Somalia 2: 177.

## SANTALACEAE

*Osyris abyssinica* Hochst. ex A.Rich. forma *latifolia* Fiori, Nuovo Giorn. Bot. Ital. 47: 28  
(1940)  
Holotypus: Saccardo s. nr.  
Ethiopia.

**Osyris quadripartita** Decne., Ann. Sc. Nat. Ser.  
II 6: 65 (1836).  
Ref.: Miller A.G. in Hedberg I. & Edwards S.  
1989. Fl. of Ethiopia 3: 382, ♀ 383.

**Thesium matteii** Chiov., Ann. Bot. (Rome) 10  
(3): 405 (1912).  
Holotypus: Negri 984 bis.  
Ethiopia.

## SIMAROUBACEAE

*Brucea erythraea* Chiov., Ann. Bot. (Rome) 9  
(3): 384 (1911).  
Syntypi: Pappi 5279; Tellini 497; Fiori 197,  
197 bis, 198.  
Eritrea.

**Brucea antidysenterica** J.F.Mill., Ic. Anim. Pl.,  
♀ t. 25 (1779).  
Typus: J.F.Mill., Icon. t. 25 (BM) presumably  
based on material sent from Ethiopia by Bruce.  
Ref.: Stannard B. in Hedberg I. & Edwards S.  
1989. Fl. of Ethiopia 3: 440, ♀ 441.

*Commiphora julifera* Chiov., Fl. Somalia II: 59, ♀  
57 (1932).  
Holotypus: Puccioni & Stefanini 192 [216].  
Somalia.

**Kirkia tenuifolia** Engl., Bot. Jahrb. Syst. 32: 123  
(1902).  
Typi: Ellenbeck 2167, 2194 (B syntypi destr.).  
Ref.: Thulin M. 1999. Fl. of Somalia 2: 182, ♀  
183 (sub Kirkiaeae).

## SIMAROUBACEAE

*Kirkia burgeri* Stannard subsp. *somalensis* (=) **Kirkia burgeri** Stannard, Kew Bull. 35 (4): 835 (1981).  
Stannard, Kew Bull. 35 (4): 836 (1981).  
Isotypus: Lavranos 9124.  
(K holotypus. Stannard, Kew Bull. 35 (4): 836.  
1981).  
Somalia.

*Tetraspis ruspolii* Chiov., Ann. Bot. (Rome) 10 (1): 26, ♀ 26 (1912); Ann. Bot. (Rome) 13 (3): 398 (1915).  
Syntypi: Ruspoli & Riva 865, 1081.  
Ethiopia.

*Trichilia siderotricha* Chiov., Atti Reale Accad. Italia, Mem. Cl. Sci. Fis., Ser. 7, 11 (2): 24 (1940).  
Holotypus: Marchetti 12.  
Ethiopia.

(=) **Kirkia tenuifolia** Engl., Bot. Jahrb. Syst. 32: 123 (1902).  
Typus: Ellenbeck 2167, 2194 (B syntypi destr.).  
Ref.: Thulin M. 1999. Fl. of Somalia 2: 183 (sub Kirkiaeae).

**Brucea antidyserterica** J.F.Mill., Ic. Anim. Pl., ♀ t. 25 (1779).  
Typus: J.F.Mill., Icon. t. 25 (BM) presumably based on material sent from Ethiopia by Bruce.  
Ref.: Stannard B. in Hedberg I. & Edwards S. 1989. Fl. of Ethiopia 3: 440, ♀ 441.

## ULMACEAE

*Sponia orientalis* Planch. var. *asperata* Solms ex Schweinf., Beitr. Fl. Aethiop.: 192 (1867).  
Isotypus: Schimper 195.  
(B holotypus destr. Polhill, Fl. of Ethiopia 3: 268. 1989).  
Ethiopia.

(=) **Trema orientalis** (L.) Blume, Ann. Mus. Bot. Lugduno-Batavum 2: 62 (1852).  
Typus: Herb. Hermann folio 2: 1 & 4: 71 (BM-SL, syntypi).  
Ref.: Polhill R. M. in Hedberg I. & Edwards S. 1989. Fl. of Ethiopia 3: 268, ♀ 269.

## URTICACEAE

*Forsskaolea tenacissima* L. var. *erythraea* (=) **Forsskaolea tenacissima** L., Opobalsamum: 17 (1764).  
A.Terracc., Annuario Reale Ist. Bot. Roma 5 (3): 97 (1894).  
Holotypus: Terracciano 3 bis.  
Eritrea.

Typus: Cultivated in the Botanical Garden of Uppsala.  
Ref.: Polhill R. M. in Hedberg I. & Edwards S. 1989. Fl. of Ethiopia 3: 322, ♀ 323.

*Pouzolzia erythraea* Schweinf., Bull. Herb. Boissier 4, App. 2: 146 (1896).  
Neotypus: Pappi 4033 (Friis & Wilmot-Dear, Nordic J. Bot. 8 (1): 50. 1988).  
Eritrea.

**Didymodoxa caffra** (Thunb.) Friis & Wilmot-Dear, Bol. Soc. Brot. 58: 210 (1985).  
Typus: Thunberg s. nr. (UPS-THUNB n. 22124, lectotype, selected by Brown, Bull. Misc. Inform Kew 1913: 80).  
Ref.: Friis I. & Wilmot-Dear C.M. 1988. Nordic J. Bot. 8 (1): 49, ♀ 51.

## VAHLIACEAE

**Vahlia somalensis** Chiov., Fl. Somalia: 170 (1929).

Lectotypus: Puccioni & Stefanini 181 (Rampi, Webbia 28 (2): 538. 1973).

Syntypi: Ruspoli & Riva 713, 901, 1182; Puccioni & Stefanini 203, 204, 453, 493, 520; Robecchi-Bricchetti 590; Paoli s. nr.

Ethiopia and Somalia.

## VISCACEAE

**Arceuthobium juniperi-procerae** Chiov., Ann. Bot. (Rome) 9 (2): 134 (1911).

Lectotypus: Pappi 1161 (Polhill & Wiens, Fl. Trop. E. Afr., Viscaceae: 2. 1999).

Syntypus: Pappi 2554  
Eritrea.

**Aspidixia semiplana** Tiegh., Bull. Soc. Bot. France (=) 43: 193 (1896).

Isotypus: Schweinfurth 1620.  
Eritrea.

**Korthalsella binii** Pic.Serm., Miss. Stud. Lago Tana, VII, Ricerche Bot. I: 31, ♀ t. II & f. 1 (1951).

Holotypus: Pichi-Sermolli 2487.  
Ethiopia.

**Viscum nervosum** Hochst. ex A.Rich. var. (*angustifolium*) Sprague, in Thiselton-Dyer W.T., Fl. Trop. Afr. 6 (1): 398 (1911).

Isotypus: Beccari 62.  
(K holotypus. Gilbert, Fl. of Ethiopia 3: 376. 1989).  
Eritrea.

**Viscum schimperi** Engl., Bot. Jahrb. Syst. 20: 132 (1894).

Typus: Schimper 667 (B holotypus destr.; BM, K, P isotypi).

Ref.: Gilbert M.G. in Hedberg I. & Edwards S. 1989. Fl. of Ethiopia 3: 377, ♀ 377.

**Korthalsella japonica** (Thunb.) Engl. in Engler & Prantl, Nat. Pflanzenf. Nachtr. I:138 (1897).

Typus: Thunberg Herbarium 23335 (UPS holotypus).

Ref.: Gilbert M.G. in Hedberg I. & Edwards S. 1989. Fl. of Ethiopia 3: 377, ♀ 378.

**Viscum triflorum** DC., Prodr. 4: 279 (1830).

Typus: Bory (G-DC holotypus).

Ref.: Polhill R.M. & Wiens D. in Beentje H.J. 1999. Fl. Trop. E. Afr., Viscaceae: 7, ♀ 8.

Link: *Viscum triflorum* DC. subsp. *nervosum* (A.Rich.) M.G.Gilbert. Gilbert, Fl. of Ethiopia 3: 376. 1989.

## ZYGOPHYLLACEAE

**Fagonia charoides** Chiov., Fl. Somalia: 112, ♀ t. V f. 2 (1929).

Holotypus: Puccioni & Stefanini 698 [772].  
Somalia.

## ZYGOPHYLLACEAE

- Fagonia indica* Burm.f. var. *schweinfurthii* (≡) ***Fagonia schweinfurthii*** (Hadidi) Hadidi, Oesterr. Bot. Z. 121: 273 (1973).  
Hadidi, in Rechinger K.H., Fl. Iran. 98: 6 (1972).  
Isotypus: Schweinfurth & Riva 365.  
(K holotypus. Hadidi, Webbia 33 (1): 87. 1978).  
Eritrea.
- Fagonia migiurtinia* Hadidi, Webbia 33 (1): 82, ♀ (=) ***Fagonia luntii*** Baker, Bull. Misc. Inform. Kew 1894: 330 (1894).  
83 (1978).  
Holotypus: Merla, Azzaroli & Fois s. nr.  
Somalia.
- Fagonia ovalifolia*** Hadidi var. ***qatarensis*** Hadidi, Webbia 32 (2): 393 (1978).  
Isotypus: Boulos 11134.  
(K holotypus. Boulos, Webbia 32 (2): 393. 1978).  
Qatar.
- Fagonia parviflora* Boiss. var. *brevispina* (≡) ***Fagonia indica*** Burm.f. var. ***brevispina*** (Schweinf.) Hadidi, Candollea 27 (1): 88 (1972).  
Schweinf., Bull. Herb. Boissier 7, App. II: 274 (1899).  
Isosyntypus: Schweinfurth 110.  
Yemen.
- Kelleronia bricchettii* Chiov., Result. Sc. Miss. Stefanini-Paoli Somalia Ital. 1: 39 (1916) in clavi; Bull. Soc. Bot. Ital. 1917: 25 (1917).  
Syntypi: Robecchi-Bricchetti 32, 33, 34 bis.  
Somalia.
- Kelleronia eriostemon* Chiov., Fl. Somalia: 113, ♀ (= t. VIII f. 2 (1929).  
Holotypus: Puccioni & Stefanini 308 [354].  
Somalia.
- Kelleronia macropoda* Chiov., Fl. Somalia: 115, ♀ (= t. VIII f. 1 (1929).  
Holotypus: Puccioni & Stefanini 154 [173].  
Somalia.
- Kelleronia nogalensis* Chiov., Result. Sc. Miss. Stefanini-Paoli Somalia Ital. 1: 39 (1916) in clavi; Bull. Soc. Bot. Ital. 1917: 24 (1917).  
Holotypus: Robecchi-Bricchetti 34.  
Somalia.
- Kelleronia obbiadensis* Chiov., Fl. Somalia: 115 (= (1929).  
Holotypus: Puccioni & Stefanini 537 [590].  
Somalia.
- Kelleronia quadricornuta* Chiov., Fl. Somalia: 114 (= (1929).  
Syntypi: Puccioni & Stefanini 914 [1005], 933 [1024], 1000 [1104].  
Somalia.
- Kelleronia gilletiae*** Baker f., J. Bot. 36: 6 (1898), as 'gillettii'.  
Typi: Gillett s. nr., Lort Phillips s. nr. (K syntypi).  
Ref.: Thulin M. 1993. Fl. of Somalia 1: 182, ♀ t. 3 A.
- Kelleronia splendens*** Schinz, Bull. Herb. Boissier 3: 400, ♀ t. IX (1895).  
Typus: Keller s. nr. (K isotypus).  
Ref.: Thulin M. 1993. Fl. of Somalia 1: 180, ♀ 181.
- Kelleronia gilletiae*** Baker f., J. Bot. 36: 6 (1898), as 'gillettii'.  
Typi: Gillett s. nr., Lort Phillips s. nr. (K syntypi).  
Ref.: Thulin M. 1993. Fl. of Somalia 1: 182, ♀ t. 3 A.
- Kelleronia revoilii*** (Franch.) Chiov., Result. Sc. Miss. Stefanini-Paoli Somalia Ital. 1: 39 (1916).  
Typi: Révoil s. nr. (P syntypi).  
Ref.: Thulin M. 1993. Fl. of Somalia 1: 182.
- Kelleronia gilletiae*** Baker f., J. Bot. 36: 6 (1898), as 'gillettii'.  
Typi: Gillett s. nr., Lort Phillips s. nr. (K syntypi).  
Ref.: Thulin M. 1993. Fl. of Somalia 1: 182, ♀ t. 3 A.
- Kelleronia splendens*** Schinz, Bull. Herb. Boissier 3: 400, ♀ t. IX (1895).  
Typus: Keller s. nr. (K isotypus).  
Ref.: Thulin M. 1993. Fl. of Somalia 1: 180, ♀ 181.

## ZYGOPHYLLACEAE

*Kelleronia revoilii* (Franch.) Chiov. var. (=) **Kelleronia revoilii** (Franch.) Chiov., Result. Sc. Miss. Stefanini-Paoli Somalia Ital. 1: 39 (1916).  
Holotypus: Puccioni & Stefanini 619 [682].  
Somalia.

Typi: Révoil s. nr. (P syntypi).  
Ref.: Thulin M. 1993. Fl. of Somalia 1: 182.

**Tribulus lanuginosus** L. var. **microcarpus** Chiov.,  
Fl. Somalia. II: 46 (1932).  
Holotypus: Senni 609.  
Somalia.

*Tribulus terrestris* L. var. *nogalensis* Chiov., Fl. (=) **Tribulus terrestris** L., Sp. Pl.: 387 (1753).  
Somala: 116 (1929).  
Holotypus: Puccioni & Stefanini 954 [1049].  
Somalia.

Typus: Linnean Herbarium 547/4 (LINN).  
Ref.: Thulin M. 1993. Fl. of Somalia 1: 180.

**Zygophyllum migiurtinorum** Chiov., Fl. Somalia:  
111 (1929).  
Holotypus: Puccioni & Stefanini 615 [675].  
Somalia.

**Zygophyllum prismaticum** Chiov., Fl. Somalia:  
111 (1929).  
Holotypus: Puccioni & Stefanini 635 [699].  
Somalia.

**Zygophyllum qatarense** Hadidi, Webbia 32 (2):  
394, ♫ 395 (1978).  
Isotypus: Boulos 10953.  
(K holotypus. Boulos, Webbia 32 (2): 394.  
1978).  
Qatar.

**Zygophyllum robecchii** Engl., Annuario Reale  
Ist. Bot. Roma 7 (1): 14 (1897).  
Lectotypus: Robecchi-Bricchetti 29 (Hadidi,  
Webbia 33 (1): 69. 1978).  
Syntypi: Robecchi-Bricchetti 30; Riva 1048.  
Somalia (Robecchi-Bricchetti); Ethiopia (Riva).

*Zygophyllum simplex* L. var. *herniaroides* Chiov., (=)  
Fl. Somalia: 110 (1929).  
Holotypus: Puccioni & Stefanini 372 [432].  
Somalia.

**Zygophyllum simplex** L., Mant. pl.: 68 (1767).  
Typus: Plant grown in Uppsala Botanic  
Garden from seeds collected in Arabia by  
Forsskål.  
Ref.: Thulin M. 1993. Fl. of Somalia 1: 183.

## INDEX

AIZOACEAE:			pag. 11
Delosperma, 11	Tetragonia, 11	Trianthema, 11	
Nitraria, 11			
AMARANTHACEAE:			pag. 12
Achyranthes, 12	Chionitrix, 12	Pseudodigera, 13	
Aerva, 12	Cyathula, 12	Psilotrichum, 13	
Amaranthus, 12	Dasyphaera, 13	Pupalia, 14	
Centema, 12	Pleuropterantha, 13	Sericostachys, 14	
Centemopsis, 12			
ANNONACEAE:			pag. 15
Artabotrys, 15	Monodora, 15	Uvaria, 15	
Mkilua, 15	Pachypodanthium, 15	Uvariastrum, 15	
ARISTOLOCHIACEAE:			pag. 15
Aristolochia, 15			
BALANITACEAE:			pag. 16
Balanites, 16			
BURSERACEAE:			pag. 17
Boswellia, 17	Commiphora, 17		
CAPPARACEAE:			pag. 24
Boscia, 24	Courbonia, 27	Puccinia, 29	
Cadaba, 25	Dianthera, 27	Ritchiea, 29	
Capparis, 26	Maerua, 27	Thylachium, 29	
Cleome, 26			
CARYOPHYLLACEAE:			pag. 30
Alsine, 30	Polycarpea, 30	Stellaria, 30	
Drymaria, 30	Sagina, 30	Uebelinia, 30	
CHENOPODIACEAE:			pag. 31
Fadenia, 31	Lagenantha, 31	Salsola, 31	
Gyroptera, 31			
CRASSULACEAE:			pag. 32
Kalanchoe, 32	Sedum, 32	Sempervivum, 33	
CRUCIFERAE:			pag. 33
Cardamine, 33	Erucastrum, 33	Matthiola, 34	
Diceratella, 33	Fabrisinapis, 34	Rorippa, 34	
Eruca, 33	Farsetia, 34	Sisymbrium, 35	
EUPHORBIACEAE:			pag. 35
Acalypha, 35	Croton, 36	Monadenium, 44	
Andrachne, 35	Drypetes, 36	Phyllanthus, 45	
Bridelia, 35	Erythrococca, 36	Tithymalus, 45	
Caperonia, 35	Euphorbia, 37	Tragia, 45	
Cecchia, 35	Jatropha, 42	Tragiella, 46	
Clutia, 35	Macaranga, 44	Zimmermannia, 46	
Collenucia, 35	Mildbraedia, 44		
GERANIACEAE:			pag. 47
Monsonia, 47	Pelargonium, 47		
GISEKIACEAE:			pag. 48
Gisekia, 48			
HERNANDIACEAE:			pag. 48
Gyrocarpus, 48			

HYDNORACEAE:		pag. 48
<i>Hydnora</i> , 48		
ILLECEBRACEAE:		pag. 48
<i>Hafunia</i> , 48	<i>Scleranthus</i> , 49	
LAURACEAE:		pag. 49
<i>Tylostemon</i> , 49		
LEGUMINOSAE-CAESALPINIOIDEAE:		pag. 49
<i>Baikiae</i> , 49	<i>Ceratonia</i> , 51	<i>Poinciana</i> , 52
<i>Bauhinia</i> , 49	<i>Cynometra</i> , 51	<i>Sennia</i> , 52
<i>Berlinia</i> , 49	<i>Parkinsonia</i> , 51	<i>Tamarindus</i> , 52
<i>Caesalpinia</i> , 50	<i>Peltophoropsis</i> , 52	<i>Tessmannia</i> , 52
<i>Cassia</i> , 50		
LEGUMINOSAE-MIMOSOIDEAE:		pag. 53
<i>Acacia</i> , 53	<i>Dichrostachys</i> , 58	<i>Entada</i> , 58
<i>Calliandra</i> , 58		
LEGUMINOSAE-PAPILIONOIDEAE:		pag. 58
<i>Abrus</i> , 58	<i>Dolichos</i> , 65	<i>Phaseolus</i> , 73
<i>Aeschynomene</i> , 58	<i>Eriosema</i> , 66	<i>Pueraria</i> , 74
<i>Alysicarpus</i> , 58	<i>Erythrina</i> , 66	<i>Rhynchosia</i> , 74
<i>Aspalathus</i> , 59	<i>Glycine</i> , 66	<i>Sesbania</i> , 75
<i>Astragalus</i> , 59	<i>Indigofera</i> , 66	<i>Sophora</i> , 75
<i>Baphia</i> , 59	<i>Lathyrus</i> , 72	<i>Stylosanthes</i> , 75
<i>Calpurnia</i> , 60	<i>Liebrechtsia</i> , 72	<i>Taverniera</i> , 76
<i>Clitoria</i> , 60	<i>Lonchocarpus</i> , 72	<i>Tephrosia</i> , 76
<i>Colutea</i> , 60	<i>Lotononis</i> , 72	<i>Teramnus</i> , 78
<i>Cordyla</i> , 60	<i>Lotus</i> , 72	<i>Trifolium</i> , 78
<i>Crotalaria</i> , 60	<i>Macrolotus</i> , 72	<i>Vatovaea</i> , 79
<i>Cystista</i> , 64	<i>Microcharis</i> , 72	<i>Vicia</i> , 80
<i>Dalbergia</i> , 65	<i>Millettia</i> , 73	<i>Vigna</i> , 80
<i>Desmodium</i> , 65	<i>Mucuna</i> , 73	<i>Zornia</i> , 81
<i>Dicraeopetalum</i> , 65	<i>Ormocarpum</i> , 73	
LORANTHACEAE:		pag. 81
<i>Loranthus</i> , 81	<i>Oncocalix</i> , 83	<i>Plicosepalus</i> , 83
MALPIGHIACEAE:		pag. 83
<i>Acridocarpus</i> , 83	<i>Triaspis</i> , 84	<i>Tristellateia</i> , 84
<i>Caucanthus</i> , 83		
MELIACEAE:		pag. 84
<i>Melia</i> , 84	<i>Trichilia</i> , 84	<i>Turraea</i> , 84
<i>Polyscias</i> , 84		
MENISPERMACEAE:		pag. 85
<i>Bricchettia</i> , 85	<i>Cocculus</i> , 85	
MOLLUGINACEAE:		pag. 85
<i>Limeum</i> , 85	<i>Mollugo</i> , 85	
MORACEAE:		pag. 86
<i>Dorstenia</i> , 86	<i>Ficus</i> , 86	
MORINGACEAE:		pag. 87
<i>Moringa</i> , 87		
MIRYCACEAE		pag. 88
<i>Myrica</i> , 88		
NYCTAGINACEAE:		pag. 88
<i>Boerhavia</i> , 88	<i>Commicarpus</i> , 88	<i>Selinocarpus</i> , 89

OPILIACEAE:		pag. 89
<i>Opilia</i> , 89		
OXALIDACEAE		pag. 89
<i>Oxalis</i> , 89		
PHYTOLACCACEAE		pag. 89
<i>Phytolacca</i> , 89		
PIPERACEAE:		pag. 90
<i>Peperomia</i> , 90		
PITTOSPORACEAE:		pag. 90
<i>Pittosporum</i> , 90		
PODOSTEMACEAE:		pag. 90
<i>Sphaerothylax</i> , 90		
POLYGALACEAE:		pag. 91
<i>Carpolobia</i> , 91	<i>Polygala</i> , 91	
POLYGONACEAE:		pag. 92
<i>Oxygonum</i> , 92	<i>Polygonum</i> , 92	<i>Rumex</i> , 92
PORTULACACEAE:		pag. 93
<i>Portulaca</i> , 93		
RANUNCULACEAE:		pag. 93
<i>Clematis</i> , 93	<i>Delphinium</i> , 93	
RESEDACEAE:		pag. 94
<i>Ochradenus</i> , 94	<i>Reseda</i> , 94	<i>Stefaninia</i> , 94
ROSACEAE:		pag. 95
<i>Alchemilla</i> , 95	<i>Rosa</i> , 95	<i>Rubus</i> , 95
RUTACEAE:		pag. 96
<i>Aeglopsis</i> , 96	<i>Fagaropsis</i> , 96	<i>Teclea</i> , 97
<i>Diphasia</i> , 96	<i>Harrisonia</i> , 97	<i>Vepris</i> , 97
<i>Fagara</i> , 96		
SANTALACEAE:		pag. 97
<i>Osyrix</i> , 97	<i>Thesium</i> , 97	
SIMAROUBACEAE:		pag. 97
<i>Brucea</i> , 97	<i>Tetraspis</i> , 98	<i>Trichilia</i> , 98
<i>Kirkia</i> , 98		
ULMACEAE:		pag. 98
<i>Sponia</i> , 98		
URTICACEAE:		pag. 98
<i>Forsskaolea</i> , 98	<i>Pouzolzia</i> , 98	
VAHLIACEAE:		pag. 99
<i>Vahlia</i> , 99		
VISCACEAE:		pag. 99
<i>Arceuthobium</i> , 99	<i>Korthalsella</i> , 99	<i>Viscum</i> , 99
<i>Aspidixia</i> , 99		
ZYGOPHYLLACEAE:		pag. 99
<i>Fagonia</i> , 99	<i>Tribulus</i> , 101	<i>Zygophyllum</i> , 101
<i>Kelleronia</i> , 100		